

قارچ‌ها

شاید واژه قارچ، شما را به یاد قارچ‌های خوراکی بیندازد. اما همه قارچ‌ها، این‌گونه نیستند، مثلاً کپک نان، نوعی قارچ است. قارچ‌ها، بسیار گوناگون‌اند. بعضی‌ها تک سلولی و بعضی‌ها پر سلولی هستند. دانشمندان بر این عقیده‌اند که اولین قارچ‌ها احتمالاً تک سلولی بودند. قدمت قارچ‌ها به حدود ۴۰۰ میلیون سال می‌رسد.

پیش نیاز‌ها

پیش از مطالعه این فصل باید بتوانید :

- میتوز و میوز را با هم مقایسه کنید،
- اهمیت قارچ - ریشه‌ای‌ها را شرح دهید،
- همزیستی را تعریف کنید،
- اثر قارچ‌ها را در درمان عفونت‌های باکتریایی شرح دهید.

۱ ویژگی‌های قارچ

قارچ‌ها، خود یک فرمانرو هستند.

تا مدت‌ها، زیست‌شناسان قارچ‌ها و گیاهان را در یک گروه قرار می‌دادند. چون قارچ‌ها هم مثل گیاهان، متحرک نیستند، دیواره سلولی دارند و بعضی از آنها در خاک اندام‌هایی مانند «ریشه» می‌دوازند (شکل ۱۱-۱). اما قارچ‌ها، ویژگی‌های منحصر به‌فردی دارند که باعث شده است آنان را در فرمانروی جداگانه‌ای قرار دهند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:



شکل ۱۱-۱ قارچ‌های چتری

۱- قارچ‌ها هتروتروف هستند: ساقک و کلاهک قارچ چتری، برخلاف ساقه و برگ گیاهان، سبز نیست. قارچ‌ها کلروفیل ندارند و بنابراین قادر به انجام فتوسنتز نیستند. از آنجایی که قارچ‌ها هتروتروف هستند، انرژی خود را از تجزیه مولکول‌های آلی موجود در محیط خود، به‌دست می‌آورند.

۲- قارچ‌ها بدن رشته‌ای دارند: گیاهان از سلول‌ها و بافت‌های مختلفی ساخته شده‌اند، اما قارچ‌ها از رشته‌های باریک و بلندی ساخته شده‌اند که ممکن است محکم به دور یکدیگر پیچند و پیکر قارچ و ساختارهای تولیدمثلی آن را پدید آورند.

۳- سلول‌های قارچ، کیتین دارند: دیواره سلولی قارچ از جنس کیتین است. کیتین، پلی‌ساکارید سختی است که در پوشش خارجی حشرات نیز به کار رفته است. در حالی که دیواره سلولی گیاهان از جنس سلولز است.


۴- قارچ‌ها، میتوز هسته‌ای دارند: تقسیم میتوز در قارچ‌ها با تقسیم میتوز در گیاهان و دیگر یوکاریوت‌ها متفاوت است. در بیشتر یوکاریوت‌ها، پوشش هسته‌ای در پروفاز ناپدید و در تلوفاز دوباره

ظاهر می‌شود. اما در سلول‌های قارچ چتری، پوشش هسته از پروفاز تا تلوفاز حفظ می‌شود. در نتیجه، دوک تقسیم درون هسته شکل می‌گیرد. رشته‌های دوک، کروموزوم‌ها را به سوی دو قطب هسته (نه سلول) می‌کشند و میتوز، با نفوذ پوشش هسته به درون و تقسیم هسته، پایان می‌پذیرد.

ساخтар قارچ برای جذب مواد غذایی مناسب است.

در شکل ۱۱-۲ قارچ پنی‌سیلیوم^۱ را که روی پرنتال رشد کرده است، مشاهده می‌کنید. پرزهای سبز و سفیدی که به عنوان کپک می‌شناسیم، در واقع ساختارهای تولیدمثلی قارچ هستند. پیکر قارچ در لابهای بافت‌های میوه پرنتال جای دارد. پیکر همه قارچ‌ها، به جز مخمرها، از رشته‌های باریکی به نام نخینه^۲ تشکیل شده است. وقتی نخینه رشد می‌کند، منشعب می‌شود و توده‌ای درهم پیچیده و گره خورده می‌سازد که میسلیوم^۳ نام دارد. یک میسلیوم، ممکن است از نخینه‌هایی به طول چندین متر تشکیل شده باشد. این نحوه سازمان‌بندی، موجب افزایش نسبت سطح به حجم می‌شود. بنابراین ساختار قارچ، سازگاری مناسبی برای جذب مواد غذایی از محیط پیدا کرده است.

هر نخینه، رشته سلولی طولی است که در بعضی از گونه‌ها سلول‌های آن بهوسیله دیواره عرضی ناقصی از یکدیگر جدا شده‌اند. بعضی از گونه‌ها، دیواره عرضی ندارند و سیتوپلاسم آنها آزادانه در سراسر نخینه جریان دارد (شکل ۱۱-۲).



شکل ۱۱-۲ - کپک پنی‌سیلیوم.
سطح این میوه پرنتال از نوعی قارچ متعلق به سرده پنی‌سیلیوم پوشیده شده است.

قارچ‌ها چگونه غذای خود را به دست می‌آورند: همه قارچ‌ها با ترشح آنزیم‌های گوارشی، مواد آلی موجود در محیط را به مولکول‌های قابل جذب تجزیه می‌کنند و با جذب این مولکول‌ها، غذای خود را به دست می‌آورند. بسیاری از قارچ‌ها، مواد آلی غیرزنده، مثل شاخه و برگ بر زمین ریخته گیاهان، اجسام حاصل از جانوران و مواد دفعی آنها را تجزیه می‌کنند. این گروه از قارچ‌ها نقش مهمی در بازیافت مواد و برگدازدن آنها به چرخه مواد دارد. بعضی قارچ‌ها انگل هستند و بنابراین غذای خود را از میزان‌های زنده تأمین می‌کنند.


قارچ‌ها اغلب در به دست آوردن مواد غذایی، با آدمی رقابت می‌کنند. نان، میوه، سبزی، یا گوشت هیچ کدام از گزند قارچ‌ها در امان نیستند. قارچ‌ها به مواد غیرغذایی مثل کاغذ، مقوا، لباس، رنگ و چرم نیز حمله می‌کنند. بعضی قارچ‌ها سبب بروز بیماری می‌شوند، مثل قارچی که لای انگشتان پا—به خصوص در ورزشکاران— می‌روید.

توانایی قارچ‌ها در زندگی کردن در شرایط متفاوت، آنان را از نظر اقتصادی ارزشمند ساخته است. مثمر، که قارچی تک سلوی است، در تولید نان به کار گرفته می‌شود. گروهی از قارچ‌ها، طعم و بوی بعضی از پنیرها را باعث می‌شوند. بسیاری از انواع آنتی‌بیوتیک‌ها مانند پنی‌سیلین، توسط قارچ‌ها ساخته می‌شوند.

قارچ‌ها تولید مثل جنسی و غیرجنسی دارند.

قارچ‌ها با رهاسازی هاگ‌هایی که به طریقه جنسی یا غیرجنسی در ساختارهای تولیدمثلی موجود در نوک نخینه پدید آمداند، تکثیر می‌شوند. ساختارهای تولیدمثلی روی سطح منابع غذایی به سرعت رشد می‌کنند. این سازگاری، امکان انتقال هاگ‌ها را به زیستگاه جدید، توسط جریان هوای فراهم می‌کند. هاگ‌های قارچ آنقدر کوچک و سبک‌اند که تا مدت‌ها در هوا معلق می‌مانند و بنابراین باد می‌تواند آنها را تا مسافت‌های طولانی جابه‌جا کند (شکل ۱۱-۳).

هاگ‌های قارچ، هاپلوبیندن. بیشتر آنها توسط میتوуз و طی تولیدمثل غیرجنسی ساخته می‌شوند. در تولیدمثل جنسی، نخینه‌های دو قارچ به یکدیگر ملحق می‌شوند. نخینه‌های الحاق شده، ساختار تولیدمثل جنسی را پدید می‌آورند. در این ساختار، قارچ با الحاق هسته‌هایی که مواد ژنتیک متفاوتی دارند، هاگ‌های جنسی را می‌سازند.



شکل ۱۱-۳- قارچ پنکی. صدها هزار هاگ را از طریق یک شکاف کوچک رها می‌سازند.

فعالیت



آزمایش سریع



برخی از ویژگی‌های کپک نان

همان‌گونه که هر رشتۀ نخ، از تارهای بهم تابیده پنبه ساخته شده است، پیکر قارچ نیز از تارهای سلولی تشکیل شده است

مواد : نان کپک زده، ذره‌بین، تیغ و تیغک شیشه‌ای، میکروسکوپ، قطره‌چکان، حوله کاغذی، بشر ml ۵ و خلال دندان

روش

- ۱- قطعه‌ای نان کپک زده را با ذره‌بین مشاهده کنید
- ۲- آنچه را که با بزرگنمایی ذره‌بین می‌بینید، در دفتر خود رسم کنید
- ۳- از تکه ریزی از نان کپک زده، اسلاید مرطوب سازید
- ۴- اسلاید مرطوب را با بزرگنمایی کم میکروسکوپ مشاهده کنید
- ۵- آنچه را که می‌بینید در دفتر خود رسم کنید

تجزیه و تحلیل

- ۱- وجود ساختارهای برا فاشته قارچ بر سطح نان چه مزیتی دارد؟
- ۲- با استفاده از شکل ۱۱-۲ شکل هایی را که رسم کرده اید نام‌گذاری کنید
- ۳- کار هر یک از ساختارهایی را که نام‌گذاری کرده اید، بیان کنید

خودآزمایی



- ۱- ویژگی های قارچ ها و گیاهان را با هم مقایسه کنید
- ۲- ساختار نخینه و میسلیوم را با هم مقایسه کنید
- ۳- روش های به دست آوردن غذا توسط قارچ ها را به طور خلاصه بیان کنید
- ۴- قارچ ها چه نقشی در محیط بر عهده دارند؟
- ۵- روش های مختلف تولید مثال قارچ ها را به طور خلاصه بیان کنید

۲ گوناگونی قارچ‌ها

قارچ‌ها بر اساس ساختارهای تولیدمثلی گروه‌بندی می‌شوند.

اگر ساختارهای تولیدمثلی قارچ‌ها را بررسی کنید، خواهید دید که قارچ‌ها چقدر گوناگون‌اند. بر اساس نوع ساختارهای تولیدمثلی – که طی تولیدمثل جنسی پدید می‌آیند – قارچ‌ها را به سه شاخه گروه‌بندی می‌کنند. جدول ۱۱–۱ فهرستی از ویژگی‌های این سه شاخه را ارائه می‌دهد.

جدول ۱۱–۱ شاخه‌هایی از فرم‌انوی قارچ‌ها که تولیدمثل جنسی دارند

مثال	ویژگی‌ها	شاخه
کپک سیاه نان	 هاگ‌های جنسی در زیگومیکوتا ^۱ می‌شوند نخینه فاقد دیواره عرضی است	زیگومیکوتا ^۱
مخمر و قارچ فنجانی	 هاگ‌های جنسی در آسک تولید می‌شوند نخینه دیواره عرضی دارد	آسکومیکوتا ^۲
قارچ چتری، قارچ پفکی، زنگ‌ها	 هاگ‌های جنسی در بازیدیوم تولید می‌شوند نخینه دیواره عرضی دارد	بازیدیومیکوتا ^۳

تولیدمثل غیرجنسی : چهارمین گروه قارچ‌ها که نام آن در جدول ۱۱–۱ نیامده است، دئوترومیست‌ها^۴، مشتمل بر قارچ‌هایی است که در آنها تولیدمثل جنسی دیده نمی‌شود. مرسوم است که

۱– Zygomycota

۲– Ascomycota

۳– Basidomycota

۴– Deutromycetes

این گروه را به عنوان یک شاخه در نظر می‌گیرند. اما زیست‌شناسان بر اساس روش‌های مولکولی، بیشتر این قارچ‌ها را که به طور غیر جنسی تولید می‌کنند، در شاخه آسکومیکوتا قرار می‌دهند.


انواع زیادی از قارچ‌ها شناسایی شده‌اند که تولید می‌کنند جنسی ندارند. بسیاری از آنها از نظر اقتصادی حائز اهمیت‌اند. مثلاً بعضی از گونه‌های پنی‌سیلیوم، آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین تولید می‌کنند. گونه آسپرژیلوس در تخمیر سس‌سویا و تولید سیتریک اسید به کار می‌رود. بعضی از دئوترومیست‌ها طعم ویژه بعضی از پنیرها را سبب می‌شوند. قارچ‌هایی که سبب بیماری‌های پوستی (مثل فارج لای انگشتان پا) می‌شوند نیز از دئوترومیست‌ها هستند.

ساخтарهای تولید می‌کنند زیگومیست‌ها دیواره‌های ضخیم می‌سازند.

کپک سیاه نان، ریزوپوس استولونیفر^۱، عضوی از شاخه زیگومیکوتاست. زیگومیکوتا از آنجهت به این نام خوانده می‌شود که ساختارهایی تولید می‌کند با دیواره ضخیم به نام زیگوسپورانژ به وجود می‌آورند.

گونه ریزوپوس و سایر زیگومیست‌ها، در خاک زندگی می‌کنند و از مواد جانوری و گیاهی در حال تجزیه، تغذیه می‌کنند. میسلیوم‌هایی که روی سطح نان رشد می‌کنند، «استولون» نام دارند. نخینه‌هایی که توسط آنها قارچ درون نان نفوذ می‌کنند، ریزوئید نامیده می‌شوند. نخینه زیگومیست‌ها معمولاً دیواره عرضی ندارد.

تولید می‌کنند غیر جنسی در زیگومیست‌ها بسیار شایع‌تر از تولید می‌کنند جنسی است. طی تولید می‌کنند، هاگ‌های هاپلوبیوتیک در اسپوراتر تولید می‌شوند. هاگ‌ها بعد از بالغ شدن رها و بعد توسط جریان هوا به مکان‌های جدید بردگی می‌شوند. در مکان‌های جدید، هاگ‌ها می‌رویند و رشد می‌کنند. آغاز می‌کنند. در تولید می‌کنند جنسی دو نوع آمیزشی مختلف که آنها را با و نشان می‌دهیم؛ به سوی یکدیگر رشد می‌کنند و به هم می‌رسند.



شکل ۱۱-۴- چرخه زندگی زیگومیست‌ها. زیگومیست‌ها تولیدمثل جنسی و غیرجنسي دارند.


آسکومیست‌ها، کیسه‌های هاگ‌دار می‌سازند.

آسکومیست‌ها، ساختارهای تولیدمثلی ویژه‌ای به نام آسک تولید می‌کنند. آسک، کیسه‌ای میکروسکوپی است که در آن هاگ‌های هاپلوبتید تشکیل می‌شوند. آسک‌ها، معمولاً درون نخینه‌های بهم بافتۀ فنجانی شکلی، به نام آسکوکارپ تشکیل می‌شوند. شکل ۱۱-۵ تولیدمثل را در نمونه‌ای از آسکومیست‌ها نشان می‌دهد.

آسکومیست‌ها، معمولاً به طریقه غیرجنسي تولیدمثل می‌کنند. هاگ‌های غیرجنسي در نوک نخینه‌ها تشکیل می‌شوند. هاگ‌ها درون کیسه یا ساختار بخصوصی قرار ندارند. وقتی هاگ‌ها رها می‌شوند، جریان هوای آنها را به نقاط جدید می‌برد. هاگ‌ها در محل جدید می‌رویند و میسلیوم‌های جدید تشکیل می‌دهند.

مخمر، نامی عمومی است که به آسکومیست‌های تک‌سلولی اطلاق می‌شود.

ساکارومیسز سرویزیه^۱ یا مخمر نان سال هاست که برای تولید نان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی از مخمرها مثل کاندیدا آلبیکنژ^۲ برای انسان بیماری‌زا هستند. این مخمرها عامل بیماری برفک دهان‌اند. در این بیماری، زخم‌های سفید یا شیری رنگی در دهان، لب‌ها و گلو شکل می‌گیرد. بیشتر مخمرها با جوانه‌زن تولید می‌کنند. در جوانه‌زن، سلولی کوچک از سلول بزرگ تولید می‌شود به آن چسبیده می‌ماند، یا از آن جدا می‌شود.



شکل ۵-۱۱- چرخه زندگی آسکومیست‌ها. آسکومیست‌ها ممکن است به طریقه جنسی یا غیرجنسی تولید می‌کنند.

با زیدیو میست‌ها هاگ‌های جنسی خود را روی بازیدی می‌سازند. قارچی که احتمالاً شما با آن آشنایی بیشتری دارید، قارچ چتری است. قارچ چتری، متعلق به شاخه بازیدیو میست‌هاست. دیگر بازیدیو میست‌ها عبارت‌اند از: قارچ ژله‌ای و قارچ صدفی. بازیدیو میست‌ها به سبب آن که بازیدیوم تولید می‌کنند، به این نام خوانده می‌شوند.


۱— *Saccharomyces cerevisiae*

۲— *Candida albicans*

بازیدیوم ساختار تولیدمثلى گرز مانندی است که هاگ‌ها روی آن تشکیل می‌شوند. شما می‌توانید این هاگ‌ها در یکی از صفحه‌های بعد، در بخش «قارچ چتری در نمای تزدیک» مشاهده کنید. تولیدمثلي غیرجنسی در میان بازیدیومیست‌ها نادر است و فقط در بعضی از زنگ‌ها و سیاهک‌ها به فراوانی روی می‌دهد. این دو گروه، از بیماری‌زاهاي مهم گیاهان هستند(شکل ۱۱-۶). شکل ۱۱-۷ تولیدمثلي جنسی بازیدیومیست را نشان می‌دهد. بسیاری از قارچ‌های چتری بی‌ضررند، اما بعضی نیز مثل آمانیتا موسکاریا^۱ ممکن است کشنده باشند.



شکل ۱۱-۶-زنگ گندم. زنگ، بازیدیومیستی است که به غلات حمله می‌کند و آنها را برای انسان نامطلوب می‌سازد.



شکل ۷-۱۱- چرخه زندگی بازیدیومیست‌ها. بازیدیومیست‌ها معمولاً به روش جنسی تولید مثل می‌کنند.

خودآزمایی



- ۱- به طور خلاصه بیان کنید که قارچ‌ها چگونه گروه‌بندی می‌شوند
- ۲- دو مورد از کاربردهای اقتصادی قارچ‌ها را بیان کنید
- ۳- ویژگی‌های هر سه شاخه فرم‌زاوی قارچ‌ها را به طور خلاصه بیان کنید
- ۴- ساختار قارچ چتری را توضیح دهید
- ۵- تولید مثل مخمر را توضیح دهید

بیشتر بدانید



قارچ چتری در نمای نزدیک

- نام علمی : آمانیتا موسکاریا

- اندازه : ۱-۱۵cm

- زیستگاه : خاک دارای مواد آلی و مرطوب

- تغذیه : هتروتروف

ویژگی‌ها



ساختار سلولی

دیواره سلولی آمانیتا موسکاریا و دیگر قارچ‌ها، از کیتین ساخته شده است. کیتین، پلی‌ساتکاریدی است که در اسکلت خارجی حشرات نیز یافت می‌شود. در بعضی از قارچ‌ها، نخینه به سلول‌های جداگانه تقسیم شده است، اما تعداد بسیاری هسته در سیتوپلاسم وجود دارد. در دیگر قارچ‌ها، نخینه توسط دیواره‌های منفذداری به نام تیغه (دیواره عرضی) به سلول‌ها تقسیم شده است.

ساختار بدن

بیکر پرسولی قارچ، اساساً رشته‌ای است و از رشته‌های سلولی طویلی به نام نخینه تشکیل شده است. از بهم تابیدن نخینه‌ها، شبکه‌ای تشکیل می‌شود که میسلیوم نام دارد. معمولاً بیشتر میسلیوم در ماده‌ای که قارچ روی آن روبیده است، مثلاً درون خاک، پنهان شده است.

تولید مثل

نخینه‌های زیر خاک در شرایط مناسب، به سوی بالا رشد می‌کنند، بهم می‌تابند و سرانجام آنچه را که ما به عنوان «کلاهک قارچ» می‌شناسیم، تولید می‌کنند «کلاهک قارچ» در واقع ساختار تولیدمثلی آمانیتا موسکاریا است در زیر کلاهک قارچ برآمدگی‌های وجود دارد که هزاران سلول گرزی‌شکل به نام بازیدی روی آنها ساخته می‌شوند طی ادغام و میوز هر بازیدی هاگ‌هایی تولید می‌کند که پس از برآکنده شدن در محیط می‌تواند نخینه‌های جدیدی تولید کند

شیوه تغذیه

قارچ‌ها هتروتروف‌اند آمانیتا موسکاریا نیز مثل سایر قارچ‌ها با ترشح آنزیم‌های گوارشی، مواد آلی موجود در محیط را به مولکول‌های ساده قابل جذب تجزیه می‌کند قارچ‌ها مثل جانوران، کربوهیدرات‌ها را به صورت گلیکوژن ذخیره می‌کنند

۳ همزیستی قارچ‌ها

قارچ‌ها با فتوسنتزکننده‌ها روابط همزیستی دارند.

قارچ‌ها روابط همزیستی مختلفی با جلبک‌ها و گیاهان دارند. این روابط از نظر بوم‌شناختی بسیار حائز اهمیت‌اند. همزیستی یک هترووتروف (قارچ) با یک فتوسنتزکننده (گیاه سبز یا جلبک) از نوع همیاری است. قارچ مواد معدنی موردنیاز را از محیط جذب می‌کند و در اختیار گیاه قرار می‌دهد، گیاه با استفاده از انرژی خورشید به ساختن مولکول‌های آلی موردنیاز خود و قارچ می‌پردازد.

قارچ-ریشه‌ای: قارچ-ریشه‌ای نوعی رابطه همیاری است که بین قارچ و ریشه گیاهان آوندی برقرار می‌شود. نخینه به انتقال فسفر و دیگر مواد معدنی از خاک به ریشه گیاهان کمک می‌کند و گیاه کربوهیدرات‌های موردنیاز خود و نخینه را می‌سازد.

در قارچ-ریشه‌ای، نخینه ممکن است به درون ریشه نفوذ کند یا به دور آن بیچد. در شکل ۱۱-۸ نخینه‌هایی را می‌بینید که به درون ریشه رشد کرده‌اند. مطالعه فسیل‌ها نشان داده است که ساختارهای ریشه‌مانند گیاهان ابتدایی، غالباً قارچ-ریشه‌ای بوده‌اند. دانشمندان براین باورند زمانی که گیاهان به خشکی وارد شدند، خاک فاقد هرگونه ماده آلی بود، اما گیاهان ابتدایی به کمک قارچ-ریشه‌ای‌ها توانستند در خاک غیرحاصل خیز رشد کنند. بعضی از گیاهان آوندی، همکاری خود را با قارچ در قالب قارچ-ریشه‌ای ادامه داده‌اند و توانسته‌اند بقای خود را تا امروز حفظ کنند.



شکل ۱۱-۸- قارچ-ریشه‌ای. هر دو جاندار از این همزیستی سود می‌برند.

قارچ - ریشه‌ای‌های پیرامون بسیاری از ریشه‌های گیاهی، به درون آن نفوذ نمی‌کنند. چنین نوع همزیستی معمولاً بین نوع خاصی قارچ که بیشتر از بازیدبو میست‌هاست، با نوع خاصی از گیاهان برقرار می‌شود. بسیاری از گیاهان، مانند کاج، بلوط و بید از این همزیستی برخوردارند.

گلسنگ

گلسنگ، جانداری استثنایی و حاصل همزیستی بین یک قارچ و یک فتوسنتز‌کننده، مثل جلبک سبز، سیانو باکتری یا هر دو است. جزء فتوسنتز‌کننده، کربوهیدرات‌ها را می‌سازد و جزء قارچی، علاوه بر تأمین مواد معدنی، از جزء فتوسنتز‌کننده، محافظت می‌کند. در بیشتر گلسنگ‌ها، جزء قارچی یک آسکومیست است. وقتی به یک گلسنگ، مثل گلسنگ شکل ۱۱-۹ نگاه می‌کنید، در واقع جزء قارچی گلسنگ را می‌بینید. جزء فتوسنتز‌کننده در لایه‌های نخینه پنهان شده است. نور خورشید از لایه‌های نخینه عبور می‌کند و به جزء فتوسنتز‌کننده می‌رسد.

ساختار مستحکم قارچ، همراه با توانایی فتوسنتزی جلبک یا سیانو باکتری، به گلسنگ امکان می‌دهد تا در شرایط سخت نیز به حیات خود ادامه دهد. در بیابان‌های بایر، در قطب شمال، روی خاک بدون گیاه، روی صخره‌های داغ آفتاب‌خورده و روی تنه درختان، گلسنگ‌ها را می‌توان یافت. به یاد بیاوریم که گلسنگ‌ها اولین جانداران اکوسیستم‌ها هستند که در محل جدید، جایگزین می‌شوند و اکوسیستم را بنیان می‌نهند. گلسنگ‌ها با خرد کردن سنگ‌ها، محیط را برای ورود دیگر جانداران مهیا می‌کنند. گلسنگ‌ها نقشی کلیدی در ایجاد اکوسیستم‌ها دارند؛ چون قادرند نیتروژن را تثبیت کنند و آن را به صورتی که برای جانداران قابل استفاده باشد، به محیط وارد کنند.

گلسنگ‌ها می‌توانند در برابر خشکی و انجماد مقاومت کنند. در چنین شرایطی آنان به خواب می‌روند. وقتی که رطوبت و گرمای دوباره به محیط باز می‌گردد، گلسنگ‌ها رشد خود را از سر می‌گیرند. در شرایط سخت، گلسنگ‌ها ممکن است به آهستگی رشد کنند. بعضی از آنها که در کوهستان می‌رویند، چند هزار سال عمر دارند اما سطحی را که می‌پوشانند، بیشتر از سطح کف دست نیست. این گلسنگ‌ها جزء کهن‌ترین جانداران روی کره زمین‌اند. گرچه گلسنگ‌ها می‌توانند در دماهای زیاد یا کم زندگی کنند، اما نسبت به تغییرات شیمیایی محیط، حساس‌اند. به همین سبب، آنان ابزارهای زنده‌ای برای سنجش کیفیت هوا به شمار می‌روند.



شکل ۱۱-۹- گلسنگ‌ها. جلبک‌ها، سلول‌های سبزی که در ریزنگار می‌بینند، جزء فتوسترنزکننده گلسنگ هستند.

فعالیت



اثر قارچ - ریشه‌ای بر رشد گیاه

دو گروه از گیاهان، یکی در خاک ستررون و دیگری در خاک غیرستررون کاشته می‌شوند. بقیه شرایط آزمایش برای هر دو گروه یکسان است. بعد از ۱۸ هفته، وضعیت رشد گیاهان به صورتی بوده است که در شکل می‌بینید. با توجه به این شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱- رشد دو گروه را با یکدیگر مقایسه کنید. کدام یک رشد سریع‌تری داشته است؟

۲- توضیح دهید که چرا یک گروه نسبت به گروه دیگر رشد بهتری داشته است؟

۳- علت رشد کمتر در گیاه کوچک‌تر چه بوده است؟

۴- برای جبران کاهش رشد گیاهان کوچک‌تر چه راهی پیشنهاد می‌کنید؟





گلسنگ‌ها، دیدهبانان محیط زیست

از دهه ۱۹۵ به بعد، دانشمندان دریافتند که بیشتر گلسنگ‌ها برای رشد کردن به هوای پاکیزه نیاز دارند مثلاً مشاهده کرده‌اند که افزایش مه – دود موجب تاپید شدن گلسنگ‌ها می‌شود علاوه بر این، در جاهایی که هوای پاکیزه وجود دارد، گلسنگ‌ها فراوانی بیشتری دارند به همین سبب، دانشمندان از گلسنگ‌ها برای نشان دادن آلودگی هوا استفاده می‌کنند

چرا گلسنگ‌ها ابزارهای خوبی برای نشان دادن آلودگی هوا هستند؟

گلسنگ‌ها ریشه ندارند بنابراین مواد غذایی موردنیاز خود را باید از هوا جذب کنند باران، مه و شیمی، سطح گلسنگ را مرتقب می‌کند در نتیجه گلسنگ می‌تواند ماده غذایی و هر نوع ماده آلوده‌کننده‌ای را که در هوا وجود دارد، جذب کند

گلسنگ‌ها می‌توانند قرن‌ها زندگی کنند به همین سبب برای مطالعه تغییرات آلودگی هوا طی دوره‌های زمانی طولانی، بسیار مناسب‌اند بسیاری از گونه‌های گلسنگ پراکنده‌گی چگونه‌ای وسیعی دارند بنابراین، می‌توان برای نشان دادن کیفیت هوا در فواصل مختلفی نسبت به منبع آلودگی، مثل کارخانه یا نیروگاه، تنها از یک گونه گلسنگ استفاده کرد

چگونه از گلسنگ‌ها برای نشان دادن آلودگی هوا استفاده می‌کنند؟

برای نشان دادن کیفیت هوای یک منطقه به وسیله گلسنگ‌ها، دانشمندان اغلب از پراکنده‌گی گلسنگ‌ها در منطقه موردنظر نفشه‌برداری می‌کنند سپس تعداد گونه‌ها و فراوانی هر یک را شمارش و بعد مجموع سطح اشغال شده به وسیله هر گونه از گلسنگ‌ها را محاسبه می‌کنند اگر نقشه‌برداری طی سال‌های متتمدی انجام شود، امکان نشان دادن تغییرات در از مدت فراهم می‌شود دانشمندان با اندازه‌گیری غلظت فلزات و سایر آلاینده‌ها در گلسنگ‌ها، می‌توانند اطلاعات کامل‌تری درباره آلودگی هوا به دست آورند همچنین آنان می‌توانند با اندازه‌گیری میزان کلروفیل موجود در گلسنگ از آهنگ فتوسنتر و از میزان سلامتی آن آگاه شوند

برای بررسی آلودگی هوا در منطقه‌ای که در آن هیچ گلسنگی نیست، دانشمندان گلسنگ‌ها را از منطقه‌ای که به طور طبیعی گلسنگ دارد به منطقه بدون گلسنگ منتقل می‌کنند سپس آنان گلسنگ‌ها را از نظر مواد آلاینده مورد بررسی قرار می‌دهند و هر گونه تغییر در سلامت گلسنگ‌ها را ثبت می‌کنند آنان همچنین به اثرات ناشی از جابه‌جا کردن گلسنگ‌ها توجه دارند

فعالیت



۱- ساختار زیگوپوراز ریزوپوس استولونیفر را توصیف کنید و توضیح دهید این ساختار

چه نقشی در بقای گونه ایفا می کند

۲- توضیح دهید که چرا و چگونه از گلشنگ ها برای نشان دادن کیفیت هوا استفاده

می کنند؟


۳- بگویید هریک از شکل های زیر به کدام گروه از قارچ ها متعلق اند و نحوه تولید مثل هر کدام

چگونه است؟



۴- نمودار زیر، مقدار قارچ های خوارکی برداشت شده را در یک جنگل طی یک دوره زمانی

خاص و نیز مساحت جنگل درختان بلوط را طی همان دوره زمانی، نشان می دهد



قارچ دنبالان در جنگل بلوط

الف - چه رابطه ای بین میزان قارچ های برداشت شده و جنگل زدایی وجود دارد؟

ب - اگر کشاورزان منطقه بخواهند مقدار برداشت قارچ در سطح فعلی خود ثابت بماند، به

آن چه پیشنهادی می کنید؟

۵- با توجه به نوع متابولیسم گلسنگ‌ها، فکر می‌کنید که گلسنگ‌ها ابتدا در چه نوع محیطی تکامل یافته باشند؟

خودآزمایی ?

- ۱- دو نوع همزستی را که در آنها قارچ شرکت دارد، توضیح دهید
- ۲- قارچ-ریشه‌ای چه فایده‌ای برای گیاه دارد؟
- ۳- گلسنگ از چه اجزایی تشکیل شده است؟
- ۴- توانایی به خواب رفتن گلسنگ‌ها چه ارتباطی با عمر طولانی آنها دارد؟

پیوست‌ها

توجه مطالب بخش پیوست (از این جاتا انتهای کتاب) جزء مطالب «بیشتر بدانید» است و برای ارجاع و اطلاع بیشتر دانش آموزان آورده شده است

نظام طبقه‌بندی پنج فرمانرویی

این نظام شامل فرمانروهای باکتری‌ها، آغازیان، قارچ‌ها، گیاهان و جانوران است. البته در مورد تعداد فرمانروها و تعداد گونه‌های جانداران، در بین زیست‌شناسان اختلاف نظر وجود دارد حتی برخی از آنها به تازگی نظام طبقه‌بندی با شش فرمانرو را پذیرفته‌اند در نظام شش فرمانرویی، فرمانرو آرکی باکتری‌ها را از فرمانزو باکتری‌ها جدا کرده‌اند.

۱- فرمانروی باکتری‌ها

شاخه یوباكتری‌ها (*Eubacteria*) : این شاخه بیشتر از ۴ گونه دارد؛ بدین آنها از یک سلول تشکیل شده است؛ پروکاریوت هستند؛ اندامک‌های غشایی ندارند؛ روش تغذیه آنها اساساً از طریق هتروترووفی (از طریق جذب غذا) است اما در میان آنها انواع فتوسترنزکننده و شیمیوسترنزکننده هم دیده می‌شود؛ تولید مثل آنها عمولأً از طریق تقسیم (دواتی) یا جوانهدن است

سیانوباكتری‌ها (*Cyanobacteria*) : فتوسترنزکننده‌اند، با یک پوشش رنگدانه‌دار احاطه شده‌اند؛ عمولأً روی خشکی یا در اقیانوس‌ها دیده می‌شوند؛ احتمالاً اجداد کلروپلاست‌های برخی از آغازیان بوده‌اند
نمونه : آنابنا (*Anabaena*)، اُسیلاتوریا (*Oscillatoria*) و اسپیرولینا (*Spirulina*)

اتوتروف‌های شیمیوسترنزکننده (*Chemoautotrophs*) : باکتری‌های باستانی هستند که بدون نیاز به نور خورشید یا سایر موجودات زنده، قادر به زندگی‌اند؛ انرژی را از گازهای احیاشده آمونیاک (NH_3)، متان (CH_4) و سولفید هیدروژن (H_2S) به دست می‌آورند؛ در چرخه‌های نیتروژن زمین نقش حساسی دارند و شامل نیتروباكتری‌ها و سولفوباكتری‌ها هستند

نمونه : نیتروزومonas (*Nitrosomonas*) و نیتروبакتر (*Nitrobacter*)
انترباكتری‌ها (*Enterobacteria*) : باکتری‌های میله‌ای شکل، بدون انعطاف و هتروتروف‌اند؛ ممکن است

هوازی یا بیهوازی باشند؛ تازک دارند؛ عامل بسیاری از بیماری‌های شدید گیاهی و انسانی هستند

نمونه: اشتریشیاکولی (*Escherichia coli*) و سالمونلاتیفی موریوم (*Salmonella typhimurium*)

سودومونادها (*Pseudomonads*): باکتری‌های میله‌ای راست یا خمیده با تازکی در یک انتهای خود هستند؛ کاملاً هوازی‌اند؛ معمولاً در خاک دیده می‌شوند و بسیاری از آنها در گیاهان تولید بیماری می‌کنند

نمونه: سودوموناس آئروژینوزا (*Pseudomonas aeruginosa*)

اسپیروکت‌ها (*Spirochaetes*): سلول‌هایی مارپیچی و دراز هستند که در هر انتهای خود تازک دارند؛ عامل ایجاد بیماری‌های شدیداند

نمونه: تربونما پالیدوم (*Treponema pallidum*) و بورلیا بورگدورفری (*Borrelia burgdorferi*)

اکتینومیست‌ها (*Actinomycetes*): باکتری‌های رشته‌ای شکل که اغلب با فارج‌ها اشتباہ گرفته می‌شوند هاگ تولید می‌کنند؛ منابع تولید آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند: استریتو‌ماسین، ترازاپیکلین و کلامفینیکل هستند؛ موجب بیماری‌های نظری پلاک دندانی، جذام و سل می‌شوند

نمونه: مایکو‌باکتریوم توبرکولوسیس (*Mycobacterium tuberculosis*)

ریکتتسیاها (*Rickettsias*): باکتری‌های انگل هستند که درون سلول‌های مهره‌داران و بندپایان زندگی می‌کنند

نمونه: ریکتسیا ریکتسیی (*Rickettsia rickettsii*)

باکتری‌های لیز و لزج که جوانه می‌زنند: دارای سلول‌های میله‌ای شکل‌اند؛ پلی‌ساکاریدهای لیز و لزج کننده ترشح می‌کنند؛ اغلب به صورت توده‌های لزج مجتمع می‌شوند و اساساً در خاک زندگی می‌کنند

نمونه: میکسو‌باکتری‌ها (*Myxobacteria*)

شاخه آرکی‌باکتری‌ها (*Archaeabacteria*): این شاخه کمتر از ۱ گونه را تشکیل می‌دهد؛ شامل باکتری‌های هوازی و غیرهوازی‌اند که با محیط‌های افراطی سازگار شده‌اند؛ پروکاریوت‌اند؛ از نظر ساختار دیواره و غشاء سلول با سلول‌های یوکاریوت متفاوت‌اند؛ شباهت‌های آنها به یوکاریوت‌ها این نظریه را ایجاد می‌کند که آرکی‌باکتری‌ها در مقایسه با یوکارکری‌ها، واستگان بسیار نزدیکتر یوکاریوت‌ها هستند؛ فقط به طریقهٔ غیرجننسی تولید می‌کنند و به سه گروه بزرگ تقسیم می‌شوند؛ اگرچه شواهدی وجود دارد که به طور آزاد در اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند اما هنوز در آزمایشگاه‌ها کشته داده نشده‌اند

متانوژن‌ها (*Methanogens*): تولید کنندگان بیهوازی متنان هستند؛ بیشتر گونه‌های آنها، دی‌اکسید کربن را به عنوان منبع کربن به کار می‌برند؛ در خاک و باتلاق‌ها سکونت دارند و از بقایای جانوران، به خصوص پستانداران علف‌خوار مثل گاو، قنده می‌کنند؛ سالانه نزدیک به دو تریلیون کیلوگرم گاز متنان تولید می‌کنند

نمونه: متانوبروی باکتر روماتایوم (*Methanobrevibacter ruminantium*)

ترمو‌اسیدوفیل‌ها (*Thermoacidophiles*): در محیط‌های داغ اسیدی سکونت دارند؛ می‌توانند حرارت‌های بالا را تحمل کنند؛ به گوگرد نیاز دارند؛ اغلب غیرهوازی‌اند

نمونه: سولفولوبوس سولفاتاریکوس (*Sulfolobus solfataricus*)

هالوفیل‌های افراطی (*Extreme halophiles*): در محیط‌های محتوی نمک با غالب‌تی بسیار بالا (شوری ۱۵

تا ۲ درصد) مثل بحرالمیت و دریاچه‌های نمک سکونت دارند؛ بسیاری از آنها هوازی و گرم منفی اند

نمونه : هالوباکتروئیدز هولوپیوس (*Halobacteroides holobius*)

۲- فرمانروی آغازیان

در حدود ۴۳ گونه یوکاریوت هستند که گیاه، قارچ یا جانور نیستند؛ فرمانرویی است که از نظر ساختاری بیشترین گوناگونی را دارد؛ موجودات آن تکسلولی با پرسلولی اند؛ هسته آنها غشا دارد؛ تقریباً همه دارای کروموزوم، میتوکندری و سازمان غشایی درون سلولی اند؛ بسیاری از آنها دارای کلروپلاست‌اند و اکثربت آنان دیواره سلولی دارند؛ بهروش جنسی و غیرجنسی تولیدمثل می‌کنند؛ آبزی یا انگل‌اند؛ بسیاری از آنها نیز در خاک زندگی می‌کنند

شاخه ریزوپودا (Rhizopoda) (آمیب‌ها) : حدود ۳ گونه را شامل می‌شوند؛ تکسلولی و هتروتروف‌اند؛ سلول‌های بی‌شکلی هستند که به‌کمک برآمدگی‌های سیتوپلاسمی به نام پای کاذب، حرکت می‌کنند و شامل آمیب‌ها هستند

شاخه فورامینی فرا (روزنداران) (Foraminifera) : حدود ۳ گونه را تشکیل می‌دهند؛ تکسلولی و هتروتروف و دریازی‌اند؛ پوسته‌ای از جنس مواد آلی دارند و دارای منافذی هستند که از آنها رشته‌های سیتوپلاسمی بیرون زده‌اند

نمونه : هتروستجینا دپرسا (*Heterostegina depressa*)

شاخه باسیلاری فیتا (دیاتوم‌ها) (Bacillariophyta) : بیش از ۱۱۵ گونه هستند که تک‌سلولی و فتوسترنزکننده‌اند؛ پوسته منحصر به‌فردی از جنس سیلیس شیری رنگ ترشح می‌کنند که شبیه جعبه‌ای با یک درپوش است؛ کلروپلاست‌های آنها شبیه به کلروپلاست‌های جلبک‌های قهوه‌ای است و محتوی کلروفیل‌های نوع a و c و e و g و k و m است؛ این شاخه شامل دیاتوم‌هاست

شاخه کلروفیتا (جلبک‌های سبز) (Chlorophyta) : این شاخه حدود ۷ گونه دارد؛ در این شاخه، اشکال تک‌سلولی، کلونی و پرسلولی دیده می‌شود؛ فتوسترنزکننده و محتوی کلروفیل‌های a و b هستند؛ کلروپلاست‌های شبیه گیاهان دارند؛ دانشمندان فکر می‌کنند که گیاهان از این گروه مشتق شده‌اند؛ این شاخه شامل جلبک‌های سبز است

نمونه : کلامیدومonas (*Chlorella*), کلرلا (*Oedogonium*), اودوگونیم (Oedogonium)، اسپیروژر

(Spirogyra)، اولوا (کاهوی دریابی) (*Ulva*)، ولوکس (*Volvocales*)

شاخه رودوفیتا (جلبک‌های قرمز) (Rhodophyta) : حدود ۴ گونه‌اند؛ تقریباً همه آنها پرسلولی و فتوسترنزکننده‌اند؛ بیشتر آنها دریازی‌اند؛ دارای کلروفیل‌های a و c و فیکوبلین‌ها هستند؛ کلروپلاست‌های آنها احتمالاً از سیانوباکتری‌های هم‌زیست به‌دست آمده‌اند این شاخه شامل جلبک‌های قرمز است

نمونه : پُورفیرا (*Porphyra*)

شاخه فتوفیتا (جلبک‌های قهوه‌ای) (Phaeophyta) : حدود ۱۵ گونه‌اند؛ پرسلولی و فتوسترنزکننده‌اند؛ تقریباً همه آنها دریازی‌اند؛ دارای کلروفیل‌های a و c و فوکوگزانین هستند و به همین دلیل رنگ آنها مایل به قهوه‌ای است؛ این شاخه شامل جلبک‌های قهوه‌ای است

نمونه : فوکوس (*Fucus*), لامیناریا (*Laminaria*), پوستلزیا (*Postelsia*), سارگاسوم (*Sargassum*)

شاخه دینوفلاغلاتا (تاژکداران چرخان) (Dinoflagellata) : این شاخه بیشتر از ۲۱ گونه تک‌سلولی دارد

و شامل گونه‌های هتروتروف و اوتتروف است؛ بیشتر آنها دریازی‌اند؛ بدنشان با دو صفحه سلولزی محصور شده است؛
دارای کلروفیل‌های a و c و کاروتینیدها هستند؛ این شاخه شامل دینوفلازلاتاهاست
نمونه: گونیولاس (Gonyaulax)، نوکتیلو کا (Noctiluca)

شاخه زئوماستی‌جینا (تازکداران جانورمانند) (Zoomastigina): حدود ۳ گونه دارد؛ بیشتر آنها
تکسلولی و هتروتروف‌اند؛ همه آنها حادقی یک تازک دارند؛ این شاخه شامل زئوماستی‌جیناهاست
نمونه: ژیاردیا (Giardia)، لیشمانیا (Leishmania)، تریبانوزوما (Trypanosoma)

شاخه اوگلنوفیتا (اوگلناها) (Euglenophyta): این شاخه حدود ۱ گونه دارد؛ تکسلولی‌اند، شامل
گونه‌های فوسنتزکننده و هتروتروف است؛ تولیدمیل غیرجنSSI دارند؛ بیشتر آنها در آب شیرین زندگی می‌کنند؛
کلروپلاست‌های آنها شبیه جلبک‌های سبز است و تصور می‌شود که از باکتری‌های همزیست مشابه نتیجه شده باشند؛
این شاخه شامل اوگلنوفیدها است
نمونه: اوگلنا (Euglena)

شاخه سیلیوفورا (مزکداران) (Ciliophora): در این شاخه حدود ۸ گونه وجود دارد؛ دارای سلول‌های
منفرد بسیار پیچیده‌اند؛ هتروتروف‌اند؛ ردیف‌هایی از مژک دارند و دو نوع هسته در سلول آنها وجود دارد؛ این شاخه
شامل مژکداران است

نمونه: دیدینیوم (Didinium)، پارامسیوم (Paramecium)، استنتور (Stentor)، ورتیسلا (Vorticella)
شاخه آکرازیومیکوتا (کپک‌های مخاطی سلولی) (Acrasiomycota): این شاخه حدود ۷ گونه دارد؛
هتروتروف‌اند؛ سلول‌های آمیبی‌شکلی دارند که وقتی از غذا محروم می‌شوند به صورت یک توده متحرک مجتمع می‌شوند؛
سلول‌های درون این توده، غشاها خود را حفظ می‌کنند و آمیخته‌نمی‌شوند و هاگ‌هایی تولید می‌کنند که آمیبی‌شکل‌های
جدیدی را در جای دیگر تشکیل می‌دهند؛ این شاخه شامل کپک‌های مخاطی است
نمونه: دیکتیوستلیوم (Dictyostelium)

شاخه میکسومیکوتا (کپک‌های مخاطی پلاسمودیومی) (Myxomycota): این شاخه حدود ۵ گونه دارد
که هتروتروف‌اند؛ یک توده سیتوپلاسمی چند‌هسته‌ای شناوراند؛ آنها می‌توانند هاگ‌هایی را به وجود آورند که در یک
محیط مناسب‌تر، فرد جدیدی را پدید آورند؛ این شاخه شامل کپک‌های مخاطی پلاسمودیال است
نمونه: فیزاروم (Physarum)

شاخه آئومیکوتا (Oomycota): این شاخه حدود ۵۸ گونه هتروتروف دارد؛ انگل یا تجزیه‌کننده‌اند؛ دیواره
سلولی آنها از سلولز تشکیل شده است و مانند قارچ‌ها کیتینی نیست؛ این شاخه شامل کپک‌های آبزی، زنگ‌های سفید
و میلدوهاای کرکدار است
نمونه: فیتوفتورا (Phytophthora)

شاخه آپی‌کمپلکسا (هاگ‌داران) (Apicomplexa): حدود ۳۹ گونه تکسلولی، هتروتروف و غیرمتحرک
دارد؛ انگل‌هایی هاگ مانند در جانوران هستند و چرخه‌های پیچیده‌ای در طول دوره زندگی خود دارند؛ به دو روش
جنSSI و غیرجنSSI تولیدمیل می‌کنند؛ این شاخه شامل اسپوروزوئن (Sporozoan) هاست

نمونه: پلاسمودیوم (Plasmodium)، توکسوپلاسما (Toxoplasma)

۳- فرمانروی قارچ‌ها

حدود ۷۷ گونه هستند؛ یوکاریوت‌های هتروتروف با تغذیه از راه جذب، همگی به جز مخمرها پرسلوی اند؛ تقریباً همگی خاکزی اند؛ بدن برخی از آنها از رشته‌هایی به نام هیف تشکیل شده است و چندسته‌ای است که بین سلول‌ها دیواره‌بندی ناقصی وجود دارد که سپتوم (دیواره عرضی) نام دارد؛ دیواره سلول‌ها از کپتین ساخته شده است؛

حدود ۱۷ گونه از آنها (دوترومیست‌ها) (*Deuteromycetes*) فاقد مرحله جنسی اند

شاخه زیگومیکوتا (Zygomycota) : حدود ۶۶۵ گونه هستند؛ معمولاً فاقد سپتوم (دیواره عرضی) اند؛ ترکیب هیف‌ها منجر به تشکیل تخم می‌شود که هنگام روش، به روش میوز تقسیم می‌شود؛ خاکزی یا انگل اند؛ این شاخه شامل کپک‌های نان است

نمونه : پیلوبولوس (*Pilobolus*)، ریزوپوس (*Rhizopus*)

شاخه آسکومیکوتا (Ascomycota) : حدود ۳ گونه هستند؛ هیف‌ها معمولاً دارای دیواره‌های عرضی سوراخ دارند؛ ترکیب هیف‌ها، منجر به تشکیل توده درهم بافتۀ متراکمی می‌شود که دارای ساختارهای تولیدمثی مشخص که آسک نامیده می‌شود؛ بسیاری از قارچ‌های که از نظر شکل با عنوان قارچ‌های ناقص طبقه‌بندی شده بودند، اکنون در این شاخه قرار گرفته‌اند؛ این شاخه دارای گونه‌های خاکزی، دریازی یا ساکن در آب شیرین است؛ این شاخه شامل مخمرنان و مخمر آب‌جو، کپک‌ها و بعضی قارچ‌های خوراکی است

نمونه : نوروسپورا (*Saccharomyces*)، ساکارومیسپس (*Neurospora*)

شاخه بازیدیومیکوتا (Basidiomycota) : حدود ۱۶ گونه هستند؛ هیف‌ها معمولاً دیواره‌های عرضی ناقص دارند؛ تولیدمثی نوعاً به طریقه جنسی است ترکیب هیف‌ها، منجر به تشکیل ساختارهای تولیدمثی درهم بافتۀ متراکمی (قارچ چتری) می‌شود که در زیر میکروسکوپ دارای ساختارهای مشخص است و بازیدی نام دارد؛ این شاخه شامل قارچ‌های چتری، قارچ‌های چتری سمی، زنگ‌ها و سیاهک‌هاست

همزیستی قارچی : حدود ۲ گونه از قارچ‌ها باگروههای دیگر همزیستی دارند؛ این قارچ‌ها با گیاهان، جلبک‌های سبز و سیانوبکتری‌ها همکاری‌هایی را به شکل همزیستی به وجود می‌آورند

گلسنگ‌ها : حدود ۱۵ گونه‌اند؛ در این گروه، ارتباطهای همزیستی بین قارچ‌ها (تقریباً همیشه آسکوسبیت‌ها) و سیانوبکتری‌ها، جلبک‌های سبز با هر دوی آنها وجود دارد جزء فتوسنتز کننده در بین هیف‌های قارچ زندگی می‌کند قارچ انرژی مورد نیاز خود را از جزء فتوسنتز کننده خود کسب می‌کند

قارچ ریشه‌ها (Mycorrhizae) : حدود ۵ گونه‌اند در این گروه، ارتباطهای همزیستی بین قارچ‌ها و ریشه‌های گیاهان برقرار می‌شود؛ ۸ درصد گیاهان، قارچ-ریشه‌هایی دارند که باریشه آنها در ارتباط است؛ گیاه قندهای مورد نیاز را برای قارچ فرامم می‌کند و قارچ نیز به نوبه خود، بعنوان ریشه‌های کمکی به گیاه خدمت می‌کند؛ به طوری که سطح منطقه قابل دسترس برای جذب مواد معدنی را به مقدار زیاد افزایش می‌دهد

۴- فرمانروی گیاهان

حدود ۲۸ گونه‌اند؛ پرسلوی، یوکاریوت، اغلب اتوتروف و خشکی‌زی، دارای بافت‌ها و اندام هستند؛ دیواره سلولی سلولزی دارند؛ پلاستیدهای آنها محتوى کلروفیل‌های a و b است؛ چرخه زندگی آنها دارای تناوب نسل‌هاست.

شاخه خزه‌ای‌ها : حدود ۱ گونه‌اند؛ گیاهانی بدون آوند هستند؛ گامتوفت آنها بزرگ‌تر از اسپوروفیت است؛ اسپوروفیت‌ها روی گامتوفت‌ها رشد می‌کنند؛ بافت‌های هادی ساده‌ای دارند؛ فاقد ریشه، ساقه و برگ هستند؛ این شاخه شامل خزه‌هاست

نمونه : اسفاگنوم (*Sphagnum*)

شاخه هپاتوفیتا (چگرواش‌ها) : حدود ۶ گونه‌اند؛ گیاهانی بدون آوند هستند؛ گامتوفت آنها بزرگ‌تر از اسپوروفیتاهاست و اسپوروفیت‌ها روی گامتوفت‌ها رشد می‌کنند؛ فاقد روزنه، ریشه، ساقه و برگ هستند این شاخه شامل چگرواش‌ها هستند

نمونه : مارکانسیا (مارچانتیا (*Marchantia*)

شاخه آنتوسروفیتا : حدود ۱ گونه‌اند؛ گیاهانی بدون آوند هستند؛ گامتوفت آنها بزرگ‌تر از اسپوروفیت‌ها روی گامتوفت‌ها رشد می‌کنند؛ اسپوروفیت‌ها روزنه‌دارند؛ فاقد ریشه، ساقه و برگ‌اند؛ شامل شاخه‌اش‌ها هستند

نمونه : آنتوسروز (*Anthoceros*)

شاخه پتروفیتا (Pterophyta) : حدود ۱۱ گونه‌اند؛ گیاهان آونددار بدون دانه‌اند؛ اسپوروفیت آنها بزرگ‌تر از گامتوفت‌هاست؛ اسپوروفیت‌ها ریشه، ساقه و برگ دارند که در سطوح زیرین خود هاگ تولید می‌کنند؛ گامتوفت‌ها کوچک، مسطح و مستقل‌اند؛ شامل سرخس‌ها هستند

نمونه : سالوینیا (*Salvinia*)

شاخه پنجه‌گرگیان : حدود ۱ گونه‌اند گیاهان آونددار بدون دانه‌اند؛ اسپوروفیت آنها بزرگ‌تر از گامتوفت‌هاست اسپوروفیت‌ها در مخروط‌های شیبیه گامتوفت‌های خزه، هاگ تولید می‌کنند؛ دارای ریشه، ساقه و برگ‌اند؛ گامتوفت‌ها کوچک، مسطح و مستقل هستند؛ این شاخه شامل پنجه‌گرگ‌هاست

نمونه : پنجه‌گرگ و علف خوک

شاخه دم‌اسپیان : حدود ۱۵ گونه‌اند گیاهان آوندی بدون دانه‌اند؛ اسپوروفیت آنها بزرگ‌تر از گامتوفت‌هاست؛ اسپوروفیت‌ها، هاگ‌ها را در مخروط‌های تولید می‌کنند؛ دارای ریشه، برگ و ساقه‌های متصل بهم هستند؛ گامتوفت‌ها کوچک، مسطح و مستقل‌اند؛ این شاخه شامل دم‌اسپ‌هاست

نمونه : دم‌اسپ

شاخه بر亨درست‌ها : تنها حدود چند گونه‌اند؛ گیاهان آوندی بدون دانه‌اند؛ اسپوروفیت آنها بزرگ‌تر از گامتوفت‌هاست؛ اسپوروفیت‌ها، هاگ‌ها را در اسپورات‌های (هاگدان‌های) واقع در نوک ساقه‌ها، تولید می‌کنند؛ دارای ریشه و ساقه هستند ولی برگ ندارد؛ گامتوفت‌ها کوچک، مسطح و مستقل‌اند

نمونه : پسیلوتوم (*Psilotum*)

شاخه مخروطداران : حدود ۵۵ گونه‌اند؛ بازدانه‌اند؛ گیاهان دانه‌دارند که دانه‌های بر亨ه تولید می‌کنند؛ اسپوروفیت‌ها اغلب درختان یا بوته‌های همیشه سبز با برگ‌های سوزنی یا فلزی شکل است؛ گامتوفت‌های نر و ماده میکروسکوپی اند و از هاگ‌هایی که درون مخروط‌هایی بر روی اسپوروفیت‌ها تولید می‌شوند، به وجود می‌آیند این شاخه شامل کاج‌ها، سروها، صنوبرها، کاج‌های سیاه، سرخدارهاست

نمونه : کاج، سرخدار و سرو

شاخه سیکادو فیتا (Cycadophyta) : حدود ۱ گونه‌اند؛ بازدانه‌اند؛ گیاهان دانه‌داری هستند که دانه‌های برهمه تولید می‌کنند؛ اسپوروفیت‌ها بوته‌ها و درختان همیشه‌سبز با برگ‌های شبیه نخل هستند؛ گامتوفیت‌های نر و ماده میکروسکوپی‌اند و از اسپورهای تولیدی در درون مخروط‌هایی بر اسپوروفیت‌های جدا، به وجود می‌آیند؛ این شاخه شامل سیکاده‌است

نمونه : سیکاس (Cycas)

شاخه ژینگکوفیتا (Ginkgophyta) : یک گونه است؛ بازدانه است؛ گیاه دانه‌داری است که دانه‌های برهمه تولید می‌کند؛ اسپوروفیت درختی خزان‌پذیر با برگ‌های بادبزنی‌شکل و دانه‌های آبدار (گوشتمی) است؛ گامتوفیت نر و ماده میکروسکوپی است و از هاگ‌های تولیدشده به وسیله اسپوروفیت‌های جدا، به وجود می‌آید؛ این شاخه شامل ژینگکوپیلوپا (*Ginkgo biloba*) است

شاخه گنتوفیتا (Gnetophyta) : حدود ۷ گونه‌اند؛ بازدانه‌اند؛ گیاهان دانه‌داری هستند که دانه‌های برهمه تولید می‌کنند؛ اسپوروفیت‌های بوته‌ها یا پیچک‌هایی با برخی خصوصیات گیاهان نهان‌دانه است؛ گامتوفیت‌های نر و ماده میکروسکوپی‌اند و از اسپورهای تولیدی در درون مخروط‌های روی اسپوروفیت‌ها، به وجود می‌آیند؛ این شاخه شامل گنتوفیت‌هاست

نمونه : افردا (Ephedra)، ولوبیچا (Welwitschia)

شاخه گیاهان نهان‌دانه (گلدار) : حدود ۲۵ گونه‌اند؛ گیاهان دانه‌داری هستند که دانه‌هایی درون یک میوه تولید می‌کنند؛ اسپوروفیت‌ها درخت‌ها، بوته‌ها، علف‌ها یا پیچک‌هایی هستند که گل تولید می‌کنند؛ گامتوفیت‌های نر و ماده میکروسکوپی هستند و از اسپورهای تولید شده درون ساختارهای تولیدمثلی یک گل به وجود آمدند؛ این شاخه شامل گیاهان گلدار است

نمونه : گل مینا، گوجه، بلوط، ذرت

رده تک‌لپه‌ای‌ها : حدود ۷ گونه‌اند؛ در این شاخه، جنین‌ها یک لپه دارند؛ بخش‌های گل مضربي از سه است رگبرگ‌های برگ‌ها موازي است و دسته‌های آوندي در بافت ساقه پراکنده‌اند؛ این شاخه شامل گندميان، جگن‌ها، لاله‌ها، زنبق‌ها، نخل‌ها و اركيده‌هاست

رده دولپه‌ای‌ها : حدود ۱۸ گونه‌اند؛ در این شاخه، جنین‌ها دو لپه دارند؛ بخش‌های گل مضربي از دو، چهار یا پنج است؛ برگ‌ها رگبرگ‌های مشبك دارند؛ دسته‌های آوندي در ساقه‌ها به صورت حلقه‌هایي آرایش پیدا کرده‌اند؛ این شاخه شامل گل‌های آفتاب‌گردان، رُزها، افراها و نارون‌هاست

۵- فرمانروي جانوران

بيش از يك ميليون گونه‌اند؛ پرسلولى، يوكاريوت و موجودات هتروتروفي‌اند؛ تقديم آنها عمدهاً به وسیله بلعدين است؛ ييشتر آنها بافت‌های تخصص‌بافت دارند و بسياري نيز اندام‌ها و دستگاه‌های پيچيده دارند؛ ديوارة سلولی يا كلويلاست ندارند؛ توليدمثل جنسی آنها نسبت به روش غيرجنسی برتری دارد؛ در ميان اين فرمانرو آشكال آبزی و خاکزی - هردو - دideh می‌شود

شاخه اسفنجهای ۹ گونه‌اند؛ این شاخه، تقارنی ندارند، فاقد بافت و اندام‌اند؛ دیواره بدن آنها شامل دو لایه سلول است که منافذ متعددی دارد؛ حفره داخلی بهوسیله سلول‌های ویرثه تصفیه کننده غذا پوشیده شده است؛ در آنها تولید مثل جنسی و غیرجنسی دیده می‌شود؛ بیشتر آنها دریازی‌اند؛ این شاخه شامل اسفنجهای شاخه کیسه‌تنان : حدود ۱ گونه‌اند؛ تقارن شعاعی دارند؛ بیشتر آنها بافت‌های متمایز دارند؛ بدن آنها کیسه‌مانند و ژلاتینی است و از دو لایه سلول تشکیل شده است؛ در این شاخه، گونه‌های دریازی و ساکن آب شیرین دیده می‌شود

رده هیدروزو (Hydrozoa) : حدود ۲۷ گونه‌اند؛ بیشتر آنها دو مرحله مدوز و بولیپ را در چرخه زندگی خود دارند؛ این رده شامل هیدرهاست

نمونه : هیدر (*Hydra*)، اوبلیا (*Obelia*)، فیزالیا (*Physalia*)

رده سیفوفزو (Scyphozoa) : حدود ۲ گونه‌اند فقط ساکن دریا هستند؛ مرحله مدوز در آنها غالب است؛ این رده شامل عروس‌های دریایی است

نمونه : اُرلیا (*Aurelia*)

رده آنتوزوا (Anthozoa) : حدود ۶۲ گونه‌اند؛ دریازی‌اند؛ به صورت منفرد یا کلونی زندگی می‌کنند؛ فاقد مرحله مدوزاند؛ این رده شامل : شقاقی‌های دریایی، مرجان‌ها و بادبزن‌های دریایی است

شاخه شانه‌داران : حدود ۱ گونه‌اند؛ دارای تقارن شعاعی‌اند؛ بدن آنها شفاف است و مانند عروس‌های دریایی بدن ژله‌ای دارند؛ دریازی‌اند

شاخه کرم‌های پهن : حدود ۲ گونه‌اند فاقد حفره عمومی و دارای تقارن دو طرفی‌اند؛ بدن پهن و نواری شکل و بدون قطعه‌های واقعی‌اند؛ اندام دارند؛ سه پرده جنبی دارند؛ این شاخه شامل کرم‌های پهن است

رده توربلاریا (Turbellaria) : بیش از ۳ گونه‌اند بیشتر آنها اشکال آبزی یا خاکزی آزاد دارند؛ این شاخه شامل پلاناریاهاست

نمونه : دوجسیا (*Dugesia*)

رده سستودها (Cestoda) : حدود ۱۵ گونه‌اند؛ انگل‌های تخصص یافته درونی‌اند؛ دستگاه گوارش ندارند؛ دارای اسکولکس قلاب‌دار برای حمله به میزان‌اند؛ این رده شامل کرم‌های نواری است

نمونه : کرم کدوی گاوی (*Taenia Saginata*)

رده ترماتودها (Trematoda) : حدود ۶ گونه‌اند؛ انگل‌های درونی‌اند؛ در انتهای پیشین دارای دهان هستند؛ اغلب دارای چرخه زندگی پیچیده با تناوب میزان‌ها هستند موجب بیماری در انسان‌ها و جانوران می‌شوند؛ این رده شامل کرم‌های کبد است

نمونه : شیستوزوما (*Schistosoma*)، کلونور کیس سنین سینیز (*Clonorchis sinensis*)

شاخه کرم‌های لوله‌ای : بیش از ۱۲ گونه‌اند؛ کرم‌های کوچک، انگل، بدن آنها بدون قطعه، دراز و باریک است؛ دارای حفره عمومی کاذب‌اند؛ این شاخه شامل کرم‌های گرد (لوله‌ای) است

نمونه : آسکاریس، ترشینلا اسپیرالیس (*Trichinella spiralis*)، نکاتور (*Necator*)، توگزوكارا کانیس (*Toxocara cati*)، توگزوكارا کاتی (*Toxocara canis*)

شاخه نرم تنان : حدود ۱۱ گونه‌اند؛ جانورانی با بدن نرم و یک حفره بدنی واقعی‌اند؛ بدنی سه بخشی دارند که از پا، توده احشایی و جبهه تشکیل شده است؛ دارای دهان هستند و بیشتر آنها زبانی منحصر به فرد دارند که مثل سوهان عمل می‌کند و رادولا نام دارد؛ خشکی‌زی، دریازی و ساکن در آب شیرین‌اند؛ این شاخه شامل رده‌های زیر است :

رده پلی‌پاکوفورا (Polyplacophora) : حدود ۶ گونه‌اند؛ بدنی طویل و سری کوچک دارند؛ این رده شامل کیتون‌هاست

رده شکم‌پایان : حدود ۸ گونه‌اند؛ توده احشایی آنها در دوره رشد تاب بر می‌دارد؛ یک سر با چشمان مشخص دارند و معمولاً دارای شاخص هستند؛ این رده شامل شکم‌پایانی مانند : حلزون‌ها و حلزون‌های بدون صدف (لیسه‌ها) است

رده دوکفه‌ای‌ها : حدود ۱ گونه‌اند؛ دارای دو صدف هستند که به وسیله یک مفصل (الولا) به یکدیگر متصل شده‌اند؛ رادولا ندارند؛ پاهای بزرگ به شکل تبر دارند؛ این رده شامل دوکفه‌ای‌هایی مانند : اوسترها (Ousters) و صدف مروارید است

رده سرپایان : بیش از ۶ گونه‌اند؛ پای آنها به بازو تبدیل شده است؛ این رده شامل سرپایانی مانند : اختاپوس‌ها و نرم تن مرکب است

شاخه کرم‌های حلقوی : حدود ۱۲ گونه‌اند؛ بدن آنها از قطعات دنبال هم تشکیل شده است؛ تقارن دو طرفی دارند؛ دارای دهان هستند؛ این شاخه شامل رده‌های زیر است :

رده پُرتاران : حدود ۸ گونه‌اند؛ برآمدگی‌هایی گوشتنی به نام پاراپوپیا، از قطعات بدنی آنها بیرون زده است؛ تارهای زیادی دارند؛ دریازی‌اند
نمونه : نریس (*Nereis*)

رده کم‌تاران : حدود ۳۱ گونه‌اند؛ سر آنها خوب رشد نکرده است؛ پاراپوپیا ندارند؛ تارهای کمی دارند؛ اشکال خاکستری و ساکن در آب شیرین دارند؛ شامل کرم‌های خاکی هستند

رده زالوها : حدود ۶ گونه‌اند؛ بدن آنها پهن شده است؛ پاراپوپیا ندارند؛ معمولاً در دو انتهای بدن بادکش‌هایی دارند؛ بسیاری از آنها انگل‌های خارجی‌اند؛ شامل زالوها هستند

شاخه بندپایان : حدود یک میلیون گونه‌اند بدن قطعه قطعه دارند که به آن ضمایم زوج متصل است؛ تقارن دو طرفی دارند؛ اسکلت آنها کیتینی است؛ دارای دهان هستند؛ اشکال پروازکننده، خشکی‌زی و آبزی دارند

زیر شاخه کلسیرداران : این گروه شاخص ندارند ولی کلسیر دارند؛ تمام ضمایم آنها بدون انشعاب هستند و چهار جفت آنها پاهای حرکتی‌اند؛ بدن از دو قسمت سر – سینه و شکم تشکیل شده است؛ غالباً خشکی‌زی‌اند

رده عنکبوتیان : حدود ۵۷ گونه‌اند؛ خاکزی هستند؛ برای تنفس، نای و شش‌های کتابی دارند؛ چهار جفت پا دارند شامل : عنکبوت‌ها، عقرب‌ها، کنه‌ها و رطیل‌ها هستند

رده مروستوماتا (Merostomata) (خرچنگ‌های نعل اسبی) : حدود ۵ گونه‌اند؛ سر – سینه آنها به وسیله صدف حفاظت‌کننده پوشیده شده است؛ در انتهای بدن بخش نیزه‌ای شکل دارند؛ این رده شامل خرچنگ‌های نعل اسبی است.

رده پیکنونگونیدا (Pycnogonida) : حدود ۱ گونه‌اند؛ شکارچی‌هایی ای انگل‌های کوچک دریابی معمولاً چهار جفت پا دارند؛ شامل عنکبوت‌های دریابی می‌شوند

زیر شاخه سختپوستان : حدود ۳۵، گونه‌اند؛ دو جفت شاخص حسی دارند؛ دارای ماندیبول (آرواره) اند؛
ضمایم آنها دارای دو انشعاب است؛ غالباً آبزی هستند؛ شامل رده زیراند :

رده مالاکوستراکا (Malacostraca) : حدود ۲ گونه‌اند؛ نوعاً ۵ جفت پای حرکتی و دو جفت شاخص
حسی دارند؛ اغلب آبزی‌اند؛ مثل : خرچنگ آب شیرین، خرچنگ دریایی، خرچنگ گرد، میگو، خرخاکی، کریل
زیر شاخه یونی رامیا (Uniramia) : دارای شاخص حسی، آرواره و ضمایم برون انشعاب‌اند؛ شامل رده‌های
زیراند :

رده حشرات : حدود ۷۵ گونه‌اند؛ بدن آنها دارای سه قسمت سر و سینه و شکم است؛ سه جفت پا دارند
که همگی به سینه متصل شده است و معمولاً دو جفت بال دارند؛ شامل راسته‌های زیراند :

راسته قاب بالان؛ شامل : سوسک‌ها، کفش‌دوزک و شبشه‌گندم

راسته دوبالان؛ شامل : مگس‌ها و پشه‌ها

راسته پولک بالان؛ شامل : پروانه‌ها و بیدها

راسته نازک بالان؛ شامل : زنبورهای عسل، مورچه‌ها و زنبورهای سرخ

راسته نیم بالان؛ شامل : عنکبوت‌های آبی و انواع ساس‌ها

راسته هم بالان (هموپترا (Homoptera))؛ شامل : زنجره‌ها، شته‌ها و حشرات فلس‌دار

راسته راست بالان؛ شامل : ملخ‌ها، سوسک‌های حمام، مانتیس‌ها و جیرجیرک‌ها

راسته سنجاقک‌ها؛ شامل : سنجاقک‌ها و ...

راسته توربالان (رگ بالان)؛ شامل : مورچه‌گیرها (شیرموران)

راسته موی دمان (تیزانورا)؛ شامل : سیلورفیش، برستیل‌تیل و فایر براک‌ها

راسته شپش‌ها؛ شامل : شپش‌های مکنده

راسته جوربالان؛ شامل : موریانه‌ها

راسته زودمیران؛ شامل : می‌فلایها

راسته لوله بالان؛ شامل : ککها

راسته پوست بالان؛ شامل : گوش‌خرها

رده صد پایان : حدود ۲۵ گونه‌اند؛ بدن آنها پهن است و شامل ۱۷ – ۱۵ قطعه یا بیشتر است؛ یک جفت
پا به هر قطعه متصل می‌شود؛ این رده شامل صد پاهاست

رده دیلوبودها (Diplopoda) : حدود ۱ گونه‌اند؛ بدن درازی دارند که شامل ۲ – ۱۵ قطعه است و
در هر قطعه دو جفت پا دارند؛ علف‌خوارند؛ این رده شامل هزار یا بیان اند

شاخصه خارپوستان : حدود ۶ گونه‌اند؛ دو تروستوم (دارای دو سوراخ دهانی و مخرجی) هستند؛ موجود
بالغ آنها دارای تقارن شعاعی با طرح بدنش پنج قسمتی است؛ بیشتر اشکال آنها دارای سیستم‌های لوله‌ای آب با پاهای
لوله‌ای برای حرکت از محلی به محل دیگر هستند؛ دریازی‌اند

رده آستروئیده (Asteroidea) : حدود ۱۵ گونه‌اند؛ بدن آنها معمولاً پنج بازو دارد که در هر بازو ردیف‌های
دوتاپی پاهای لوله‌ای است؛ دهان در سطح زیرین قرار گرفته است؛ این رده شامل ستاره‌های دریایی است

رده اُفیوروئیده (Ophiuroidea) : حدود ۲ گونه‌اند؛ پنج بازو یا شعاع‌های شکننده و ظرف دارند؛ شامل : ستاره‌های شکننده و ستاره زنبیلی (Basket Star) هستند

رده کرینوئیده (Crinoidea) : حدود ۶ گونه‌اند؛ سطح دهانی آنها بالاست و با بازو‌های بسیاری احاطه شده است، این رده شامل لاله‌های دریایی و ستاره‌های پر مانند است

رده اکینوئیده (Echinoidea) : حدود ۹ گونه‌اند؛ بدن آنها کروی، تخم مرغی یا صفحه‌ای شکل است؛ بازو ندارند ولی طرح پنج قسمتی بدن هنوز آشکار است؛ این رده شامل توپیاهای دریایی است

رده هولوتوروئیده (Holothuroidea) : حدود ۱۵ گونه‌اند؛ بدنه قطعه (ضخیم) و دراز با بازو‌های دور دهان دارند؛ این رده شامل خیارهای دریایی است

شاخه طنابداران : حدود ۴۲۵ گونه‌اند؛ تقارن دوطرفی دارند؛ دارای سوراخ دهانی و مخرجی‌اند؛ حفره عمومی، نوتوکورد، طناب عصبی پشتی، شکاف‌های حلقی و دم دارند آبزی و خشکی‌زی‌اند

زیر شاخه اوروکوردادا (Urochordata) : حدود ۱۲۵ گونه‌اند؛ جانوران بالغ آنها پوشش کیسه مانند یا توپیک دارند؛ لاروهای آنها شناگران آزاد هستند و دارای طناب عصبی و نوتوکورداند؛ همه آنها دریازی‌اند؛ این زیر شاخه شامل توپیکیت‌ها (Tunicates) است

زیر شاخه سفالوکوردادا (Cephalochordata) : حدود ۲۳ گونه‌اند؛ جانورانی کوچک و شبیه ماهی با نوتوکورد دایمی هستند که از طریق تصفیه کردن مواد غذایی آب تغذیه می‌کنند؛ این زیر شاخه شامل لانسلت‌ها (Lancelets) است

زیر شاخه مهره‌داران : حدود ۴ گونه‌اند؛ در بیشتر آنها ستون فقرات متنشکل از مهره‌ها جانشین نوتوکورد شده است و از طناب عصبی پشتی محافظت می‌کند؛ سر مشخصی دارند که در آن مفرز قرار گرفته است

ماهی‌های بدون آرواره : حدود ۶۳ گونه‌اند؛ مارماهی‌هایی دریازی یا ساکن در آب شیرین هستند که آرواره حقیقی، فلس و باله‌های زوج ندارند؛ اسکلت آنها غضروفی است؛ شامل لامپری‌هاست

ماهی‌های غضروفی : حدود ۸۵ گونه‌اند؛ ماهی‌های دارای آرواره و باله‌های زوج و آبشش، قادر به اسکلت غضروفی هستند؛ شامل کوسه‌ها، سفره ماهی‌هاست

ماهی‌های استخوانی : حدود ۱۸ گونه‌اند؛ ماهی‌هایی دریازی و ساکن در آب شیرین با آبشش‌های متصل به کمان آبششی هستند؛ دارای آرواره و باله‌های زوج، اسکلت استخوانی‌اند؛ بیشتر آنها بادکنک شنا دارند؛ شامل باله شعاعی‌ها مانند ماهی‌تون، اسب‌ماهی، قزل‌آلاء، ماهی خاردار است

رده دوزیستان : حدود ۴۲ گونه‌اند؛ ساکن در آب شیرین یا خشکی هستند؛ در مرحله‌ای از زندگی آبشش دارند؛ بوست آنها اغلب لزج و فاقد فلس است؛ تخم‌ها نوغاً در آب رها می‌شوند و لفاحشان خارجی است

راسته بی‌دمان؛ شامل : قورباغه‌ها و وزغ‌ها

راسته دمداران؛ شامل : سمندرها و سمندرهای آبی

راسته بدون پاهای؛ شامل : سیسی‌لین‌ها (Caecilians)

رده خزندگان : حدود ۷ گونه‌اند؛ مهره‌دارانی خشکی‌زی یا نیمه‌آبزی هستند؛ در همه مراحل زندگی با شش تنفس می‌کنند؛ بدن آنها با فلس پوشیده شده است؛ بیشتر گونه‌ها تخم‌های آمنیوتیک که با پوسته محافظ پوشیده

شده است، می‌گذارند؛ لفاح آنها داخلی است

راسته اسکواماتا (Squamata)؛ شامل : مارمولک‌ها و مارها

راسته کلونیا (Chelonia)؛ شامل : لاکپشت‌های دریابی و خشکی

رده پرنده‌گان : حدود ۹ گونه‌اند؛ بدن آنها با پر پوشیده شده است؛ اندام حرکتی جلویی به بال تبدیل شده است؛ قلب چهار حفره‌ای است؛ خون گرم‌اند؛ تخم‌گذارند و تخم‌های دارای پرده آمنیوتیک و نیز پوسته‌ای سخت است؛ شامل راسته‌های زیر است :

راسته گنجشک‌سانان؛ شامل : سینه‌سرخ‌ها، برندۀ آبی، گنجشک‌ها و بلل‌ها

راسته آپودیفورم‌ها (Apodiformes)؛ شامل : پرندۀ شهدخوار

راسته دارکوب‌شکلان؛ شامل : دارکوب‌های است

راسته طوطی‌شکلان؛ شامل : طوطی‌ها، طوطی‌غممسرا، ماکاوهای (Macaws) و کوکاتوهای (Cockatoos)

راسته آبچلیکان؛ شامل : کاکایی‌ها، پرستوی دریابی، ...

راسته کبوترشکلان؛ شامل : کبوترها و قمری‌ها

راسته عقاب‌شکلان؛ شامل : قوش‌ها، عقاب‌ها، بازها و کرکس‌ها

راسته غواص‌سانان؛ شامل : مرغ‌های غواص

راسته کلنگیان؛ شامل : درناها و چنگرها

راسته غازشکلان؛ شامل : مرغابی‌ها، غازها و قوها

راسته جغدشکلان؛ شامل : جغدها

راسته لک‌شکلان؛ شامل : حواصیل‌ها، بوتیمارها، لکلک‌ها و منقار قاشقی‌ها

راسته سقاشکلان؛ شامل : مرغ سقا، آبقبيل‌ها (قره‌غازها)

راسته ماکیان‌سانان؛ شامل : قرقاوی‌های معمولی، بوقلمون‌ها، بلدرچین‌ها، کبک‌ها و باقرقره‌ها

راسته مرغ‌های طوفان؛ شامل : آبلاتروس‌ها و مرغ طوفان

راسته کوکوشکلان؛ شامل : کوکوها

راسته شبانگرکاران؛ شامل : شبکارچیان شب

راسته کوراسیی‌فورم‌ها (Coraciiformes) (مرغان ماهی‌خوار)؛ شامل : ماهی‌خورک

راسته پنگوئن‌سانان؛ شامل : پنگوئن‌ها

راسته شترمرغان؛ شامل : شترمرغ‌ها

راسته بی‌پروازان؛ شامل : کبوی‌ها

رده پستانداران : حدود ۴۴ گونه‌اند؛ حداقل در بخشی از بدن مو دارند؛ بچه‌های آنها با شیر که از غدد

شیری ترشح می‌شود، تغذیه می‌شوند؛ خون گرم‌اند؛ بهوسیلهٔ نشش‌ها تنفس می‌کنند؛ شامل راسته‌های زیراند :

راسته جوندگان؛ شامل : سنجاب‌ها، موش‌خرما، موش‌های خانگی و صحرابی، موش‌آبی (کرموش) و سگ‌های آبی

راسته خفاش‌ها؛ شامل : خفاش‌ها

راسته حشره‌خواران؛ شامل : موش‌کورها و موش‌های پوزه‌دراز (Shrews)

راسته کیسه‌داران؛ شامل : اُپوسوم‌ها، کانگوروها و کوالاها

راسته گوشت‌خواران؛ شامل : خرس‌ها، راسوها، سمور، گریه آبی، راسوی بدبو، شیرها، بیرها و گرگ‌ها

راسته نُحُسْتَی‌ها؛ شامل : میمون‌ها، لمورها، زیبون‌ها، اورانگوتان‌ها، گوریل‌ها و شامپاتزه‌ها

راسته جفت‌سمان؛ شامل : اسب‌های آبی، شترها، شترهای بدون کوهان (لاماها)، گوزن‌ها، زرافه‌ها، گاو،

گوسفند و بزها

راسته آب‌بازان؛ شامل : بالن‌ها و دلفین‌ها

راسته خرگوش‌ها؛ شامل : خرگوش‌های خانگی و خرگوش‌های صحرایی

راسته بالداران؛ شامل : فوک‌های دریایی و شیرهای دریایی

راسته بی‌دندانان، شامل : آرمادیلوها، حیوان تنبل و مورچه‌خوارها

راسته ماکرواسکیده‌ها (بزرگ‌پاهای)؛ شامل : فیل شرو

راسته فردسمان؛ شامل : خوک‌های خرطومدار، کرگدن‌ها، اسب‌ها، گورخرها

راسته اسکن‌دتها (Scandendtia)؛ شامل : موش‌های پوزه‌بلند درختی (Treeshrews)

راسته هیدراکوئیده (Hyracoidea)؛ شامل : هیراکس (خرگوش‌های کوهی)

راسته مورچه‌خواران فلس‌دار؛ شامل : پانگولین‌ها (مورچه‌خوار فلس‌دار)

راسته شیران دریایی؛ شامل : گاوهای دریایی

راسته پستانداران تخم‌گذار؛ شامل : پلاتیپوس (نوک اردکی)، مورچه‌خوار خاردار

راسته پوست‌بالان؛ شامل : لمورهای پرنده

راسته خرطوم‌داران؛ شامل : فیل‌ها

راسته مورچه‌خواران؛ شامل : آردوارک (Aardvark)