

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



تولید و پرورش مرغ

رشته امور دامی
گروه کشاورزی و غذا
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



تولید و پرورش مرغ - ۲۱۰۳۴۸	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
جهانشاه ایرانپور، اسماعیل پناهی، سیدناصر خالقی میران، هوشنگ سردارینده، عزت‌الله شجاعی‌هیکولی، سیدمرتضی طباطبایی‌اصل، میرهاشم فتحی‌وند و علی مقصودی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
جهانشاه ایرانپور، سیدناصر خالقی میران، سکینه بابایی، اسماعیل پناهی، عزت‌الله شجاعی‌هیکولی و جواد فرشادفر (اعضای گروه تألیف)	
خراسان رضوی، شهرستان‌های استان تهران، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گیلان و لرستان (استان‌های مشارکت‌کننده در فرایند اعتبارسنجی)	
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	مدیریت آماده‌سازی هنری:
جواد صفری (مدیر هنری) – طاهره حسن‌زاده (طراح جلد) – مریم نصرتی (صفحه‌آرا)	شناسه افزوده آماده‌سازی:
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی – ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسی)	نشانی سازمان:
تلفن: ۰۹۱۱۱۶۱-۸۸۳۰، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارویخش)	ناشر:
تلفن: ۰۵-۱۶۱۱۸۵۴۴، دورنگار: ۰۱۶۵۸۵۴۴، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهمی خاص»	چاپخانه:
چاپ پنجم ۱۳۹۹	سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خود کفای باشیم، بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
امام خمینی «قدّس سرّه»

فهرست

سخنی با هنرجویان عزیز

بودمان اول: انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی	۱
■ واحد یادگیری (۱): جمع آوری تخم مرغ و انتقال آن به انبار	۲
■ واحد یادگیری (۲): تهیه تخم مرغ نطفه دار	۱۶
■ واحد یادگیری (۳): نطفه یابی	۲۷
بودمان دوم: مدیریت جوجه کشی	۴۱
■ واحد یادگیری (۴): کار با دستگاه ستر	۴۲
■ واحد یادگیری (۵): کار با دستگاه هچر	۵۹
■ واحد یادگیری (۶): درجه بندی جوجه یک روزه	۷۵
بودمان سوم: پرورش جوجه	۸۹
■ واحد یادگیری (۷): آماده سازی سالن پرورش مرغ	۹۰
■ واحد یادگیری (۸): جمع آوری و ذخیره سازی کود مرغی	۱۲۰
■ واحد یادگیری (۹): جوجه ریزی در سالن پرورش مرغ	۱۳۳

۱۵۳.....	پودمان چهارم: تغذیه مرغ
۱۵۴.....	■ واحد یادگیری (۱۰): تهیه خوراک
۱۸۱.....	■ واحد یادگیری (۱۱): خوراک دهی مرغ
۲۰۱.....	پودمان پنجم: امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ
۲۰۲.....	■ واحد یادگیری (۱۲): کنترل شرایط محیطی در سالن پرورش
۲۳۰.....	■ واحد یادگیری (۱۳): تولکبری اجباری
۲۴۴.....	■ واحد یادگیری (۱۴): پیشگیری از بیماری‌ها
۲۶۲.....	منابع

سخنی با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه‌ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب‌های درسی را همانند پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه‌درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱ شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار
- ۲ شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
- ۳ شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ۴ شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر

بر این اساس دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشته‌های فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأثیف کتاب‌های درسی هر رشته است. برای تأثیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.

این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشته امور دامی تأثیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی‌های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه‌ای برای دیگر دروس می‌باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.

کتاب درسی تولید و پرورش مرغ شامل ۵ پودمان است و هر پودمان دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن پودمان را کسب نمایید. علاوه بر این کتاب درسی، شما می‌توانید از بسته آموزشی نیز استفاده نمایید. فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌ها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری جدی بگیرید.

برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب می‌توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. همچنین همراه با کتاب، اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وب‌گاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنایون آن مطلع شوید.


امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی‌تان، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند می‌هن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



پودمان ۱

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی



اولین گام برای شروع یک جوجه کشی موفق انتخاب تخم مرغ مناسب است. برای تولید بیشتر و به دست آوردن جوجه مرغوب تر باید تخم مرغ های جوجه کشی، ویژگی های مناسبی شامل نطفه داری و شکل ظاهری مناسب داشته باشند. اگر نطفه داری بالا نباشد بیشتر تخم مرغ هایی که در ماشین جوجه کشی گذاشته می شوند به جوجه تبدیل نخواهد شد و باید دور ریخته شوند. در هر صورت اولین قدم این است که محل مناسبی برای تهیه تخم مرغ های نطفه دار خود بیابید. جهت اطمینان بیشتر از پیشگیری بیماری ها و رعایت فاکتورهای مربوط به سلامتی مرغ، بهتر است تخم مرغ های نطفه دار موردنیاز را از مراکز معتبر خریداری کنید. مرغ معمولاً بر حسب غربیزه، به تخم گذاری در جای معینی عادت دارد، از این رو با توجه به این غربیزه، در سالن مرغ های تخم گذار، باید تعداد معینی لانه تخم گذاری نصب نمود یا به پرورش در قفس های مخصوص تخم گذاری پرداخت. این امر سبب سهولت جمع آوری تخم مرغ ها شده و از شکستن و نیز کثیف شدن آنها جلوگیری می نماید. تخم مرغ های جوجه کشی اگر با فضولات آلووده شوند باعث فساد تخم مرغ و از بین رفتن جنین می گردند و از طرف دیگر منبع آلوودگی در ماشین جوجه کشی محسوب می شوند.

واحد یادگیری ۱

جمع آوری تخم مرغ و انتقال آن به انبار

آیاتا به حال پی بردید؟

- ۱ به چه روش‌هایی می‌توان تخم مرغ‌ها را در سالن‌های مرغ‌داری جمع آوری کرد؟
- ۲ چگونه می‌توان تخم مرغ‌های طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص داد؟
- ۳ انتقال تخم مرغ از سالن پرورش به انبار نگهداری به چه روش‌هایی صورت می‌گیرد؟
- ۴ محیط نگهداری تخم مرغ باید دارای چه شرایطی باشد؟
- ۵ نحوه محاسبه راندمان تولید و ثبت آن در فرم‌های مخصوص چگونه است؟

هدف از این بخش جمع آوری تخم مرغ به روش دستی یا خودکار، تفکیک ظاهری تخم مرغ‌ها و انتقال به انبار نگهداری و سپس محاسبه بازده تخم‌گذاری است. جمع آوری تخم مرغ می‌تواند به صورت دستی یا خودکار انجام گیرد، ولی برتری یک روش بر روش دیگر خود یک مسئله قابل بحث بین مرغداران است. برای یک کارگر ماهر، جمع آوری تخم مرغ‌های ۳۰۰۰۰ قطعه مرغ تخم‌گذار با دست و انجام کارهای دیگر چندان مشکل نیست. برای آسانی کار، تخم مرغ‌ها را در داخل شانه‌های مقواوی جمع آوری کرده و توسط ارابه‌ای در طول راهرو به حرکت در می‌آورند. در بیشتر سالن‌های پرورش جدید سیستم خودکار جمع آوری تخم مرغ نصب می‌گردد که در این روش تخم مرغ‌ها توسط شیب کف قفس بر روی تسمه نقاله غلت خورده و از آنجا به اتاق جمع آوری تخم مرغ‌ها که در انتهای سالن قرار دارد منتقل شده و یا به طور مستقیم به اتاق فرایند جهت نظافت، درجه‌بندی و بسته‌بندی انتقال می‌یابند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که جمع آوری و بسته‌بندی تخم مرغ‌ها را با کمترین شکستگی در یک سالن به ظرفیت ۲۰۰۰ قطعه انجام دهند.

روش های جمع آوری تخم مرغ

جمع آوری تخم مرغ می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام پذیرد.



جمع آوری تخم مرغ به صورت دستی

باند تخم مرغ جمع کن به وسیله نقاله حمل تخم مرغ به اتاق جمع آوری تخم مرغ انتقال می یابد و به دو صورت دستی یا خودکار توسط دستگاه، بسته بندی می شود. جهت تمیز نگهداشتن باندهای جمع آوری تخم مرغ، برس هایی در ابتدای هر باند تعییه شده است تا گرد و غبار موجود روی باندها به وسیله آن برطرف گردد. جمع آوری تخم مرغ ها توسط سیستم آسانسور از طبقات بالا شروع و در پایین ترین طبقه پایان می یابد.

۱ سیستم جمع آوری تخم مرغ به صورت دستی: کارگران تخم مرغ ها را در داخل شانه های مقوا یابی جمع آوری کرده و توسط ارابه ای در طول راهرو به حرکت درمی آورند و به انبار نگهداری تخم مرغ می برنند.

۲ سیستم جمع آوری تخم مرغ به صورت خودکار: در تأسیسات جدید، سیستم خودکار جمع آوری تخم مرغ نصب می گردد. تخم مرغ های جمع شده روی طبقات بالا شروع و در پایین ترین طبقه پایان می یابد.



جمع آوری تخم مرغ به صورت خودکار

مزایا و معایب جمع آوری تخم مرغ به صورت خودکار و دستی را بیان کنید.

گفت و گو
کنید



دفاتر جمع آوری تخم مرغ

تعداد دفاتر جمع آوری تخم مرغ در مرغداری‌ها به دلیل تجربه، سرعت جمع آوری، ترکیب قفس‌ها، کیفیت تخم مرغ و نوع وسیله جمع آوری متفاوت است. کارگران ماهر می‌توانند در هر ساعت ۵۰۰ تخم مرغ و یا بیشتر را جمع آوری کنند. از این رو یک کارگر می‌تواند با ۸ ساعت کار مفید روزانه، کلیه تخم مرغ‌های یک مرغداری ۵۰۰ قطعه‌ای را که تولیدی معادل ۷۵ درصد داشته باشد جمع آوری کند. سرعت کار در سیستم‌های مکانیزه جمع آوری تخم مرغ به ۳ برابر افزایش یافته و در سیستم‌های تمام خودکار نیازی به کارگر برای جمع آوری تخم مرغ نخواهد بود.

تعداد دفاتر جمع آوری تخم مرغ حداقل ۴ بار و در شرایط گرم‌ما ۶ بار در روز توصیه می‌شود. (در هر جمع آوری باید بیش از ۳۰ درصد کل تخم مرغ جمع آوری شود).

اخلاق
حرفه‌ای



در جمع آوری تخم مرغ‌ها با وسوسات و تقوای علمی دقیق عمل کنید تا کوچک‌ترین آسیب و ضربه‌ای به آنها وارد نشود. آسیب یک تخم مرغ یعنی خروج سرمايه و وقت به اندازه یک مرغ است و ما در پیشگاه الهی مسئول خواهیم بود.




تخم مرغ‌های روی بستر سریعاً جمع آوری شوند (اوایل دوره سر پهن تخم مرغ باید به طرف بالا باشد و بیشتر از ۶ شانه باید روی هم قرار گیرد. ۸-۶ بار در روز).

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	جمع آوری تخم مرغ از قفس‌ها	۱- جمع آوری تخم مرغ‌ها با دست و یا به طور مکانیزه (نوار نقاله) ۲- جمع آوری نکردن به موقع تخم مرغ‌های موجود در سالن	۱- جمع آوری سریع تخم مرغ‌های موجود در سالن ۲- جمع آوری نکردن به موقع تخم مرغ‌های موجود در سالن	عدم مشاهده تعداد زیادی تخم مرغ گذاشته شده در سالن	۳
				مشاهده تعداد نسبتاً زیادی تخم مرغ گذاشته شده در سالن	۲
				مشاهده تعداد زیادی تخم مرغ گذاشته شده در سالن	۱

فعالیت کارگاهی



تفکیک تخم مرغ های طبیعی و غیرطبیعی

مراحل انجام کار

- ۱ لباس کار مناسب بپوشید.
- ۲ دستهای خود را ضد عفونی کنید.
- ۳ از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید.
- ۴ تخم مرغ ها باید به دقق و در حالی که انتهای کوچک آنها به طرف پایین است در شانه چیده شوند.
- ۵ تخم مرغ ها باید به دقق درجه بندی شوند. از گذاشتن تخم مرغ های نامناسب و بد فرم در شانه ها بپرهیزید. دقق کنید: کلیه تخم مرغ های ترکدار، کثیف، خیلی کوچک، خیلی بزرگ یا دو زرد، تخم مرغ های بد شکل (کشدار، گرد و موجودار) و تخم مرغ های با پوسته ضعیف را جداگانه جمع آوری کنید.
- ۶ تخم مرغ ها باید در شانه های سالم و محکم چیده شوند.
- ۷ شانه های تخم مرغ باید به شکل صحیحی روی هم قرار گیرند.
- ۸ باید از چیزی که زیاد شانه روی هم خودداری کرد (حداکثر ۶ شانه).
- ۹ شانه ها را در کارتون مناسب بگذارید و در انبار جداگانه ای که حرارت و رطوبت آن قابل کنترل باشد نگهداری کنید.



تخم مرغ لمبه (بدون پوست)
بین ۰/۵ تا ۳ درصد کل تخم مرغ های تولید شده است.



تخم مرغ بد شکل
بیش از ۱۵ درصد تخم مرغ های تولید شده بدشکل هستند.



تخم مرغ با پوسته ضعیف



تخم مرغ پوسته آهکی



تخم مرغ کثیف




تخم مرغ گرد

تحقیق
کنید



- ۱ در صورت کثیف بودن تخم مرغ، به چه روش هایی می توان آن را تمیز کرد؟
۲ چگونه می توان میزان شکنندگی تخم مرغ را کاهش داد؟



کدام تخم مرغ تازه تر است؟

روش های شناسایی تخم مرغ سالم


- ۱ ظاهری سالم داشته باشد.
- ۲ پوسته خارجی پاک و تمیز بوده و دارای شکل طبیعی باشد.
- ۳ اتاقک هوایی آن کوچک باشد.
- ۴ پوسته فاقد رگه و برآمدگی باشد.
- ۵ سفیده غلیظ بیشتر از سفیده رقيق یا آبکی باشد.
- ۶ زرد، گلوله ای شکل، یکنواخت و طبیعی باشد و در وسط تخم مرغ قرار گیرد.
- ۷ محتويات تخم مرغ سالم پس از شکستن فاقد هرگونه بو و طعم خاص باشد.

فعالیت کارگاهی

شناسایی تخم مرغ سالم از ناسالم قبل از شکستن پوسته تخم مرغ

شرح فعالیت:

ابتدا یک لیتر محلول ۱۲ درصد آب و نمک تهیه کنید. سپس تخم مرغ ها را در این محلول قرار دهید. تخم مرغ خیلی تازه و سالم در ته طرف به صورت افقی می ایستد؛ اما تخم مرغ سالم ولی کمی کهنه در قسمت های میانی آب معلق می ماند و تخم مرغ هایی که در سطح آب به صورت افقی قرار می گیرند، فاسد هستند؛ چرا که داخل تخم مرغ های کهنه هوای بیشتری وجود دارد و این امر موجب معلق ماندن آنها می شود.



شناسایی تخم مرغ سالم از ناسالم قبل از شکستن پوسته تخم مرغ

کیفیت ظاهری تخم مرغ های خوراکی (تجاری)

مشکل	دلیل مشکل ایجاد شده
تخم مرغ با دانه های برجسته روی پوسته	صرف زیاد ویتامین D ₃ میزان کلسیم جیره ارتباطی با این عارضه ندارد.
تخم مرغ های بدشکل	هرچه جمعیت مرغ های داخل یک قفس بیشتر باشد موارد وقوع آن بیشتر است. بیشتر به هنگام صحیح گذاشته می شوند. هنگام شیوع بیماری های برونشیت عفونی و نیوکاسل تولید می شوند. تخم مرغ با پوسته نرم در سیستم قفس بیشتر از سیستم بستر پوشال است.
تخم مرغ های با پوسته شیاردار	تراکم بالا در قفس
کاهش کیفیت پوسته در خلال سیکل تخم گذاری	با افزایش سن مرغ ها مقدار کلسیم استخوان کاهش می یابد.

کیفیت محتویات داخلی تخم مرغ های خوراکی (تجاری)

اجزای داخلی تخم مرغ	دلیل مشکل ایجاد شده
کیسه هوایی	در تخم مرغ های تازه تولید شده قطری در حدود ۲ سانتی متر و عمقی معادل ۰/۳۲ سانتی متر دارد. با بالا رفتن سن تخم مرغ، عمق و قطر کیسه های هوایی افزایش می یابد.
زرده تخم مرغ	وقتی یک تخم مرغ در مقابل نور نگه داشته شود، زرده آن سایه مشخصی ایجاد می کند. در تخم مرغ های تازه سفیده کمتری مشخص می شود.
رنگ زرده	رابطه نزدیکی با مواد رنگی موجود در جیره دارد.
زرده حال خال	ذرات کوچکی هستند که اطراف زرده را احاطه می کنند. در ماه های تابستان به دلیل نامشخص افزایش می یابد.
تخم مرغ های دو زرده	تحریک نوری بیش از حد در شروع تولید فقدان نور کافی در اواخر دوره تولید

<p>بالا بودن درجه حرارت محیط زیاد بودن گاز آمونیاک در سالن مرغهای مسن صرف برخی از داروها بروز بیماری‌ها</p>	<p>آلومین سفید آبکی</p>
<p>پاره شدن فولیکول در ناحیه‌ای به غیر از استیگما (ناحیه‌ای که رگ‌های خونی وجود ندارد)</p>	<p>لکه‌های خون در تخم مرغ</p>

■ چرا پوسته تخم مرغ را با روغن‌های معدنی، چرب می‌کنند؟

تحقیق
کنید



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ازار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
	تفکیک ظاهری تخم مرغ	شانه‌های تخم مرغ	۱- یک دست و یک اندازه بودن تخم مرغ‌های آماده فروش ۲- یک دست و یک اندازه بودن نسبی تخم مرغ‌های آماده فروش	جداسازی کامل تخم مرغ‌ها از لحاظ شکل و اندازه	۳
			۳- ناهمگن بودن تخم مرغ‌های جمع آوری شده	جداسازی نسبتاً کامل تخم مرغ‌ها از لحاظ شکل و اندازه	۲
۱				عدم جداسازی تخم مرغ‌ها از لحاظ شکل و اندازه	

حمل تخم مرغ‌ها به انبار نگهداری



گاری حمل تخم مرغ




حمل تخم مرغ به وسیله گاری در حین جمع آوری

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

توجه

جهت پیشگیری از ترک های مویی همواره حمل و نقل تخم مرغ ها باید با دقت انجام شود.




جمع آوری و انتقال تخم مرغ ها به انبار نگهداری

جمع آوری تخم مرغ ها توسط آسانسور تمام خودکار در تابلوی مربوطه قابل کنترل است، تسممه های جمع آوری تخم مرغ از بهترین نوع باید انتخاب از طبقات بالا شروع شده به ترتیب تخم مرغ های طبقات پایین تر را جمع آوری می کند. سرعت شود، تخم مرغ های جمع آوری شده توسط تسممه ها به وسیله آسانسور به نقطه دلخواه انتقال می یابد.




انبار نگهداری تخم مرغ



سالن مرغ تخم گذار



سالن مرغ تخم گذار



نمایی از سالن های مرغ تخم گذار و انبار نگهداری تخم مرغ

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۳	حمل تخم مرغ‌ها به انبار	انتقال تخم مرغ به انبار به روش دستی یا با نوار نقاله	۱- انتقال با دقت زیاد ۲- انتقال با دقت متوسط ۳- انتقال با دقت پایین	عدم مشاهده تخم مرغ‌های شکسته	۲
				مشاهده تعداد کمی تخم مرغ شکسته	۱
				مشاهده تعداد زیادی تخم مرغ شکسته	۳

قبل از شروع عملیات قراردادن صحیح تخم مرغ‌ها ماسک مناسب استفاده کنید. در کارتنهای لایه‌لایه، لازم است که نکات ایمنی زیر را مورد **۱** در هنگام کار از خوردن و آشامیدن بپرهیزید. **۲** پس از پایان کار دست و صورت خود را با آب و **۱** هنگام کار از لباس مناسب بهویشه دستکش و صابون بشویید.

فعالیت کارگاهی

چیدمان صحیح تخم مرغ‌ها در کارتنهای لایه‌لایه

- ۱ بهتر است تخم مرغ به حالتی که نوک تیز آن به سمت پایین است در شانه‌های مخصوص قرار گرفته و سپس در کارتنهای لایه‌لایه بسته‌بندی شود.
- ۲ در هر کارتنهای لایه‌لایه شانه قرار دهید.
- ۳ کارتنهای لایه‌لایه را با احتیاط به انبار حمل کنید.



۲. شستشو و چرب کردن



۱. انتقال تخم مرغ‌ها از سالن مرغداری

انتخاب تخم مرغ مناسب جوچه کشی



۴. درجه بندی تخم مرغ و بسته بندی



۳. آزمایش کیفیت تخم مرغ ها

تحقیق
کنید



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۱	کارتون کردن تخم مرغ شانه های تخم مرغ	۱- بسته بندی صحیح تخم مرغ ها ۲- بسته بندی نسبتاً صحیح تخم مرغ ها ۳- بسته بندی نادرست تخم مرغ و وجود شکستگی در تخم مرغ ها	قرار گرفتن نادرست تخم مرغ ها داخل کارتون ها	قرار گرفتن صحیح تخم مرغ ها داخل کارتون ها	۳
۲	کارتون کردن تخم مرغ شانه های تخم مرغ	۱- بسته بندی صحیح تخم مرغ ها ۲- بسته بندی نسبتاً صحیح تخم مرغ ها ۳- بسته بندی نادرست تخم مرغ و وجود شکستگی در تخم مرغ ها	قرار گرفتن نسبتاً صحیح تخم مرغ ها داخل کارتون ها	قرار گرفتن نسبتاً صحیح تخم مرغ ها داخل کارتون ها	۲
۳	کارتون کردن تخم مرغ شانه های تخم مرغ	۱- بسته بندی صحیح تخم مرغ ها ۲- بسته بندی نسبتاً صحیح تخم مرغ ها ۳- بسته بندی نادرست تخم مرغ و وجود شکستگی در تخم مرغ ها	قرار گرفتن صحیح تخم مرغ ها داخل کارتون ها	قرار گرفتن صحیح تخم مرغ ها داخل کارتون ها	۱

انبار نگهداری و جابجایی تخم مرغ ها در سالن مرغداری باید همیشه تمیز و مرتب باشد. انبار تخم مرغ باید نسبت به ورود کرم و حشرات قابل کنترل باشد. از قبول گاری های کثیف حمل تخم مرغ خودداری نموده و در هنگام استفاده از آنها مراقب باشید.

انبار و نگهداری تخم مرغ ها

درجه حرارت انبار بستگی به زمان نگهداری دارد؛ برای نگهداری تخم مرغ ها به مدت طولانی، پایین آوردن درجه حرارت سردخانه کمک خوبی در حفظ آلوی اغلب بهترین دما برای نگهداری تخم مرغ ها ۱۶ تا ۲۰ درجه سانتی گراد و رطوبت ۷۵ درصد است. کیفیت تخم مرغ خواهد داشت.

نگهداری تخم مرغ‌ها



پالت چوبی

- ۱ از لباس کار مناسب به ویژه دستکش و ماسک استفاده کنید.
- ۲ کارتون تخم مرغ‌ها را در انبار تخم مرغ روی پالت چوبی بچینید.
- ۳ کارتنهای تخم مرغ را طوری در انبار قرار دهید که هوا به راحتی جریان داشته باشد.
- ۴ دما را با استفاده از سیستم خنک کننده تنظیم کنید.
- ۵ برای تأمین رطوبت کافی می‌توانید کف را آب پاشی کنید.
- ۶ دما و رطوبت را به وسیله دماسنجد و رطوبت‌سنجد هر ساعت کنترل کنید.
- ۷ دما و رطوبت را هر یک ساعت یکبار در فرم مربوطه یادداشت کنید.



انبار نگهداری تخم مرغ

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
		تنظیم دما و رطوبت در انبار و بسته‌بندی به روش دستی یا خودکار	۱- نگهداری مناسب تخم مرغ‌ها ۲- نگهداری نسبتاً مناسب تخم مرغ‌ها ۳- نگهداری نامناسب تخم مرغ‌ها	دما، رطوبت و بسته‌بندی مناسب در اتاق نگهداری	۳
				دما، رطوبت و بسته‌بندی نسبتاً مناسب در اتاق نگهداری	۲
۵				دما، رطوبت و بسته‌بندی نامناسب در اتاق نگهداری	۱

فعالیت کارگاهی

در هر بار بازدید فرم مربوط به ثبت آمار را تکمیل نمایید.

رطوبت	درجه حرارت	درجه حرارت انبار	موجودی خروج	تاریخ ورود تخم مرغ	وزن تخم مرغ ها	تعداد تخم مرغ های غیرطبیعی	تعداد تخم مرغ های سالم و طبیعی	تعداد تخم مرغ میزان دان	تعداد تخم گذار مصرفی	تعداد تخم مرغ تخم گذار

شاخص های اندازه گیری تولید تخم مرغ

در صنعت مرغداری به طور معمول دو روش اندازه گیری روزانه یا هفتگی درصد تولید تخم مرغ اعمال می شود. هر کدام از این دو روش را اگر به عنوان شاخص به کار گیرند اشتباه است زیرا فقط می تواند به عنوان یک حساب تخمینی مدنظر باشد.

درصد تولید تخم مرغ براساس مرغ های موجود در سالن: از فرمول زیر برای اندازه گیری تولید تخم مرغ، مرغ های زنده موجود در هر روز استفاده می شود.

$$\frac{\text{تعداد تخم مرغ روزانه}}{\text{تعداد مرغ های زنده موجود در سالن}} \times 100 = \text{درصد تولید تخم مرغ براساس مرغ های موجود در سالن}$$

در یک روز مشخص تعداد ۲۰۰۰ قطعه مرغ زنده در سالن موجود بوده و اگر در آن روز میزان تولید ۱۶۰۰ عدد تخم مرغ باشد. درصد تولید تخم مرغ به ازای مرغ های موجود در سالن چقدر است؟

پرسش



تولید تخم مرغ براساس کل مرغ های موجود در ابتدای دوره: فرمول زیر روشی برای اندازه گیری درصد تولید تخم مرغ کل مرغانی است که در ابتدای سال تولید به سالن وارد شدند.

$$\frac{\text{تعداد کل مرغ های موجود در اول دوره تخم گذاری}}{\text{تعداد تخم گذاری در روز}} \times 100 = \text{درصد تولید تخم مرغ براساس مرغ های ابتدای دوره تولید}$$

درصد تولید براساس مرغ های زنده موجود و کل مرغ هایی که در شروع تولید در سالن موجود بودند را با هم مقایسه کنید.

تحقيق
کنید

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۶	بررسی بازدهی گله تخم‌گذار	فرم‌های مربوط به ثبت آمار تخم مرغ	۱- اطلاع دقیق از تعداد تخم مرغ تولیدی	ثبت روزانه تعداد تخم مرغ سالم، شکسته و لمبه	۳
			۲- اطلاع نسبی از تعداد تخم مرغ تولیدی	ثبت نامنظم تعداد تخم مرغ سالم، شکسته و لمبه	۲
			۳- عدم اطلاع از تعداد تخم مرغ تولیدی	عدم ثبت تعداد تخم مرغ سالم، شکسته و لمبه	۱

ارزشیابی شایستگی جمع آوری تخم مرغ

شرح کار:

- ۱- جمع آوری تخم مرغ به روش دستی یا خودکار
- ۲- انتقال تخم مرغ ها به انبار
- ۳- بسته‌بندی تخم مرغ ها
- ۴- تنظیم دما و رطوبت انبار نگهداری
- ۵- ثبت آمار تخم مرغ های سالم و بسته‌بندی شده

استاندارد عملکرد:

جمع آوری و بسته‌بندی تخم مرغ ها با کمترین شکستگی

شاخص ها:

- ۱- جمع آوری تخم مرغ ها با کمترین شکستگی
- ۲- انتقال تخم مرغ ها به انبار با کمترین شکستگی
- ۳- بسته‌بندی تخم مرغ ها با کمترین شکستگی
- ۴- تنظیم شرایط محیطی انبار طبق دستورالعمل
- ۵- نمون برگ های تکمیل شده

شرایط انجام کار:

وجود تخم مرغ
سبدهای جمع آوری تخم مرغ
زمان معین جمع آوری
شانه های تخم مرغ
کارتنهای حمل تخم مرغ

ابزار و تجهیزات:

شانه های تخم مرغ - چرخ حمل تخم مرغ - ظروف بسته‌بندی تخم مرغ - نمون برگ های ثبت آمار

معیار شایستگی:

ردیف	مراحله کار	جمع آوری تخم مرغ از قفس ها	تفکیک ظاهری تخم مرغ	حمل تخم مرغ ها به انبار	بسته‌بندی و نگهداری تخم مرغ ها	بررسی بازدهی گله تخم گذار	کارتنهای حمل تخم مرغ
۱	حداقل نمره قبولی از ۳	۲					
۲		۱					
۳		۲					
۴		۲					
۵		۱					
۶		۱					
شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:							
جلوگیری از ترک خوردن تخم مرغ ها در حین جایه جایی، دفع بهداشتی تخم مرغ های غیر قابل استفاده، دقت، امانت داری، مسئولیت پذیری، پوشیدن لباس کار							
میانگین نمرات							

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری: ۱

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

واحد یادگیری ۲

تهییه تخم مرغ نطفه دار

آیاتا به حال پی برد هاید؟

- ۱ از طریق چه روش هایی می توان تخم مرغ نطفه دار تهییه کرد؟
- ۲ تخم مرغ های نطفه دار معمولاً از کدام مزارع پرورش مرغ تهییه می شود؟
- ۳ تخم مرغ مناسب جوجه کشی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
- ۴ برای انتقال تخم مرغ های قابل جوجه کشی به چه نکاتی باید توجه کرد؟
- ۵ برای نگهداری تخم مرغ های نطفه دار چه شرایطی باید رعایت شود؟

هدف از این بخش بررسی خصوصیات تخم مرغ های نطفه دار، نحوه تهییه، روش انتقال و نگهداری آن است. یکی از مهم ترین مسائل در فرایند جوجه کشی تأمین تخم مرغ نطفه دار است. در مرغ های خیلی پیر و خیلی جوان، تعداد کمی از تخم مرغ ها، نطفه دار هستند. میزان نطفه دار بودن تخم مرغ ها در یک مرغ به اندازه و تعداد تخم مرغ های تولید شده بستگی دارد. اگر اندازه تخم مرغ های تولیدی کوچک باشد، درصد نطفه داری آن کاهش و در صورت استاندارد بودن اندازه آن، درصد نطفه داری تخم مرغ افزایش می یابد. از عوامل مؤثر در تولید جوجه با کیفیت بالا، میزان جوجه در آوری، تمیز و استاندارد بودن اندازه و شکل ظاهری تخم مرغ نطفه دار بوده که بسیار حائز اهمیت است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که تخم مرغ نطفه دار مناسب جوجه کشی را با توجه به استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۰ انتخاب کنند.

تولید مثل یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌ها در تولید و پرورش مرغ است، بدون تولید تخم مرغ‌های نطفه‌دار و جوجه‌کشی از آنها برای تولید و پرورش مرغ و خروس، صنعت مرغداری مفهومی نخواهد داشت. بهترین منبع تهیه تخم مرغ‌های مناسب جوجه‌کشی، گله‌های مرغ مادر گوشتی و مرغ مادر تخم‌گذار می‌باشد.

گله‌های مرغ مادر گوشتی و تخم‌گذار چه نقشی در صنعت طیور ایفا می‌کنند.

تحقیق
کنید



منابع تأمین تخم مرغ‌های قابل جوجه‌کشی

- ۱ از گله مادر جوجه‌کشی: در این مورد جوجه‌کشی نطفه‌دار تهیه کنید.
- ۲ در صورت نیاز، تخم نطفه‌دار را از مزارع معتبر خریداری کنید. در این زمینه با افراد مطمئن مشورت کنید.
- ۳ قبل از خرید، حتماً اطلاعات دقیق و کاملی در رابطه با مرغ مادر آن مرکز داشته باشید (نطفه‌داری، سلامت گله، وضعیت تغذیه گله مادر، نسبت خروس به مرغ، حمل و نقل مناسب و ...). دقت کنید: عدم تأمین نیازهای کامل غذایی گله مادر از نظر پرتوئین، اسیدآمینه، لیپید، کربوهیدرات، ویتامین‌ها، مواد معدنی و عدم بالانس جیره غذایی سبب تولید جوجه‌های ضعیف می‌گردد.
- ۴ تخم مرغ‌ها را بر اساس قیمت روز و با قیمت مناسب خریداری کنید.
- ۵ سعی کنید تخم مرغ‌های تمیز و مناسب را برای جوجه‌کشی خریداری کنید.
- ۶ تخم مرغ‌هایی با وزن و شکل مناسب خریداری کنید. وزن مناسب تخم مرغ قابل جوجه‌کشی برای نژادهای گوشتی ۵۵-۶۵ گرم (۵۰-۷۰ گرم) و برای نژادهای تخم‌گذار ۵۵-۶۰ گرم است.
- ۷ تخم مرغ‌هایی که از گله مادر جوان یا مسن تهیه شده، نمی‌توانند برای تولید جوجه مناسب باشند.
- ۸ بهترین منبع تهیه تخم مرغ‌های مناسب جوجه‌کشی، مرغ‌های خودتان است. همچنین می‌توانید از مرغداری یا مزرعه‌ای که گله مرغ مادر پرورش می‌دهد تخم

توجه



هر یک گرم تغییر در اندازه تخم مرغ موجب $0/5$ گرم تغییر در وزن جوجه یک روزه و $5-10$ گرم تغییر در وزن بدن جوجه‌گوشتی 42 روز می‌شود.



تحقيق
کنید

منظور از چهار منفی بودن گله چیست؟ توضیح دهید؟



مسئول جوجه‌کشی باید تاریخ هج جوجه‌ها را تعیین کرده و از چند هفته قبل، برای تهیه تخم مرغ نطفه‌دار از مزارع مرغ مادر اقدام کند. در صورت نیاز بین فروشنده و خریدار، قرارداد تهیه تخم مرغ نطفه‌دار منعقد گردد.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	مراجعه به مراکز فروش تخم مرغ	اینترنت - بروشورهای مربوطه مراجعه به مراکز فروش	۱- مراجعه به مراکز معتبر ۲- مراجعه به مراکز نیمه معتبر ۳- مراجعه به مراکز متفرقه	شناسایی مراکز معتبر شناسایی مراکز نیمه معتبر شناسایی و انتخاب مراکز متفرقه	۳ ۲ ۱

ویژگی‌های تخم مرغ مناسب (قابل جوجه‌کشی)



نطفه‌دار باشد.

شكل مناسب داشته باشد. از به کار بدن تخم مرغ‌هایی با ظاهر غیرطبیعی (کشیده، گرد و موج دار) باید اجتناب شود.

ضخامت پوسته مناسب باشد.

تخم مرغ‌های دارای پوسته بسیار ضخیم و نازک مناسب جوجه‌کشی نیستند. نازک بودن پوسته منجر به تبخیر آب بیشتر و کاهش درصد جوجه‌درآوری می‌شود، از طرفی در این حالت کلسیم کافی برای رشد جنبین تأمین نمی‌شود. ضخیم بودن پوسته سبب به وجود آمدن مشکل در زمان خروج جوجه از تخم

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه‌کشی

می‌شود.


■ قادر ترک‌های مویی باشد.

■ قادر شکستگی باشد.


■ کثیف نباشد.

■ کیفیت محتویات داخلی در وضعیت مطلوب باشد.

■ مرغ مادر دارای تغذیه مطلوب و مناسب باشد.




تخم مرغ بی‌نطفه




تخم مرغ نطفه‌دار

تحقيق
کنید


نسبت خروس به مرغ در نژادهای سنگین و سبک برای دستیابی به نطفه‌داری خوب چگونه باید باشد؟




تخم مرغ نطفه‌دار




تخم مرغ بی‌نطفه




تخم مرغ بی‌نطفه



دماهی نامناسب نگهداری




شرطی حمل نامناسب
لکه تبدیل به هاله شده و از آن
فاصله می‌گیرد.




نطفه ضعیف


لکه از یک سمت به هاله نزدیک
می‌شود.



پروتئین جیره متعادل نیست.
لکه وجود ندارد.
اطراف هاله لخته مانند است.



صرف بیش از حد نیاز ویتامین های
 محلول در چربی در جیره
 لکه وجود ندارد.
 داخل هاله حباب های هوا دیده
 می شود.



تخم مرغ به مقدار کم آب از دست
داده است.
لکه وجود ندارد.
هاله از یک سمت به طرف داخل
متقابل می شود.

فعالیت کارگاهی

تعیین تخم مرغ نطفه دار

با توجه به تصاویر بالا تعدادی تخم مرغ حاصل از گله مرغ دارای خروس را شکسته و سپس آن را از نظر نطفه داری بررسی کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (اizar، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۲	انتخاب تخم مرغ کتاب - اینترنت - جزوات آموزشی پژوهش های مربوطه	۱- انتخاب تخم مرغ مناسب جهت جوچه کشی	۱	انتخاب نژاد مطلوب با تخم مرغ های سالم و درجه ۱	۳
		۲- انتخاب تخم مرغ متوسط جهت جوچه کشی	۲	انتخاب نژاد با بازدهی متوسط و تخم مرغ های آنها	۲
		۳- انتخاب تخم مرغ نامطلوب	۳	انتخاب نژاد با بازدهی پایین و استفاده از تخم مرغ های آنها	۱

ارزیابی قیمت تخم مرغ

یکی از مشکلات مهم تنظیم بازار داخلی فقدان نوسانات بازار اتخاذ کند. بر این اساس پیش‌بینی قیمت‌ها پیش‌بینی مناسب از قیمت‌های بازار تخم مرغ در آینده در تنظیم بازار و تصمیم‌گیری مدیران از اهمیت ویژه‌ای و به دنبال آن، قیمت جوچه یک‌روزه است که موجب برخوردار است. شده دولت نتواند سیاست منسجمی را به منظور کنترل

انتخاب تخم مرغ مناسب جوچه کشی



عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده تخم مرغ نطفه‌دار را بررسی کنید.
در چه ماههایی از سال تخم مرغ نطفه‌دار افزایش می‌یابد؟ چرا؟

پرسش



قیمت تخم مرغ و قیمت جوچه را در سال اخیر روی نمودار ترسیم کنید.
ارتباط بین قیمت تخم مرغ و قیمت جوچه را در سال اخیر بیان کنید.

تحقيق
کنید



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
	خرید تخم مرغ از مزارع مرغ مادر معتبر	۱- تعیین قیمت مناسب با در نظر گرفتن درجه ۱ بودن	خرید تخم مرغ درجه یک با قیمت مناسب	۳	
	خرید تخم مرغ از مزارع مرغ مادر معتبر	۲- تعیین نسبی قیمت‌ها با در نظر گرفتن درجه ۱ بودن	خرید تخم مرغ درجه ۲ با قیمت نسبتاً مناسب	۲	
۳	خرید تخم مرغ از مزارع مرغ مادر معتبر	۳- عدم تعیین مناسب قیمت‌ها با در نظر گرفتن درجه ۱ بودن	خرید تخم مرغ درجه ۳ با قیمت نامناسب		۱

روش‌های حمل تخممرغ



۲. حمل تخممرغ توسط شانه و سبد پلاستیکی



۱. حمل تخممرغ توسط شانه و کارتون مقواپی



۳. انتقال تخممرغ توسط گاری به داخل کامیون

درجه حرارت داخل اتاق کامیون حمل تخممرغ‌های جوچه‌کشی باید ۱۸ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی آن ۷۰-۸۰ درصد باشد.

نکته



حمل و نقل تخممرغ‌های جوچه‌کشی

عمل انتقال تخممرغ‌ها باید با احتیاط کامل صورت گیرد. عدم توجه به این موضوع و وجود تکان‌های شدید ممکن است منجر به پاره شدن کیسه‌هایی هواخی و یا ایجاد تغییراتی در داخل تخممرغ و به دنبال آن کاهش جوچه درآوری شود. از این رو بهتر است با قرار دادن قسمت پهن تخممرغ به طرف بالا و بسته‌بندی‌های مناسب، حمل و نقل انجام شود.

فعالیت کارگاهی

وضعیت قرار گرفتن تخم مرغ ها

تخم مرغ ها در محل نگهداری به صورتی قرار می گیرند که قسمت پهنه آنها رو به بالا باشد. البته طی زمان نگهداری باید تخم مرغ ها را روزی چندبار چرخاند. در غیر این صورت جنین به پوسته چسبیده و باعث کاهش جوجه درآوری می شود.

نگهداری تخم مرغ ها

درجه حرارت بستگی به زمان نگهداری دارد؛ ولی عمدتاً بهترین دما برای نگهداری تخم مرغ ها ۱۶ تا ۲۰ درجه سانتی گراد و رطوبت مطلوب ۷۵ درصد است ولی مدت زمان ذخیره و نگهداری تخم مرغ های نطفه دار نباید از ۳ تا ۷ روز بیشتر شود و تهويه تحت فشار به خوبی در انبار تخم مرغ صورت پذيرد.

شرایط نگهداری تخم مرغ های نطفه دار

درصد رطوبت	درجہ حرارت سانتی گراد	مدت نگهداری (روز)
۷۰-۷۵	۱۸-۲۰	۱-۳
۷۰-۷۵	۱۶-۱۸	۴-۱۰



ذخیره تخم مرغ ها در انبار

به منظور جلوگیری از تماس تخم مرغ ها با رطوبت کف، حتماً شانه ها بر روی پالت قرار گیرد. از پالت های پلاستیکی یا فلزی استفاده شود.

توجه






تخممرغ‌ها در انبار قبل از درجه‌بندی



استفاده از چیلر در انبار تخممرغ به منظور سرد کردن محیط

نمودار زیر را تفسیر کنید.



انتخاب تخم مرغ مناسب جوچه کشی

با افزایش زمان نگهداری تخم مرغ، جوچه درآوری کاهش می‌یابد. پس از ۶ روز از زمان ذخیره‌سازی، بهازای هر روز ذخیره بیشتر، درصد جوچه درآوری $1/5^{\circ}$ تا $1/5^{\circ}$ درصد کاهش می‌یابد.

- ۱ حداکثر زمان نگهداری تخم مرغ نطفه‌دار چند روز است؟
- ۲ دلیل عرق کردن تخم مرغ را بیان کنید؟
- ۳ عرق کردن تخم مرغ چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟

تحقیق
کنید



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
	نگهداری تخم مرغ‌های خریداری شده	ایجاد اتاق نگهداری با دما و رطوبت مناسب شانه‌های تخم مرغ	۱- حفظ کیفیت تخم مرغ حین نگهداری ۲- حفظ نسبی کیفیت تخم مرغ حین نگهداری ۳- کاهش کیفیت تخم مرغ حین نگهداری	دما و رطوبت مناسب مکان نگهداری تخم مرغ	۳
				دما و رطوبت نسبتاً مناسب مکان نگهداری تخم مرغ	۲
۴				دما و رطوبت نامناسب مکان نگهداری تخم مرغ	۱

ارزشیابی شایستگی تهیه تخم مرغ نطفه دار

شرح کار:

- ۱- تعیین مراکز فروش تخم مرغ نطفه دار
- ۲- تعیین سویه پرورشی مورد استفاده در جوجه کشی
- ۳- ارزیابی قیمت تخم مرغ و خرید تخم مرغ
- ۴- نگهداری تخم مرغ های خریداری شده

استاندارد عملکرد:

انتخاب تخم مرغ نطفه دار با توجه به قیمت و کیفیت

شاخص ها:

- ۱- مراجعته به مراکز فروش تخم مرغ نطفه دار مورد تأیید سازمان های مربوطه
- ۲- انتخاب تخم مرغ نطفه دار سویه پرورشی مورد نظر
- ۳- خرید تخم مرغ به قیمت مناسب
- ۴- تنظیم و کنترل دقیق دما و رطوبت در اتاق نگهداری

شرایط انجام کار:

تخم مرغ نطفه دار
اتاق نگهداری تخم مرغ
کنترل کننده های دما و رطوبت

ابزار و تجهیزات:

اسناد خرید

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	مراجعته به مراکز فروش تخم مرغ	۲	
۲	انتخاب تخم مرغ	۱	
۳	خرید تخم مرغ	۲	
۴	نگهداری تخم های خریداری شده	۱	
شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: محاسبه و ریاضی جمع آوری و گردآوری اطلاعات، پوشیدن لباس کار، حفاظت از تخم مرغ های نطفه دار در برابر صدمات فیزیکی، دفع بهداشتی پسماندها، صداقت، تصمیم گیری			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری: ۲

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

واحد یادگیری ۳

نطفه یابی

آیاتا به حال پی برده اید؟

- ۱ از چه روش هایی برای نطفه یابی تخم مرغ ها استفاده می شود؟
- ۲ چگونه می توان یک دستگاه نطفه یاب ساده ساخت؟
- ۳ آیا می توان از تخم مرغ های کثیف برای جوچه کشی استفاده کرد؟
- ۴ بعد از فرایند نطفه یابی چه اطلاعاتی را باید ثبت کرد؟

هدف از این بخش آماده سازی دستگاه نطفه یاب، تعیین تخم مرغ های نطفه دار، تمیز کردن تخم مرغ های آلوده و ثبت اطلاعات حاصل از آن است. از نطفه سنجی تخم مرغ ها برای شناسایی تخم مرغ های بارور استفاده می کنند. همچنین می تواند برای مشخص کردن اینکه روند باروری تخم مرغ متوقف شده است یا نه، از این دستگاه استفاده شود. روند نطفه سنجی با آشکار سازی داخل یک تخم مرغ مشخص می شود؛ بنابراین شما قادر به دیدن آنچه که در داخل پوسته است، خواهید بود. اگر نطفه داری بالا نباشد بیشتر تخم مرغ هایی که در ماشین جوچه کشی گذاشته شوند به جوچه تبدیل نخواهند شد و دور ریخته شوند. مشخص کردن نطفه داری تخم مرغ اهمیت اقتصادی دارد، زیرا اگر قبل از فساد تخم مرغ بتوان نطفه دار نبودن آن را تشخیص داد می توان آن را در ماشین قرار نداده و در غیر این صورت آنها در ماشین جوچه کشی شروع به فاسد شدن می کنند و در نهایت تخم مرغ های دیگر را با باکتری ها آلوده کرده و ایجاد بوی بسیار بدی نمایند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که تخم مرغ ها را براساس استاندارد نطفه یابی کنند.

نطفه یابی برای پیگیری چگونگی روند رشد جنین بسیار مفید است. این کار می‌تواند بدون استفاده از نطفه یاب بسیار دشوار باشد. نطفه یاب شامل تاباندن نور به تخمرغ است که اجازه می‌دهد تا شما محتويات آن را ببینید و بررسی کنید که آیا به درستی در حال رشد است یا نه؟



در جوجه‌کشی برخی از تخمرغ‌ها از ابتدا بارور نخواهند

بود، در حالی که رشد و توسعه جنین دیگر تخمرغ‌ها ممکن است در طی مراحل جوجه‌کشی متوقف شود.

با استفاده از نطفه یاب قادر به شناسایی و حذف تخمرغ‌های نابارور که رشد جنین آنها متوقف شده، در طی فرایند جوجه‌کشی خواهد بود.

لازم نیست که تجهیزات نطفه یاب بسیار فانتزی و یا خاص باشند.

از تجهیزات نطفه یاب مناسب استفاده کنید. در گذشته این عمل با استفاده از شعله شمع انجام می‌شد. نیاز اصلی برای این کار یک منبع نور روشن (هرچه روشن‌تر بهتر) با قطر کوچک‌تر از تخمرغ مورد بررسی می‌باشد. شما باید بررسی را در یک اتاق بسیار تاریک انجام دهید تا داخل تخمرغ را ببینید.

نطفه‌سنجدی در دو نوع دستی (سنتی) و شانه‌ای (اسکن نوری) موجود است. در نطفه‌سنجدی دستی (سنتی) تخمرغ‌های جوجه‌کشی را یک به یک در روی سوراخ نوری تعییه شده، قرار داده نطفه‌سنجدی می‌شوند؛ در صورتی که در نطفه‌سنجدی شانه‌ای (اسکن نوری) می‌توان ۲۴ یا ۳۶ عدد تخمرغ جوجه‌کشی را به‌طور همزمان نطفه‌سنجدی کرد.



تخمرغ آلوده



نوربینی (کندلینگ) با استفاده از شعله شمع

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی


شما می‌توانید دستگاه‌های خاص نطفه‌یاب تخم مرغ را از فروشگاه‌های عرضه ماکیان خریداری کنید. این دستگاه معمولاً مانند چراغ‌قوه کوچک است که با باتری و یا یک پلاتین کار می‌کند.



انواع دستگاه نطفه‌یاب تخم مرغ

دستگاه نطفه‌سنجدی شانه‌ای (اسکن نوری) تخم مرغ

قبل از جوجه کشی و برای حذف تخم مرغ‌های ترک‌دار استفاده می‌شود.



در این قسمت تخم مرغ‌ها نوری‌بینی شده و تخم مرغ‌های ترک‌دار و یا با پوسته نامناسب شناسایی و حذف می‌شوند.



دستگاه اواسکوب

دستگاه اواسکوب (Ova Scope): یک فناوری و ابزاری گران قیمت برای نطفه‌سنجدی تخم مرغ، اواسکوب نامیده می‌شود. این دستگاه یک موضع دوار روی محل قرارگیری تخم مرغ دارد. سپس تخم مرغ توسط یک محفظه پوشیده می‌شود. پس از آن شما می‌توانید تخم مرغ را از طریق یک عدسی مشاهده کنید. در این حالت دستگاه تخم مرغ را کمی بزرگ‌تر نشان داده و بررسی آن را آسان‌تر می‌کند.

دستگاه ازاسکوپ (Ez Scope): با استفاده از این دستگاه کلیه مراحل رشد تخم مرغ را به وسیله مانیتور رایانه به طور واضح و با بزرگ نمایی زیاد می توانید مشاهده کنید.



بررسی مراحل رشد تخم مرغ با دستگاه Ez Scope

فعالیت کارگاهی

روش ساخت دستگاه نطفه یاب

شما می توانید کندلر یا دستگاه نطفه سنجی تخم مرغ را در خانه با قرار دادن یک لامپ ۶۰ وات در داخل یک قوطی قهوه و ایجاد یک سوراخ $\frac{2}{5}$ سانتی متری در بالای آن، بسازید. و یا به جای آن، شما می توانید یک چراغ قوه بسیار روشن را انتخاب کنید و آن را با یک تکه مقوا با یک سوراخ (با قطر $\frac{2}{5}$ سانتی متری) در وسط آن بپوشانید.



عوامل مؤثر در تولید تخم مرغ های بی نطفه را بیان کنید.

تحقيق
کنید

بعدی مفید باشد. همچنین این کار می تواند برای دیدن هرگونه ترک کوچک که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست مفید باشد. تخم مرغ های شکسته بیشتر از بقیه مستعد ابتلا به باکتری های مضر هستند که این بر توسعه جنین مؤثر است.

ممکن است شما تخم مرغ ها را قبل از اینکه در ماشین جوجه کشی قرار دهید، نطفه سنجی کنید. در این حالت احتمالاً قادر نخواهید بود تا چیزی ببینید، چه برسد به تمایز بین تخم مرغ خوب و بد، اما این کار به شما نشان می دهد که یک تخم مرغ رشد نیافته چطور به نظر می رسد که این هم می تواند برای مقایسه های



فعالیت کارگاهی

را تا روز چهاردهم رها کنید. در این مرحله شما قادر خواهید بود تا هر تخم مرغی که در بار اول در مورد آن ناطمئن بودید دوباره چک کنید و آنهایی را که هنوز هیچ نشانه ای از رشد ندارند، دور بریزید.


۲ شما باید پس از روز شانزدهم یا هفدهم از نطفه سنجی خودداری کنید؛ چرا که در این مرحله تخم مرغ نباید جایه جا شود و یا حتی در روزهای منتهی به جوجه کشی نباید چرخانده شود. علاوه بر این، رشد جنین بسیار زیاد شده و داخل تخم مرغ را پر می کند؛ بنابراین دید شما بسیار کم خواهد شد.

روش کار با نطفه یاب

- ۱ اگرچه برخی از مردم تخم مرغ را به هنگام جوجه کشی هر روز نطفه سنجی می کنند؛ ولی یک ایده بهتر این است که تا حدود ۷ روز صبر کنید؛ دو دلیل برای این کار وجود دارد:
 - (الف) تخم مرغ ها به دما حساس هستند و انتقال مکرر آنها به خارج و داخل ماشین جوجه کشی می تواند بر رشد جنین به خصوص در مراحل اولیه تأثیر گذارد.
 - (ب) قبل از ۷ روز، تخم مرغ رشد زیادی نیافته و تمایز بین تخم خوب و بد دشوار خواهد بود.
- ۲ پس از نطفه سنجی در روز هفتم شما باید تخم مرغ

به تصاویر زیر توجه کنید و در مورد نحوه کار دستگاه اُواسکوب بحث کنید.

گفت و گو
کنید



دستگاه اُواسکوب



نحوه کار با دستگاه Ez Scope: دستگاه را روشن و سیم رابط را به نمایشگر رایانه متصل کنید. تخم مرغ قابل جوچه کشی را در محل مخصوص قرار دهید و با میکروسکوپ بالای آن، محل دید مورد نظر را تنظیم و با بزرگ نمایی بیشتر در نمایشگر سیستم مشاهده کنید.



بخش های مختلف دستگاه ازاسکوپ

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۱	آماده سازی وسیله نطفه باب	دستگاه نطفه باب	۱- آماده سازی صحیح دستگاه ۲- آماده سازی نسبتاً صحیح دستگاه ۳- آماده سازی نادرست دستگاه	شدت نور نامناسب و توزیع نور نامناسب	۳
۲	۱	دستگاه نطفه باب	۱- آماده سازی صحیح دستگاه ۲- آماده سازی نسبتاً صحیح دستگاه ۳- آماده سازی نادرست دستگاه	شدت نور مناسب و توزیع نور مناسب	۲
۳				یکنواخت	۳


فعالیت کارگاهی

قبل از استقرار تخم مرغ روی دستگاه های مختلف به تصاویر زیر دقت کنید.



فعالیت کارگاهی

- ۱ کار با نطفه یاب
- ۲ را بررسی کنید.
- ۳ لباس کار مناسب و تمیز بپوشید.
- ۴ تخم مرغ های نطفه دار را از تخم مرغ های بدون نطفه جدا کنید.
- ۵ تعدادی تخم مرغ را از دستگاه جوجه کشی بیرون بیاورید.
- ۶ در سریع ترین زمان ممکن تخم مرغ های نطفه دار را به دستگاه جوجه کشی بازگردانید.



تصویر مقابل را تحلیل کنید.

اندازه اتاقک هوایی تخم مرغ در روزهای ۱۴, ۱۸ و ۱۸ از دوره جوجه کشی

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری/نمره‌دهی)	نمره
	تعیین تخم مرغ‌های نطفه‌دار (کندلینگ)	دستگاه نطفه‌یاب	۱- تعیین دقیق تخم مرغ‌های نطفه‌دار ۲- تعیین نسبتاً دقیق تخم مرغ‌های نطفه‌دار ۳- تعیین اشتباہ تخم مرغ‌های نطفه‌دار	نطفه‌دار بودن همه تخم مرغ‌های کندلینگ شده	۳
۲				نطفه‌دار بودن نسبی همه تخم مرغ‌های کندلینگ شده	
۱				نطفه‌دار نبودن تعداد زیادی از تخم مرغ‌های کندلینگ شده	

آلودگی و شرایط نامناسب بهداشتی تخم مرغ

موجود روی پوسته به داخل تخم مرغ کشیده می‌شود و موجب تشکیل اتفاقک هوایی می‌گردد. برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی تخم مرغ‌های جوجه‌کشی باید سریع تخم مرغ را تمیز کرد.

تمیز کردن تخم مرغ‌ها
تخم مرغ‌های جوجه‌کشی را نباید شست و شو داد. در پوسته تخم مرغ بین ۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ سوراخ ریز وجود دارد بیشتر این سوراخ‌ها با لایه‌ای که به طور طبیعی روی پوسته وجود دارد، پوشیده شده‌اند. این لایه‌ها، در اثر شست و شو از بین می‌رونند و سوراخ‌های پوسته باز می‌شوند در این حالت، میکروب‌ها به راحتی وارد تخم مرغ می‌شوند تمیز کردن تخم مرغ‌های کثیف به وسیله برس نرم، سمباده، کارد، سیم‌های ظرفشویی، هر چند اجرا می‌شود؛ ولی می‌تواند موجب آلودگی تخم مرغ گردد، یک تخم مرغ تمیز تخم مرغی است که هیچ وقت کثیف نشده باشد.

آلودگی‌های باکتریایی به آسانی سبب فساد و خرابی تخم مرغ‌های قابل جوجه‌کشی می‌شوند. برخی از اجرام بیماری‌زا به خصوص سالمونلاها و ویروس‌ها می‌توانند قبل از تشکیل پوسته تخم مرغ به داخل آن انتقال یابند. متدائل ترین راه ورود آلودگی به داخل تخم مرغ از طریق منافذ موجود روی پوسته و بعد از تخم‌گذاری است. عوامل باکتریایی می‌توانند طی مدت ۳ ساعت پس از زمان تخم‌گذاری از طریق این منافذ عبور کنند. در صورتی که پوسته تخم مرغ مرطوب و یا کثیف باشد، ورود باکتری‌ها به داخل تخم مرغ بسیار سریع‌تر انجام می‌گیرد. زمانی که تخم مرغ از بدن مرغ خارج می‌شود، درجه حرارتی برابر با دمای بدن مرغ داشته؛ ولی به سرعت سرد می‌شود. این سردشدن سبب کاهش حجم محتويات تخم مرغ به میزان کمی می‌شود. از آنجا که پوسته تخم مرغ در این حالت دچار انقباض نمی‌گردد، داخل تخم مرغ حالت خلاً ایجاد شده و در نتیجه هوا و باکتری‌ها از طریق منافذ

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی



به هیچ وجه از کاغذ سمباده زبر استفاده نکنید
برای تمیز کردن پوسته از چاقو و یا تیغه استفاده نشود.



تمیز کردن پوسته با استفاده از سمباده زبر
موجب تخریب کوتیکول می شود.

فعالیت کارگاهی

مراحل انجام کار

- لباس کار مناسب را پوشیده و به تجهیزات اینمنی و فردی مجهز شوید (کلاه، دستکش و...).
- تخم مرغ های غیر قابل جوجه کشی را جدا کنید.

مراحل تمیز کردن تخم مرغ های کثیف

- ابزار و وسایل مورد نیاز
■ تخم مرغ ■ برس ■ سمباده نرم ■ شانه به تعداد
مورد نیاز

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۳	تمیز کردن تخم مرغ های آلوده	سمباده نرم - دستمال آلوده	۱- تمیز کردن کامل پوسته تخم مرغ های آلوده	مشاهده تخم مرغ های کاملاً تمیز	۳
			۲- تمیز کردن نسبتاً خوب تخم مرغ های آلوده	مشاهده تخم مرغ های نسبتاً تمیز	۲
			۳- تمیز کردن بد تخم مرغ های آلوده	مشاهده تخم مرغ های کثیف	۱



۴ تخم مرغ‌های کمتر آلوده شده را به وسیله برس نرم یا سمباده نرم تمیز کنید.

۵ اجتناب از تمیز و پاک کردن تخم مرغ‌ها به وسیله دستمال مرطوب و کثیف زیرا این روش به سرعت تخم مرغ‌ها را آلوده می‌کند.

۶ از تمیز کردن تخم مرغ‌های خیلی کثیف خودداری کنید زیرا احتمال آلوده شدن آنها وجود دارد.

رعایت اصول ایمنی و بهداشت

۱ قبل از دست زدن به تخم مرغ‌ها دست‌ها شسته و ضد عفونی شوند.

۲ تا حد امکان از دستکش و ماسک استفاده شود.

۳ تخم مرغ‌های قابل جوجه‌کشی و غیرقابل جوجه‌کشی جداگانه جمع‌آوری شوند (تخم مرغ‌های نامرغوب و غیراستاندارد از قبیل ترک برداشته بی‌رنگ و یا دارای لکه رنگی، خیلی بزرگ و کوچک و زیاد کثیف را در شانه جداگانه جمع‌آوری کنید).

۴ بعد از دست زدن به تخم مرغ‌ها دست‌های خود را با استفاده از آب و ماده شوینده مؤثر به طور کامل شسته و سپس ضد عفونی کنید.

۵ احتمال آلودگی تخم مرغ ترک‌دار بیشتر است بنابراین لازم است این گونه تخم مرغ‌ها به سرعت مصرف شوند. عرق کردن تخم مرغ: در صورتی که تخم مرغ از یک محیط سرد به محیط گرم وارد شود عرق می‌کند و باعث افزایش احتمال آلودگی می‌شود. بنابراین تخم مرغ‌ها را نباید بلا فاصله جایه‌جا کرد.


تولیدکنندگان تخم مرغ مجبور به ارزیابی تخم مرغ‌ها بر اساس نطفه‌داری، اندازه و کیفیت آنها هستند. باید متوسط وزن تخم مرغ‌ها را محاسبه و سپس با استانداردهای نزدی مقایسه کرد. تخم مرغ‌های نامناسب برای جوجه‌کشی (شامل تخم مرغ‌های شکسته، ترک‌دار، پوسته نازک، آهکی و ...) را جداگانه بسته‌بندی کنید. تمام اطلاعات باید به صورت گزارش روزانه نوشته شود.

فعالیت کارگاهی

فرم‌های لازم را با توجه به مطالب بیان شده، تهیه کرده و سپس در کلاس درس در مورد آن بحث کنید.

نوربینی تخم مرغ‌های نطفه‌دار

اغلب جوجه‌کشی‌ها قبل از قرار دادن تخم مرغ‌ها در ستر به منظور حفظ تخم مرغ‌های ترک‌دار، آنها را نوربینی می‌کنند. اگر بخواهیم از این روش استفاده کنیم باید تخم مرغ‌ها، شب قبل از آزمایش سرد نگهداری شوند. به این ترتیب دقت عمل دو برابر خواهد شد.



نوربینی (کندلینگ) تخم مرغ های نطفه دار قبل از جوجه کشی

- مراحل انجام کار**
- ۱ لباس کار مناسب، دستکش و ماسک بپوشید.
 - ۲ یک شانه تخم مرغ را انتخاب کنید.
 - ۳ شانه را به طور مستقیم در برابر نور قرار دهید.
 - ۴ با دقت تخم مرغ ها را نگاه کنید و ترک و ... را بیابید.
 - ۵ همزمان با کار، باید تخم مرغ های مشکل دار را با علامت مشخص کرده و سپس از یافته های خود یادداشت برداری کنید.
 - ۶ تخم مرغ ها را در زمان درجه بندی بررسی کنید.
- ۷** تخم مرغ های انتخابی را بار دیگر بررسی کنید.
- ۸** تخم مرغ های حذفی را شناسایی کنید.
- ۹** این اصول را به خاطر داشته باشید:
- (الف) در یک شانه تخم مرغ انتخابی یک تخم مرغ حذفی وجود دارد.
 - (ب) در یک شانه تخم مرغ حذفی یک تخم مرغ انتخابی وجود دارد.
 - (ج) لباس خود را تعویض کنید و وسایل را سرجای خود قرار دهید.

فعالیت کارگاهی

- نطفه یابی**
- ۱ دوش بگیرید و لباس کار تمیز و مناسب جوجه کشی بپوشید.
 - ۲ کار را در یک اتاق تاریک در مجاورت دستگاه جوجه کشی انجام دهید.
 - ۳ تعدادی تخم مرغ انتخاب کنید.
 - ۴ تخم مرغی را جدا کرده و آن را بین انگشت شست و سبابه خود نگه دارید.
 - ۵ سر پهن تخم مرغ (سمتی که کیسه هوا در آن
- است) را به طور مستقیم در برابر نور قرار دهید.
- ۶** همزمان با کار، باید هر تخم مرغ بررسی شده را با یک علامت مشخص و سپس از یافته های خود یادداشت برداری کنید.
- ۷** قضاوت کنید: به این ترتیب، شما می توانید نتایج اولین بازبینی خود را با نتایج حاصل از نطفه سنجی دوم خود مقایسه کنید.
- ۸** سعی کنید به سرعت کار کنید؛ اما نه چنان سریع که تخم مرغ در معرض خطر و آلدگی قرار گیرد.

- ۸** به دنبال علائمی که نشان دهنده تخم مرغ نطفه دار است، بگردید. یک تخم مرغ مورد تأیید دارای یک جنین با رشد موفق است. شما می توانید مورد تأیید بودن یک تخم مرغ را با استفاده از نشانه های زیر تعیین کنید:
- (الف) وجود رگه های خونی گسترش یافته از مرکز تخم مرغ به سمت اطراف.
 - (ب) با وسیله نطفه سنج ضعیف تر، شما ممکن است فقط قادر به نطفه سنجی و به اصطلاح دیدن نیمة پایینی تخم مرغ (کیسه هوا) و نیمه تیره تر بالایی تخم مرغ (جنین در حال رشد) باشید.
 - (ج) با یک وسیله نطفه سنجی (کندلر) خوب، شما قادر به دیدن طرح کلی تاریک جنین در مرکز شبکه رگه های خونی خواهید بود.
- ۹** به دنبال نشانه های توقف رشد تخم مرغ بگردید. برخی از تخم مرغ ها رشدشان در یک مرحله ای به گردانید.
- ۱۰** پس از پایان کار، تخم مرغ ها را به دستگاه باز گردانید.
- ۱۱** اگر شما مطمئن نیستید، فعلاً تخم مرغ را دور نریزید. اگر این کار را انجام دهید، ممکن است تخم مرغی سالم را هم دور نریزید.
- ۱۲** به دنبال نشانه های توافق رشد تخم مرغ باز خواهد داشت.

توجه

اخلاق
حرفه ای

در نطفه یابی تخم مرغ ها دقیق و وسوساً داشته باشید تا وقت و نیروی انسانی و سرمایه هدر نرود.

۱۳ لباس های خود را تعویض کنید.**۱۴** در پایان همه وسائل مورد استفاده شده را سر جای خود قرار دهید.بیشتر
بدانیم

نطفه سنجی تخم مرغ قهوه ای یا خال دار با پوسته تیره در زیر نور شفاف مشکل تر خواهد بود.

بهترین زمان برای نور بینی ۵ الی ۶ روزگی می باشد. تخم مرغ های مشکوک را دوباره در روز چهاردهم بررسی کنید. اگر هنوز هیچ نشانه های از رشد وجود نداشت و یا اگر در نهایت یک حلقه خونی تشکیل شد. شما می توانید آنها را دور بیندازید.

تخم مرغ ها را قبل از انتقال به داخل دستگاه و در زمان جوجه کشی نطفه بینی کنید. اگر قبل از قرار دادن در داخل دستگاه جوجه کشی، روی پوسته تخم مرغ هرگونه ترک و شکستگی مشاهده کردید، فوراً آن را جدا کنید و می توانید این تخم مرغ ها را به فروش برسانید.

انتخاب تخم مرغ مناسب جوچه کشی

مواقب باشید: تخم مرغ ناباروری که مدتی داخل ماشین جوچه کشی قرار گرفته است برای خوردن استفاده نکنید و به فروش نرسانید. آنها دیگر تازه نیستند و می‌توانند شما را بیمار کنند.

فعالیت کارگاهی

ثبت اطلاعات تخم مرغ نطفه دار

ابزار و وسائل مورد نیاز ■ امکانات نوشت افزاری ■ جداول مربوط

مراحل انجام کار

- ۱ از انبار نگهداری تخم مرغ در مرغداری هنرستان بازدید کنید.
- ۲ جدول زیر را با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده تکمیل کنید.

میانگین وزن تخم مرغ‌ها	تعداد تخم مرغ‌های غیر قابل جوچه کشی	تعداد تخم مرغ‌های قابل جوچه کشی	تاریخ درجه‌بندی تخم مرغ	محل تهیه تخم مرغ	میزان تخم مرغ ورودی به انبار	تاریخ ورود به انبار

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/ نمره‌دهی)	نمره
۴	مستندسازی	فرم‌های مربوطه	۱- ثبت دقیق آمار ۲- ثبت نسبتاً دقیق آمار ۳- ثبت آمار با دقت پایین	تعداد صحیح تخم مرغ‌ها	۳
				تعداد نسبتاً صحیح تخم مرغ‌ها	۲
				تعداد نادرست تخم مرغ‌ها	۱

ارزشیابی شایستگی نطفه یابی

شرح کار:

- ۱- راهاندازی وسیله نطفه یاب طبق اصول فنی
- ۲- نطفه یابی صحیح
- ۳- تمیز کردن تخم مرغ های آلوده
- ۴- مستندسازی

استاندارد عملکرد:

دقت در نطفه یابی تخم مرغ

شاخص ها:

- ۱- آماده سازی وسیله نطفه یابی
- ۲- انتخاب تخم مرغ قابل جوچ کشی از نظر ظاهری (شکل، وزن و ...)
- ۳- تمیز کردن تخم مرغ های نطفه دار از آلودگی ها به وسیله سمباده فرم
- ۴- ثبت آمار مربوط به تخم مرغ های نطفه دار

شرایط انجام کار:

نطفه یاب

تخم مرغ های نطفه دار

سمباده نرم، نمون برگ های مربوطه

ابزار و تجهیزات:

دستگاه نطفه یابی - سمباده نرم - دستمال - فرم های مربوط به ثبت آمار - کارتون های بسته بندی تخم مرغ های بدون نطفه و غیر قابل جوچ کشی - شانه پلاستیکی تخم مرغ

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی وسیله نطفه یاب	۱	
۲	تعیین تخم مرغ های نطفه دار	۱	
۳	تمیز کردن تخم مرغ های آلوده	۲	
۴	مستندسازی	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مستولیت پذیری، مدیریت مواد و تجهیزات، تفکر انتقادی، رعایت بهداشت فردی، جلوگیری از آسیب فیزیکی به تخم مرغ ها، حفاظت از تخم مرغ ها از هرگونه آلودگی، دفع بهداشتی پسمندها			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری: ۳

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

پودمان ۲

مدیریت جوجه کشی



داشتن تجهیزات خوب جوجه کشی باعث افزایش بازدهی جوجه کشی خواهد شد، چون نه تنها توانایی جوجه درآوری تخمرغ‌ها بهبود می‌یابد، بلکه نیروی کاری کمتری هم به کار می‌رود و هر دو اینها در راندمان تولید نقش دارند. تولید جوجه باید سودآور باشد. بنابراین هر مسئله‌ای حتی اگر کم اهمیت باشد باید رعایت گردد تا بیشترین بازدهی به دست آید. دستگاه جوجه کشی از دو بخش ستر و هچر تشکیل شده است که مدت زمان لازم برای قرار دادن تخمرغ‌های نطفه‌دار و چرخش آنها در داخل دستگاه ستر تا آماده شدن جوجه برای خروج از تخمرغ در دستگاه هچر را فراهم می‌کند. هم‌اکنون تعداد زیادی دستگاه‌های جوجه کشی به ظرفیت ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تخمرغ در هر نوبت در مؤسسات جوجه کشی بخش‌های دولتی و خصوصی به تولید جوجه یکروزه می‌پردازند. روش‌های ارزیابی کمی و کیفی در جوجه‌ها برای تشخیص موفقیت هج در کارخانه جوجه کشی الزامی است.

واحد یادگیری ۴

کار با دستگاه ستر

آیا تابه حال پی برد هاید؟

- ۱ کدام مواد شوینده در شست و شوی دستگاه ستر استفاده می شود؟
- ۲ کدام مواد ضد عفونی کننده در شست و شوی دستگاه ستر استفاده می شود؟
- ۳ برای تنظیم دستگاه ستر چه عواملی را باید در نظر گرفت؟
- ۴ چه روش هایی برای انتقال تخم مرغ به شانه ستر وجود دارد؟
- ۵ گازدهی تخم مرغ ها و ستر به چه روشی انجام می شود؟
- ۶ فرم لازم جهت ثبت اطلاعات دستگاه ستر دارای چه شاخص هایی است؟

هدف از این بخش شست و شو، ضد عفونی، گازدهی و تنظیم دستگاه ستر و سپس چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ستر و ثبت اطلاعات است. مدت دوره جوجه کشی برای تمامی پرندگان یکسان نیست. مدت زمان این دوره برای تخم نطفه دار مرغ ۲۱ روز و برای تخم شتر مرغ ۴۲ روز است. از این ۲۱ روز (برای جوجه کشی تخم مرغ)، ۱۸ روز اولیه را ستر می نامند. در دوران ستری، نطفه داخل تخم به اندازه کافی رشد کرده و برای خروج از پوسته آماده می شود. با گذشت زمان دستگاه های ستر تحت تأثیر پیشرفت های مختلفی قرار گرفته و اختصاصی تر شده اند. دارای کنترل کننده های پیشرفت ه بوده و چرخش تخم مرغ ها در آن به طور خود کار انجام می شود.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که دستگاه ستر را مطابق دستورالعمل راه اندازی و کنترل کنند.

روز ۵	روز ۴	روز ۳	روز ۲	روز ۱	غیربارور
					
* پیدایش آرنج و زانو	* تجمع رنگدانه در چشم	* ضربان قلب ووضوح عروق خونی	* سیر تکامل به وضوح دیده می‌شود.	* ظهور علائم رشد	* عدم وجود نشانه‌ای از رشد
* دندانک کاملاً مشخص می‌شود.	* جنبین کم کم شبیه پرندۀ می‌شود.	* مشخص شدن محل دهان	* شیارهای پر دیده می‌شود.	* شروع رشد تاج	* پیدایش نوک
* مشخص شدن اعما و احشا به داخل محوطه شکمی	* چرخش جنبین و قرار گرفتن سر در انتهای بزرگ تخم مرغ	* نوک بالا و پایین از نظر طولی برابر می‌شود.	* نوک پرها	* شروع حرکات ارادی	* شروع حرکات ارادی
روز ۱۰	روز ۹	روز ۸	روز ۷	روز ۶	
					
* دندانک کاملاً مشخص می‌شود.	* جنبین کم کم شبیه پرندۀ می‌شود.	* مشخص شدن محل دهان	* شیارهای پر دیده می‌شود.	* شروع رشد تاج	
* کشیدن اعما و احشا به داخل محوطه شکمی	* چرخش جنبین و قرار گرفتن سر در انتهای بزرگ تخم مرغ	* نوک بالا و پایین از نظر طولی برابر می‌شود.	* نوک پرها	* نوک بالا و پایین از نظر طولی برابر می‌شود.	
روز ۱۵	روز ۱۴	روز ۱۳	روز ۱۲	روز ۱۱	
					
* کشیدن اعما و احشا به داخل محوطه شکمی	* چرخش جنبین و قرار گرفتن سر در انتهای بزرگ تخم مرغ	* پیدایش کرک پرها	* انگشتان پا کاملاً شکل گرفته	* دندانه شدن تاج	
* پوشیده شدن بدن با پرهای نرم	* در انتهای بزرگ تخم مرغ	* پوشیده شدن بدن با پرهای نرم	* ظاهر شدن پرهای اولیه	* پرهای دم به وضوح دیده می‌شود.	
روز ۲۰	روز ۱۹	روز ۱۸	روز ۱۷	روز ۱۶	
					
* کیسه زردۀ به طور کامل به داخل بدن کشیده شده	* کیسه زردۀ به داخل بدن کشیده شده	* رشد جنبین تقریباً کامل شده	* کاهش مایع آمنیوتیک	* پوشش کامل بدن توسط پرها	
* جنبین تبدیل به جوجه شده	* مایع آمنیوتیک کاملاً جذب شده	* کیسه زردۀ هنوز در خارج بدن است. سر در زیر بال راست	* سر پایین پاها قرار گرفته	* الومین تقریباً جذب شده	
* جنبین پوسته داخلی و خارجی را نوک می‌زند.	* تخم مرغ را اشغال کرده (به غیر از کیسه هوایی)				

براساس نوع ماده آلایینده، سختی آب، درجه حرارت و شیوه کاربرد، سطوح مورد نظر و نیز وضعیت فاضلاب، از مواد مختلفی می‌توان برای شستشوی پاک و ضد عفونی شوند.

برای دستیابی به قدرت جوجه‌درآوری بالا و تولید

از چه ترکیباتی می‌توان جهت شستشوی ستر استفاده نمود؟

باید ملایم‌ترین، کم خطرترین و دارای کمترین اثر فرسایش، در نظر گرفته شود.

هر ماده تجاری شوینده (دترجنت) ممکن است از ۲ تا ۱۵ ترکیب مختلف از مواد فوق تشکیل شده باشد. برای انتخاب مواد شوینده مناسب در جوجه‌کشی



شستشو و ضد عفونی دستگاه ستر

شستشو و ضد عفونی ستر قبل از چیدن تخم مرغ‌ها برای سلامت هج بسیار اهمیت دارد.

مواد پاک کننده مورد استفاده در شستشوی ستر

- پایه و اساس ترکیبات شستشو دهنده را پاک‌کننده‌ها تشکیل می‌دهند.
- انواع مختلفی از این مواد در بازار موجود است.
- از پاک‌کننده‌های مخصوص لباس‌شویی نباید استفاده شود.
- اگر پاک‌کننده کف می‌کند باید از محلول‌های ضد کف به آب شستشو دهنده اضافه شود.

از عوامل مؤثر در بازدهی ماشین‌های جوجه‌کشی رعایت اصول بهداشت قبل، حین و بعد از پایان دوره جوجه‌کشی است. پس از پایان هر دوره جوجه‌کشی، باید دستگاه ستر نظافت، شستشو و ضد عفونی شود.

فعالیت کارگاهی

شست و شوی دستگاه ستر

ابزار و وسایل مورد نیاز ■ لباس کار ■ اسکاچ ■ برس ■ مایع شست و شو

مراحل انجام کار

- ۱ لباس مناسب برای شست و شوی دستگاه ستر بپوشید که در صورت خیس شدن مشکلی ایجاد نکند.
- ۲ دستگاه را به طور کامل تخلیه کنید، راکها و وسایل قابل انتقال را به بیرون ستر ببرید.
- ۳ ستر را کاملاً تمیز جارو کنید.
- ۴ ستر را با مواد پاک کننده (اسکاچ، برس سیمی و مایع شست و شو دهنده) بشویید.

مقدار پاک کننده مورد استفاده به سختی آب بستگی دارد. هرچه مقدار مواد معدنی آب بیشتر باشد باید از مقدار بیشتری پاک کننده استفاده کرد.

نکته مهم



گاهی اوقات برای کاهش عوامل بیماری‌زا، به آب شست و شو، مواد ضد عفونی اضافه می‌کنند. به طور مثال افزودن محلول‌های حاوی کلر که به آهستگی کلر آزاد می‌کنند.

نکته مهم



- ۵ دستگاه را با آب تحت فشار و ولرم شست و شو دهید.
- ۶ راکها و سینی‌ها را به طور کامل بشویید.
- ۷ پس از خشک شدن دستگاه آن را ضد عفونی کنید.



شست و شوی دستگاه ستر

برای کنترل آلودگی در کارخانه جوچه کشی باید یک برنامه بهداشتی اعمال شود و نتایج آن به وسیله انجام آزمایش‌های استاندارد ارزیابی شود.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
	شست و شوی دستگاه ستر	مواد شوینده لوازم شوینده	۱- شست و شوی کامل دستگاه با دقت زیاد ۲- شست و شوی نسبتاً کامل با دقت نسبتاً زیاد ۳- شست و شوی ناقص و با دقت کم	عدم مشاهده آلودگی در دستگاه‌های ستر مشاهده آلودگی جزئی در دستگاه ستر مشاهده آلودگی جزئی در دستگاه ستر	۳ ۲ ۱

ضدغونی دستگاه ستر

- مواد ضدغونی کننده باید دقیقاً طبق دستورالعمل کارخانه سازنده مصرف شود. این گونه مواد همیشه بی خطر نبوده و اکثراً سمی‌می باشند و باید با دقت حمل و استفاده از مواد ضدغونی الزامی است.
- کارکنان کارخانه باید به خوبی با نحوه حمل، نگهداری و استفاده از مواد ضدغونی کننده آشنا باشند.
- همواره طریقہ مصرف این گونه مواد را از کارخانه سازنده دریافت و بر طبق توصیه‌های کارخانه عمل شود.
- سرپرست کارخانه جوچه‌کشی باید از جنبه‌های

فعالیت کارگاهی

مراحل ضدغونی دستگاه ستر

- قبل از به کارگیری هر گونه مواد ضدغونی کننده باید تمام مواد آلی را شسته و تمیز کرد. برای مثال راک‌ها و سینی‌های ستر باید قبل از ضدغونی شدن، به خوبی با آب و مواد پاک‌کننده شسته شوند.
- محلول ضدغونی را طبق توصیه کارخانه سازنده آماده کنید.
- ماده ضدغونی تهیه شده را داخل دستگاه محلول پاش ریخته و دستگاه ستر را ضدغونی کنید.
- راک‌ها و سینی تمیز ستر را با مواد ضدغونی کننده ترجیحاً با ترکیبات چهارتایی آمونیوم ضدغونی کنید.
- سپس با گاز فرمالدئید (فرمالین + پرمنگنات) دود داده شوند.
- وسایل مختلف دیگر را مانند سینی‌های ستر و هچر، گاری‌های حمل تخم مرغ و جوچه و ... را به این روش به طور کامل ضدغونی کنید.



راک ستر

هرگونه سهل انگاری در انجام مراحل ضدغونی دستگاه ستر منجر به کاهش شدید جوچه درآوری و ضرر اقتصادی خواهد شد.

توجه



ضدغونی راک‌ها و دستگاه ستر

آیا می‌توان از گاز ازن به عنوان جایگزین فرمالین برای ضدغونی تخم مرغ‌ها استفاده نمود؟

تحقیق
کنید



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۲	ضدغونی دستگاه ستر	مواد ضدغونی لوازم ضدغونی	۱- ضدغونی کامل دستگاه با دقت بالا	بار میکروبی کم در دستگاه ستر	۳
			۲- ضدغونی نسبتاً کامل دستگاه با دقت نسبتاً بالا	بار میکروبی نسبتاً کم در دستگاه ستر	۲
			۳- شست و شوی ناقص با دقت پایین	بار میکروبی زیاد در دستگاه ستر	۱

راه اندازی سترها

۱. تهویه

(الف) سترها معمولاً هوای تازه را از اتاقی که در آن قرار دارند می‌گیرند. این هوای تازه، اکسیژن و مقداری از رطوبت نسبی مورد نیاز تخم مرغ‌ها را تأمین می‌کند. همچنین گاز کربنیک و حرارت اضافی تولید شده توسط تخم مرغ‌ها نیز با هوا خارج می‌شود.

(ب) میزان ورود هوا به سترها باید $13/52$ متر مکعب در ساعت برای هر 10000 عدد تخم مرغ باشد.

(ج) همه سترها یک منبع تأمین کننده رطوبت دارند که می‌تواند سطوح مختلف رطوبت نسبی را کنترل کند. هوای ورودی به سترها معمولاً رطوبت کمی دارد. درجه حرارت هوای ورودی به ستر باید $24-27$ درجه سانتی گراد باشد.

(د) سترهای چند مرحله‌ای احتیاج به یک مقدار هوای ثابت دارند. این میزان هوای ورودی به سترها باید طوری تنظیم شود تا مقدار گاز کربنیک در داخل ستر از حد $4/0$ درصد تجاوز نکند.

در طبیعت اکثر پرندگان پس از یک دوره تخم‌گذاری، بر روی تخم‌های خود خوابیده تا تبدیل به جوجه شوند. ماشین جوجه‌کشی با الهام از طبیعت و رفتارهای مرغ کرج به صورت مصنوعی و کاملاً موفقیت‌آمیز ساخته شده است.

شرایط فیزیکی مطلوب جهت رشد مناسب جنین به شرح زیر است:

- ۱ تهویه یا تبادل گازی کافی
- ۲ درجه حرارت مناسب
- ۳ رطوبت مناسب
- ۴ چرخش منظم تخم مرغ‌ها

در دستگاه‌های جوجه‌کشی تولید شده توسط کارخانه‌های مختلف، ظرفیت دستگاه، تناوب چیدن تخم مرغ‌ها (مثلاً یک یا دو بار در هفته) و وضعیت چیدن تخم مرغ‌ها در داخل ماشین، متفاوت است. دستگاه‌ها را باید طبق توصیه‌های سازندگان آنها راه‌اندازی نمود و تنظیمات آنها را تغییر نداد.

غلظت اکسیژن موردنیاز 21 درصد است. به ازای 1 درصد کاهش در غلظت اکسیژن 5 درصد از میزان جوجه‌درآوری کاسته می‌شود. افزایش ارتفاع به دلیل کاهش فشار اکسیژن موجب کاهش جوجه‌درآوری می‌شود.

نکته مهم



۲. حرارت


هرگونه نوسان در حرارت ماشین جوجه‌کشی باعث کاهش جوجه‌درآوری و یا غیرطبیعی شدن جوجه‌ها می‌شود. اثرات سوء کاهش حرارت به مراتب بیشتر از اثرات حرارت بیش از حد است. به عنوان مثال در صورتی که دما به مدت ۳ ساعت در ۴۲ درجه بماند، افزایش تلفات رخ می‌دهد. دمای دستگاه‌های مختلف بنابر توصیه کمپانی‌ها ممکن است کمی متفاوت باشد و دمای بیشتر و کمتر از آن موجب کاهش جوجه‌درآوری و کاهش کیفیت جوجه می‌شود.

درسه روز آخر باید از تبخیر شدید آب جلوگیری شود. در دمای بالا مرگ و میر جنینی بیشتر و پوست جنینی‌های تلف شده غالب پرخون و قرمز است و بسیاری از جوجه‌ها زودتر از موعد خارج می‌شوند. کاهش دمای دستگاه جوجه‌کشی باعث خروج نامنظم جوجه‌ها و تأخیر در هج می‌شود و ناف جوجه‌ها به خوبی بسته نمی‌شود و موجب زیاد شدن عفونت ناف می‌شود.

رابطه بین متوسط مدت زمان جوجه‌درآوری، قابلیت جوجه‌درآوری و دما

بحث‌گنید

نمودار را با راهنمایی هنرآموز خود تفسیر کنید.




۳. رطوبت

در طی جوجه‌کشی از طریق منافذ موجود روی پوسته تخمرغ رطوبت از دست می‌رود. میزان از دست دادن رطوبت بستگی به تعداد و اندازه منافذ دارد.

با توجه به نمودار به سؤال زیر پاسخ دهید:

سؤال: بهترین جوجه‌درآوری زمانی حاصل می‌شود که تخمرغ‌ها در طی ۱۸ روز اول دوره جوجه‌کشی چند درصد از وزن خود را از دست بدھند؟
رطوبت در ستر ۶۰ درصد و در داخل هچر ۶۵-۷۵ درصد توصیه می‌شود.

میزان کاهش وزن تخم مرغ در طی جوجه کشی



درباره اثر افزایش و کاهش رطوبت دستگاه جوجه کشی بر جوجه درآوری تحقیق کنید و سپس جدول زیر را کامل کنید.

تحقیق
کنید



نتایج	میزان رطوبت
؟	رطوبت زیاد
؟	رطوبت کم

۴. چرخش تخم مرغ ها

وضعیت قرار گرفتن تخم مرغ ها: سر پهن تخم مرغ ها به طرف بالا باشد (اگر سر باریک بالا باشد ۱۰ درصد جوجه درآوری کاهش و ۴۰ درصد کیفیت جوجه ها پایین می آید) و طی دوره جوجه کشی تخم مرغ ها باید در ستر چرخش داده شوند. این عمل از چسبیدن جنین به غشاها پوسته جلوگیری و به توسعه غشاهای جنینی کمک می کند. با توجه به اینکه حرارت تولیدی جنین با رشد آن افزایش می یابد چرخش منظم به جریان هوا و خنک شدن تخم مرغ کمک می کند. در ستر هر ساعت یا هر سه ساعت باید ۹۰ درجه چرخش صورت گیرد.



چرخش تخم مرغ در دستگاه ستر

فعالیت کارگاهی

تنظیمات دستگاه ستر

نه؟ یک دماسنجد و رطوبت‌سنج نیز به صورت دستی داخل ماشین جوچه‌کشی قرار دهید و مقادیر آن را با مقادیر صفحه نمایشگر کنترل کنید.

۱ درجه حرارت و رطوبت را هر ساعت یکبار از روی صفحه دستگاه بررسی کرده و یادداشت کنید.

۲ سرویس‌های لازم باید در طی دوره خواباندن تهیه، درجه حرارت و رطوبت را (با استفاده از دماسنجد و رطوبت‌سنجی که داخل دستگاه گذاشته‌اید) بررسی

۳ روی در برخی از سترها، نمایشگر درجه حرارت و رطوبت نصب می‌شود. برای مطمئن شدن از این که آیا آنها دما و رطوبت را درست نشان می‌دهند یا

مراحل انجام کار



انجام سرویس‌های لازم در دستگاه‌های ستر



تابلو کنترل

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، موارد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۳	تنظيم دستگاه ستر به دستگاه (حسگرها) لوازم کنترلی	۱- تنظیم دقیق دستگاه ستر	ایجاد دما، رطوبت مناسب	ایجاد دما، رطوبت مناسب	۳
		۲- تنظیم نسبتاً دقیق دستگاه ستر	ایجاد دما و رطوبت نسبتاً مناسب	ایجاد دما و رطوبت نسبتاً مناسب	۲
		۳- تنظیم دستگاه با دقت کم	ایجاد دما و رطوبت نامناسب	ایجاد دما و رطوبت نامناسب	۱

فعالیت کارگاهی


روش‌های انتقال تخم مرغ به شانه ستر

مراحل انجام کار

۱. انتقال دستی



۱. انتقال تخم مرغ به شانه ستر به روشنی دستی



۲. انتقال تخم مرغ به شانه ستر به روشنی خودکار

۲. انتقال نیمه خودکار

۳. انتقال تمام خودکار



گاری ستر با تخم مرغ‌های چیده شده



انتقال شانه‌ها به گاری ستر

فعالیت کارگاهی



چیدن تخممرغ ها در سینی های ستری

مراحل انجام کار

- ۱ دستها را با محلول ضد عفونی کننده، ضد عفونی کنید.
 - ۲ از قرار دادن تخممرغ های ترک خورده و یا بد شکل درون دستگاه خودداری کنید.
 - ۳ تخممرغ ها را طوری درون شانه قرار دهید که سطح نیز آن رو به پایین باشد.
 - ۴ برای قراردادن هر نوع تخممرغ از شانه مخصوصی که برای آن تهیه شده است استفاده کنید.
 - ۵ دقیق هر چه بیشتر کارگران در زمان چیدن تخممرغ ها، ضروری می باشد.
 - ۶ تخممرغ های درجه ۲ در راک های ستری جداگانه قرار داده شوند.
- شانه ها را طوری داخل دستگاه ستر بگذارید که ردیف ها به صورت افقی قرار گیرند تا در هنگام گردش، تخممرغ از شانه خارج نشود.

فعالیت کارگاهی

گازدهی تخممرغ ها

مراحل انجام کار

پس از چیدن تخممرغ ها در راک ستری و قبل از انتقال به سالن ستر، راک ها به سالن دیگری تحت عنوان اتاق گاز منتقل شده و در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه دود داده می شوند.



به عمل انتقال تخممرغ ها
به دستگاه ستر، خواباندن
می گویند.



دود دادن تخممرغ ها قبل از انتقال به ستر
گاز فرمالدئید ۹۷ تا ۹۹ درصد از
میکروارگانیسم های روی پوسته را از بین می برد.



ضد عفونی تخم مرغ ها با مواد
ضد عفونی کننده کف زا


فعالیت کارگاهی

ضدغونی دستگاه ستر بدون تخم مرغ با گاز

مراحل انجام کار

- ۱ لباس کار بپوشید. در زمان شروع دود دادن حتماً از ماسک ضد گاز و دستکش استفاده کنید.
- ۲ وسایل مورد نیاز (فرمالین و پرمنگنات به میزان مورد نیاز، ظرف مناسب) را آماده کنید.
- ۳ حرارت (دما ۲۵ درجه سانتی گراد) و رطوبت (درصد ۷۵) مناسب را تأمین کنید.
- ۴ ابتدا پرمنگنات سپس فرمالین را داخل ظرف اضافه کنید.
- ۵ بلا فاصله پس از ریختن فرمالین محل را ترک کنید.
- ۶ ۳۰ دقیقه صبر کنید تا گاز اثر کند.
- ۷ بعد از زمان مورد نظر هواکشها را روشن کرده و درها را باز کنید.

چیدن تخم مرغ‌ها در ماشین جوجه‌کشی: به منظور جلوگیری از ایجاد شوک حرارتی تخم مرغ‌ها نباید بلا فاصله از اتاق نگهداری به داخل دستگاه ستر منتقل شوند بلکه باید قبل از چیدن در ستر در سالن ستر گرم شوند که به این عمل پیش گرم کردن می‌گویند. دمای مناسب پیش گرم ۲۴-۲۷ درجه سانتی گراد است. جریان مناسب هوا نیز در شرایط پیش گرم لازم است. زمان لازم ۱۲-۶ ساعت است و (بسته به جریان هوا) رطوبت نسبی پیش گرم ۶۵-۵۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.



قسمتی از کارخانه جوجه‌کشی

الف) در رابطه با محسن پیش گرم کردن تخم مرغ‌ها گفت و گو کنید.

ب) درباره شکل بالا بحث کنید.

گفت و گو
کنید



فعالیت کارگاهی

دود الزامی است.

۴ بعد از دود دادن هواکش‌ها را روشن کنید تا دود خارج شود.

۵ درجه حرارت و رطوبت دستگاه ستر را از قبل تنظیم کنید.

۶ راک‌های حاوی تخمرغ‌ها را به آرامی به ستر منتقل دهید.

۷ تاریخ انتقال به ستر، میانگین وزن تخمرغ‌ها، تعداد راک‌ها و تخمرغ‌های انتقالی را یادداشت کنید.

انتقال تخمرغ‌ها به ستر

مراحل انجام کار

۱ تخمرغ‌های درجه‌بندی شده را به داخل شانه‌های ستر انتقال دهید.

۲ راک‌های ستر را که حاوی تخمرغ‌های جوجه کشی هستند به مدت ۱۲-۶ ساعت به اتاق پیش گرم انتقال دهید.

۳ دود دادن تخمرغ‌ها قبل از انتقال به ستر در اتاق

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
	چیدن تخمرغ‌ها در دستگاه ستر	دستگاه ستر وسایل جانبی دستگاه ستر	۱- چیدن شانه‌های داخل راک‌ها با دقت زیاد ۲- چیدن شانه‌ها داخل راک‌ها با دقت کم	عدم شکستگی و صدمه دیدگی تخممرغ‌های نطفه‌دار حین چیدن در ستر	۳
۴				شکستگی و صدمه دیدگی بسیار کم تخممرغ‌های نطفه‌دار حین چیدن در ستر	۲
				شکستگی و صدمه دیدن تخممرغ‌های نطفه‌دار حین چیدن در ستر	۱

عوامل مؤثر بر طول دوره جوجه‌کشی

۱ دمای ستر: دمای ستر معمولاً مختص دستگاه مربوطه می‌باشد. ولی جهت دستیابی به یک زمان مناسب برای خروج جوجه‌ها می‌توان زمان چیدن تخممرغ‌ها را در دستگاه متناسب با سن و اندازه تخممرغ‌ها اصلاح نمود. با کاهش درجه حرارت انکوباتور زمان جوجه‌کشی افزایش می‌یابد.

۲ اندازه تخممرغ: تخممرغ‌های بزرگ‌تر زمان

دوره جوچه‌کشی طولانی‌تری دارند.

جوچه کشی بیشتری لازم دارند. (برای تخم مرغ های

۶ بیماری: بیماری‌های خاص و استرس‌های واردہ به بیش از ۵۰ گرم به ازای ۲/۵ گرم افزایش وزن تخم مرغ گلله مادر، دوره جوجه‌کشی را طولانی‌تر می‌کند. طول جوجه‌کشی ۳۰ دقیقه افزایش می‌یابد).

۴ فصل: تخم مرغ های تولید شده در فصول گرم نسبت به فصول سرد دوره جوچه کشی کوتاه تری دارند.

۵ ضخامت پوسته: تخم مرغ‌های با پوسته ضخیم‌تر

دماهی داخل ستر بر اساس دماسنج خشک ۳۷/۲-۳۷/۸ درجه سانتی گراد (۱۰۰-۹۸/۵ درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی ۶۰ درصد است. تخم مرغ ها به مدت ۱۸ روز در ستر باقی میمانند.

نکته مفہوم



فعالیت کارگاهی

فرم لازم جهت ثبت اطلاعات دستگاه ستر را تهیه کنید.

فرم ثبت اطلاعات ستر

ملاحظات	چرخش (چپ / راست)	رطوبت	درجة حرارة	شماره ستر	ساعت
					۱
					۲
					۳
					۴
					۲۴

فعالیت کارگاهی

شیخ آمار

۱ آمارهای کارخانه جوجه‌کشی با سه هدف تهیه می‌شوند:
الف) کمک به تصمیم‌گیری روزانه و هفتگی مدیریت جوجه‌کشی.

- ب) تنظیم جریان ورود تخم مرغ و خروج جوچه از کارخانه جوچه کشی.
- ج) کمک به اتخاذ تصمیمات کلی در مورد سیستم کارخانه جوچه کشی.
- ۲** جهت دستیابی به اهداف فوق در دو زمینه کلی باید آمارگیری انجام پذیرد:
- (الف) آمار مربوط به گلهای مادر
- ب) همچنین آمار مربوط به بازدهی دستگاه‌های جوچه کشی مثل باروری، درصد جوچه‌درآوری، تعداد جوچه‌های واژده، تخم مرغ‌های فاسد و ...
- ۳** برگه‌های آمارگیری باید دارای خصوصیات زیر باشند:
- (الف) تکمیل کردن آن آسان باشد.
- (ب) تفسیر آن به راحتی صورت گیرد.
- (ج) مقایسه آنها با نتایج مورد انتظار امکان‌پذیر باشد.
- ۴** تجزیه و تحلیل آمارها و نتایج آن در اداره دستگاه‌های جوچه کشی و یافتن اختلاف‌های موجود بین آمارهای واقعی و نتایج مورد انتظار کمک زیادی به سرپرست جوچه کشی می‌کند.
- ۵** بررسی آمارهای گله بعد از هر هج، مشکلات موجود را به خوبی مشخص کرده و در نتیجه می‌توان این اشکالات را در مراحل اولیه برطرف کرد.
- ۶** آمار جداگانه هر دستگاه را نیز می‌توان با استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای ثبت کرد.
- ۷** یک گزارش مناسب از وضعیت جنین، اطلاعات لازم جهت ارزیابی جوچه کشی را فراهم می‌کند.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۱	ثبت اطلاعات	فرم‌های مربوط	۱- ثبت دقیق آمار و اطلاعات ۲- ثبت نسبتاً دقیق آمار و اطلاعات ۳- ثبت آمار با دقت پایین	تعداد صحیح تخم مرغ‌ها	۳
				تعداد نسبتاً صحیح تخم مرغ‌ها	۲
				تعداد نادرست تخم مرغ‌ها	

ارزشیابی شایستگی کار با دستگاه ستر

شرح کار:

- ۱- شست و شوی دستگاه ستر
- ۲- ضدغونی دستگاه ستر
- ۳- تنظیم دستگاه ستر
- ۴- چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ستر
- ۵- ثبت اطلاعات

استاندارد عملکرد:

کنترل دقیق دستگاه ستر

شاخص ها:

- ۱- شستن دستگاه ستر و لوازم جانبی و سالن های مربوط به آن
- ۲- ضدغونی دستگاه ستر و سالن های مربوطه
- ۳- تنظیم دما، رطوبت و کنترل چرخش تخم مرغ ها در دستگاه ستر
- ۴- قرار گرفتن شان حاوی تخم مرغ در داخل دستگاه ستر
- ۵- تکمیل نمون برگ های مربوطه

شرایط انجام کار:

دستگاه ستر
مواد ضدغونی کننده
تخم مرغ، شان مخصوص، آب ، دستگاه محلول پاشی
نمون برگ های مربوطه

ابزار و تجهیزات:

دستگاه بسته - لوازم جانبی - حس گرها - فرم های مربوط به اطلاعات دستگاه ستر - مواد شوینده - مواد ضدغونی کننده، لوازم شست و شو و ضد ع gonii

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	شست و شوی دستگاه ستر	۲	
۲	ضدغونی دستگاه ستر	۲	
۳	تنظیم دستگاه ستر	۱	
۴	چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ستر	۲	
۵	ثبت اطلاعات	۱	
شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: بهبود عملکردهای سیستم، محاسبه و ریاضی، ایمنی فردی، حفظ لوازم و تجهیزات، حفظ تخم مرغ های نطفه دار، دفع بهداشتی پساب حاصل از شست و شو و ضدغونی، صداقت، امانت داری			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری: ۴

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

واحد یادگیری ۵

کار با دستگاه هچر

آیا تابه‌حال پی‌برده‌اید؟

- ۱ کدام مواد شوینده در شست و شوی دستگاه هچر استفاده می‌شوند؟
- ۲ کدام مواد ضدعفونی کننده در شست و شوی دستگاه هچر استفاده می‌شوند؟
- ۳ برای تنظیم دستگاه هچر چه عواملی را باید در نظر گرفت؟
- ۴ چه روش‌هایی برای انتقال تخمرغ از ستر به سینی‌های هچری وجود دارد؟
- ۵ از دلایل عدم هج تخم مرغ‌ها به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
- ۶ فرم لازم برای ثبت اطلاعات دستگاه هچر باید دارای چه شاخص‌هایی باشد؟

هدف از این بخش شست و شو، ضدعفونی، گازدهی و تنظیم دستگاه هچر و سپس انتقال تخمرغ‌ها به سینی‌های هچری و ثبت اطلاعات است. سه روز آخر دوران جوجه‌کشی را هچر می‌نامند. در مدت زمان هچری گردش دستگاه جوجه‌کشی باید متوقف شود، این عمل به دلیل خروج راحت‌تر جوجه از داخل تخمرغ صورت می‌پذیرد، رطوبت و دمای دستگاه جوجه‌کشی به ترتیب افزایش و کاهش می‌یابد. در مرحله هچری باید تخمرغ‌ها را در داخل سبدهای هچری قرار داد تا مانع بروز تلفات ناشی از افتادن جوجه‌ها به کف دستگاه ججه‌کشی شود.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که دستگاه هچر را مطابق دستورالعمل راه اندازی و کنترل کنند.

است که در ستر استفاده می‌شود؛ برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بهبخش ستر مراجعه شود. مواد ضدعفونی کننده سطحی در موقع عدم حضور مواد آلی خیلی مؤثرند. مواد ضدعفونی کننده برای تمیز کردن به کار نمی‌آیند و تنها میکرووارگانیسم‌ها را از بین می‌برند. این ترکیبات فقط وقتی مؤثرند که قبلًا سطح مورد اثر به وسیله مواد شوینده کاملاً تمیز و عاری از مواد آلی شده باشد. شستشوی کامل با مقادیر فراوان آب به خوبی فرایند تمیز کردن را انجام نمی‌دهد و بهترین روش برای ضدعفونی و حذف باقیمانده سطوح از میکرووارگانیسم‌ها استفاده از مواد شوینده استاندارد خواهد شد.

است.

دوره جوجه کشی در مرغ ۲۱ روز است؛ اما براساس شرایط تخممرغ‌ها و یا دستگاه‌های جوجه‌کشی ممکن است این زمان چند ساعت زودتر و یا دیرتر باشد. از طرف دیگر تخممرغ‌های نطفه‌دار در شرایط یکسان در دستگاه‌های مختلف نیز ممکن است هج یکسان نداشته باشند. بهترین زمان بیرون آوردن جوجه‌ها از دستگاه هچر زمانی است که حدود ۵ درصد از جوجه‌ها پشت گردنشان خیس باشد. در دستگاه‌های جدید سیستم خشک کن اتوماتیک وجود جوجه‌ها در دستگاه‌های مختلف به صورت همزمان خشک خواهند شد. روش‌های شستشو در هچر مانند همان روش‌هایی

فعالیت کارگاهی

آماده‌سازی مواد شوینده

- ۱ ابتدا ماده شوینده مناسب را انتخاب کنید.
۲ ابزار و وسایل مورد نیاز لباس کار مواد شوینده
۳ دستورالعمل ماده شوینده را مطالعه کنید.
۴ به نسبت بیان شده در دستورالعمل ماده شوینده
را در آب حل کنید.
۵ مراحل انجام کار
۶ لباس کار بپوشید.

شستشوی هچری در بین هج‌ها

به گونه‌ای باشد که شستشو و ضدعفونی آنها به آسانی انجام شود. تمام مواد باقیمانده از دوره قبل از قبیل جوجه‌های واژده، پوسته تخم مرغ، مدفوع، باقیمانده بافت، کرک و پر و غیره باید از دستگاه هچر حذف شوند.

تمیز کردن هچری در بین هج‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید با دقت کامل انجام گیرد. هر قسمت از دستگاه باید به طور کامل جارو و ساییده شده سپس ضدعفونی و بخار داده شود. سالن جوجه‌کشی و نحوه قرار گرفتن دستگاه‌ها در آن باید حذف شوند.

فعالیت کارگاهی

نظافت دستگاه هچر

- ۱ ابزار و وسایل مورد نیاز لباس کار اسکاچ
۲ لباس کار بپوشید.
۳ ابتدا تمام سینی‌ها، سبدها و راک‌ها (گاری
برس مایع شستشو

- محلول‌های شوینده و برس‌های زبر بشویید.
- چرخدار) را از دستگاه هچر خارج کنید.
- ۳ با جارو برقی قوی داخل دستگاه هچر را تمیز ۵ سینی‌ها، شانه‌ها و راک‌های خارج شده از دستگاه هچر را نیز با مواد پاک کننده بشویید.
- ۴ محوطه کف، سقف و اطراف دستگاه هچر را با

توجه

- برای تمیز کردن سطوح با آب، توجهی ویژه به سختی، شوری و pH آب داشته باشد.
- شست وشوی کامل با مقادیر فراوان آب به خوبی فرایند تمیز کردن را انجام نمی‌دهد.



فعالیت کارگاهی

- ۱ راک‌ها و سبدهای خالی را از دستگاه خارج کنید.
- ۲ سالن هچر را جارو کنید.
- ۳ مواد شست وشو دهنده را آماده کنید.
- ۴ محلول ضدغونی کننده را طبق توصیه کارخانه سازنده آماده کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
	هچر	مواد شوینده لوازم شوینده	۱- شست وشوی کامل دستگاه با دقت زیاد ۲- شست وشوی نسبتاً خوب دستگاه با دقت نسبتاً زیاد ۳- ضدغونی ناقص و با دقت کم	عدم مشاهده آلودگی در دستگاه‌ها	۳
۱				مشاهده آلودگی جزئی در دستگاه‌ها	۲
				مشاهده آلودگی زیاد در دستگاه‌ها	۱

آماده کردن وسایل مورد نیاز جهت ضدغونی دستگاه هچر

- ۱ لباس کار بپوشید.
- ۲ تمام سینی‌ها، سبدهای و راک‌ها (گاری چرخدار) را به بخش ضدغونی ببرید.
- ۳ ابزار و وسایل مورد نیاز لباس کار برس دستگاه شست وشو مواد ضدغونی کننده مراحل انجام کار
- ۴ مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده ماده ضدغونی کننده را با آب مخلوط کنید.
- ۵ محلول ضدغونی را داخل دستگاه محلول پاش

فعالیت کارگاهی

ضد عفونی دستگاه هچر

ابزار و وسایل مورد نیاز ■ لباس کار ■ برس ■ پمپ با فشار مناسب ■ مواد ضد عفونی کننده



اثرات گذاشتن آب فرمالین در کف دستگاه هچر
ضد عفونی محیط هچر
زرد شدن جوجهها

مراحل انجام کار

- ۱ استفاده از تجهیزات و لباس مناسب را فراموش نکنید.
 - ۲ ماشین‌های تمیز را ضد عفونی کنید.
 - ۳ سینی‌ها و راک‌ها پس از شستشو در محلول ضد عفونی غوطه‌ور شده و سپس به دستگاه هچر منتقل شوند.
 - ۴ دستگاه هچر را همراه با راک‌ها و سینی‌های شسته شده با گاز فرمالدئید غلظت X ۳ ضد عفونی کنید.
 - ۵ سالن هچر را نیز پس از پاکسازی تمام مواد زائد و شستشوی کف و دیوارها با گاز فرمالدئید X ۳ ضد عفونی کنید.
- فراموش نکنید:** سالن شستشو در یک جوجه‌کشی آلوده‌ترین مکان به شمار می‌رود.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	ضد عفونی دستگاه هچر	مواد ضد عفونی کننده لوازم ضد عفونی	۱- ضد عفونی کامل دستگاه با دقت زیاد ۲- ضد عفونی نسبتاً کامل دستگاه با دقت نسبتاً زیاد ۳- ضد عفونی ناقص و با دقت کم	بار میکروبی کم در دستگاه‌های جوجه‌کشی	۳
۲				بار میکروبی نسبتاً کم در دستگاه‌های جوجه‌کشی	۲
۳				بار میکروبی نسبتاً زیاد در دستگاه‌های جوجه‌کشی	

راه اندازی هچرهای: اغلب کارخانه‌های جوجه‌کشی، دوبار در هفته هج دارند، یعنی هر ماشین هچر دوبار در هفته خالی و پر می‌شود. قبل از استفاده از هچر، دستگاه باید تنظیم شود.



کنترل دستگاه‌ها هر ساعت یک بار

تهویه و رطوبت: هوای تازه مورد نیاز برای هر ۱۰۰۰ عدد تخمرغ ۲۸/۷ مترمکعب در ساعت است. از لحظه انتقال تا زمان نوک زدن، جریان هوا و رطوبت در داخل هچر باید مشابه ستر باشد. رطوبت عامل بسیار مهمی در هچر است؛ زیرا با تأمین رطوبت کافی، غشاها پوسته نرم باقی مانده و موجب خروج بهتر و راحت‌تر جوجه از تخم می‌شود. وقتی که جوجه‌ها شروع به نوک زدن می‌کنند، رطوبت داخل هچر بالا می‌رود. در این لحظه با تنظیم دمپرهای باید این حالت کنترل شود. رطوبت اضافی مورد نیاز از طریق نازل‌های اسپری کننده آب تأمین می‌شود. چند ساعت قبل از تخلیه جوجه‌ها، جهت افزایش توزیع هوا و خشک شدن جوجه‌ها دمپرهای باید باز باشند.

درجه حرارت: به منظور جلوگیری از احتمال افزایش بیش از حد درجه حرارت، معمولاً درجه حرارت هچر کمی‌پایین‌تر از درجه حرارت ستر (۱/۳ تا ۵ درجه) است.

فعالیت کارگاهی

تنظیم دستگاه هچر

سه روز مانده به خروج جوجه‌ها، تخمرغ‌ها را به ترتیب زیر وارد دستگاه هچر کنید.

مراحل انجام کار

۶ حرارت هچری معمولاً ۵/۰ درجه سانتی‌گراد از

دستگاه جوجه‌کشی هچر باید پایین‌تر باشد.

۷ سرویس‌های لازم باید در تمام طول دوره انجام شود.

۸ درجه حرارت و رطوبت را هر ساعت یکبار از روی نمایشگر دستگاه هچر بررسی و یادداشت کنید.

۹ هر سه ساعت یکبار از داخل دستگاه هچر، درجه حرارت و رطوبت را (با استفاده از دماسنجد و رطوبت‌سنجی که داخل دستگاه خودتان گذاشته‌اید) بررسی کنید.

۱۰ باز کردن بیش از حد در دستگاه هچر در سه روز پایانی موجب نوسانات رطوبت شده و میزان هچ را کاهش می‌دهد.

۱۱ ۳۶ ساعت بعد از خروج اولین جوجه از تخمرغ، بهترین زمان برای انتقال جوجه‌ها از دستگاه هچر است.

۱ دمای اتاق محل استقرار دستگاه هچر را به ۳۰ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد افزایش دهید.

۲ درجه حرارت و رطوبت مناسب دستگاه هچر را تنظیم کنید.

۳ سینی‌های داخلی هچری نباید سرد باشند. درجه حرارت بین ۳۰ تا ۳۵ درجه داشته باشند، در غیراین صورت موجب ورود شوک به تخمرغ می‌شود.

۴ تخمرغ‌ها را بدون وارد کردن ضربه و تکان شدید به سینی‌های هچری منتقل کنید. سینی‌ها را درون دستگاه هچر قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.

۵ رطوبت در هچری نباید پایین‌تر از ۷۰ درصد و بالاتر از ۹۰ درصد باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۳	تنظيم دستگاه هچر	تجهیزات وابسته به هچر (حس‌گرها) و لوازم کنترلی	۱- تنظیم دقیق دستگاه هچر ۲- تنظیم نسبتاً دقیق دستگاه هچر ۳- تنظیم دستگاه هچر با دقت کم	ایجاد دما و رطوبت مناسب در دستگاه	۳
				ایجاد دما و رطوبت نسبتاً مناسب در دستگاه	۲
				ایجاد دما و رطوبت نامناسب در دستگاه	۱

انتقال تخم مرغ‌ها از ستر به هچر

انتقال تخم مرغ‌ها پس از ۱۸ یا ۱۹ روز به هچر به دو دلیل صورت می‌گیرد:
 الف) با خواباندن تخم مرغ‌ها به پهلو در سینی‌های هچر امکان حرکت آزادانه به جوجه داده می‌شود و به این طریق جوجه می‌تواند بهتر هج شود.
 ب) با توجه به اینکه در هنگام هج مقادیر قابل توجهی پوش پر تولید می‌شود با رعایت مسائل بهداشتی می‌توان از آلودگی در جوجه کشی جلوگیری کرد.
 زمان انتقال تخم مرغ‌ها علاوه بر تعداد روزها، زمانی است که جنین حدود ۱ درصد از تخم مرغ‌ها به تدریج شروع به نوک‌زدن به پوسته کنند.

أنواع روشهای انتقال




روش انتقال تخم مرغ‌ها به صورت دستی

در این روش با استفاده از باروی مخصوص تخم مرغ‌ها از شانه‌های از شانه‌های ستر به سبد‌ها منتقل می‌شوند.

روش انتقال تخم مرغ‌ها به صورت نیمه خودکار

در این روش با استفاده از دستگاه از دستگاه شانه‌های

از شانه‌های ستر به سبد‌ها منتقل می‌شوند.



روش برداشتن تخم مرغ‌ها توسط دستگاه به صورت خودکار



روش انتقال تخم مرغ‌ها به صورت تمام خودکار
در این روش با استفاده از دستگاه خودکار مخصوص تخم مرغ‌ها
از شانه‌های ستر به سبد‌ها منتقل می‌شوند.

نکات ایمنی در رابطه با انتقال تخم مرغ‌ها



تخم مرغ‌های کثیف و انفعاری به داخل دستگاه هچر
منتقل نشوند

۱ انتقال باید به سرعت و با ملایمت صورت گیرد تا از سرد شدن تخم مرغ‌ها و در نتیجه افزایش مدت زمان جوجه‌کشی جلوگیری شود.

۲ در هنگام انتقال می‌توان تخم مرغ‌های بدون نطفه و یا نطفه مرده و گندیده را به وسیله عمل نوریینی جدا و شمارش کرد.

۳ به دلیل استفاده جنین از کلسیم پوسته در طول مدت جوجه‌کشی، در این مرحله پوسته تخم مرغ‌ها شکننده‌تر است. بنابراین در هنگام انتقال جهت جلوگیری از شکستگی نهایت دقت به عمل آید.

۴ سبد‌های هچر و دستگاه هچری را قبل از خوبی شست و شو و ضد عفونی کنید.

۵ هچر باید کاملاً خشک بوده و قبل از انتقال دمای خوبی داشته باشد (خیس بودن موجب سرد شدن تخم مرغ‌ها و کاهش جوجه‌درآوری می‌گردد).

۶ تخم مرغ‌های گندیده و فاسد شده را در ظروف محتوای مواد ضد عفونی کننده از بین ببرید.

۷ برای انتقال تخم مرغ‌ها از شانه‌ها به سبد‌های هچری از افراد با تجربه و آموزش دیده استفاده کنید.

۸ دست‌های خود را قبل و بعد از عمل انتقال ضد عفونی کنید.

عملیات مهم بعد از انتقال سبد‌ها به هچر

گذاشتن آب + فرمالین در کف دستگاه

کنترل وضعیت هچ

کنترل وضعیت دستگاه‌های هچر

انجام سرویس‌های لازم

عملیات مهم بعد از انتقال سبد‌ها به هچر

انتقال گاری و شانه‌ها به اتاق شست و شو

دفع بهداشتی ضایعات انتقال

شست و شو و ضد عفونی وسایل انتقال

شست و شو و ضد عفونی محوطه انتقال



زمان خارج کردن جوجه‌ها از دستگاه هچر وقتی است که پوش پر آنها باد کرده و ۹۵ درصد آنها خشک شده باشند، اگر بیشتر در هچر بمانند دهیدراته می‌شوند. وقتی هم خیس هستند هنوز آماده انتقال نیستند.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۴	انتقال تخم مرغ‌ها از دستگاه ستر به دستگاه هچر	سیدهای هچری و وسایل جانبی هچری	۱- انتقال مناسب تخم مرغ‌ها به سیدهای هچری ۲- انتقال نسبتاً مناسب تخم مرغ‌ها به سیدهای هچری ۳- انتقال تخم مرغ‌ها به سیدهای هچری با دقت کم	جابه‌جایی تخم مرغ‌ها با آرامش و دقت کامل	۳
				جابه‌جایی تخم مرغ‌ها با آرامش و دقت نسبی	۲
				جابه‌جایی تخم مرغ‌ها با آرامش و دقت کم	۱

فعالیت کارگاهی

انتقال جوجه‌ها به اتاق درجه‌بندی

بعد از مطالعه نکات زیر عملیات انتقال جوجه‌ها از دستگاه هچر به اتاق درجه‌بندی را انجام دهید. جوجه‌ها را باید زمانی از هچر تخلیه کرد که اکثر آنها از تخم مرغ در آمده باشند. در این حالت معمولاً درصد کمی از جوجه‌ها (حدود ۵ درصد) هنوز دارای کمی رطوبت در ناحیه پشت گردن خود هستند. اشتباهی که در کارخانه جوجه‌کشی خیلی معمول می‌باشد این است که جوجه‌ها بیش از اندازه در هچر مانده و بدین ترتیب باعث دهیدراته شدن (از دست دادن آب بدن) جوجه‌ها می‌شوند. عواملی که موجب دهیدراته شدن جوجه‌ها می‌گردد عبارت‌اند از: محاسبه غلط در مورد زمان چیدن تخم مرغ‌های غیر همسن و یا از دست دادن آب بیش از حد از تخم مرغ در طول زمان جوجه‌کشی. در صورتی که حالت نارس بودن جوجه‌ها مشاهده گردد (آماده نبودن جهت تخلیه در زمان تعیین شده) ممکن است علت آن سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان جوجه‌کشی و در نتیجه عقب افتادن رشد جنین بوده باشد. در موقع تخلیه باید جوجه‌ها از خرد



پوسته‌ها جدا شده و سپس جوچه‌های درجه یک و واژده از هم تفکیک و پس از شمارش داخل کارتنهای مخصوص ریخته شود.


■ جهت بهبود کیفیت کار و کاهش تعداد کارگر، عملیات بعد از تخلیه و جابه‌جایی جوچه‌ها می‌تواند به طریق خودکار انجام شود.

■ در سیستم دستی باید از رفتار خشن با جوچه‌ها خودداری شود و در صورت استفاده از وسایل خودکار باید از درست و منظم کار کردن این تجهیزات مطمئن شد.

تحقیق
کنید



۱. چه عواملی منجر به هج زودتر از موعد می‌شوند؟
۲. چه عواملی منجر به هج دیرتر از موعد می‌شوند؟



نمودار رویه را تعداد صحیح جوچه‌های هج شده در طول ۲۳ ساعت قبل از بیرون آوردن سینی‌ها را نشان می‌دهد.
تعداد جوچه‌هایی که در هر سینی هج می‌شوند باید در تمام نقاط دستگاه یکسان باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۵	انتقال جوچه‌ها از سبدهای هجری به اتاق درجه‌بندی	سبدهای حمل و نقل تسمه و لوازم جانبی در سیستم مکانیزه	۱- جداسازی دقیق جوچه‌ها از ضایعات دستگاه و حمل مناسب	جابه‌جایی جوچه‌ها با آرامش کامل	۳
			۲- جداسازی از ضایعات دستگاه جوچه‌ها از ضایعات دستگاه و حمل نسبتاً مناسب	جابه‌جایی جوچه‌ها با آرامش نسبی	۲
			۳- جداسازی جوچه‌ها از ضایعات دستگاه با دقت کم و حمل جوچه‌ها با بی‌دقیق	جابه‌جایی جوچه‌ها با بی‌دقیق	۱



کنترل وضعیت هج

شرایط سالن تخلیه جوجه

دما ۲۲ الی ۲۴ درجه سانتي گراد

رطوبت نسبی ۶۰ درصد

تهویه تحت فشار

در یک هج موفق جوجه‌ها در عرض ۲۴ ساعت از تخم مرغ خارج می‌شوند.

فعالیت کارگاهی

فرم‌های لازم جهت ثبت اطلاعات در دستگاه هچر را تهیه کنید.

نمونه فرم ثبت جوجه درآوری

ملاحظات	تاریخ هج:			تاریخ انتقال :			تاریخ گذاشتن تخم مرغ به ستر:			شماره دستگاه هچر
	تعداد جوجه در کارتنهای	وزن ججه‌ها	تعداد تخم مرغ‌های هج نشده	تعداد جوجه‌های واژده	تعداد جوجه‌های هج شده درجه یک	تعداد تخم مرغ‌های انتقال یافته به هچر	تعداد تخم مرغ‌های گذاشته شده به ستر			

و جایه جایی تخم مرغ ها و چگونگی مدیریت دستگاه های ستر
و هچر و نیز بستگی دارد. بنابراین برای بررسی مشکلات
جوهه در آوری، باید با نمونه گیری از تخم مرغ های هج نشده
و شکستن آنها (trouble shooting) علت مرگ جنین در
داخل پوسته مشخص شود.

معمولاً برخی از تخم مرغ‌ها در دستگاه هچر به جوچه تبدیل نمی‌شوند. این مشکل به علل مختلفی مانند کمبودهای تغذیه‌ای در مرغ و خروس‌ها و همچنین مدیریت گله‌های مادر و گاهی نیز به دلیل وراثت است. البته به مسائلی همچون چگونگی ذخیره تخم مرغ‌ها تا زمان گذاشتن در دستگاه ستر

بررسی علل عدم هج تخم مرغ‌ها

ابزار و وسایل مورد نیاز ■ لباس کار ■ دستکش ■ ماسک ■ تخم مرغ هج نشده ■ ظروف مناسب

مراحل انجام کار

- ۱ لباس کار، دستکش و ماسک را بپوشید.
- ۲ تخم مرغ‌های هج نشده جمع آوری و شمارش کرده و به طور جداگانه از سینی بیرون آورید.
- ۳ تمام تخم مرغ‌ها را از ناحیه کيسه هوایی باز کنید.
- ۴ مرحله رشد و توسعه جنینی را شناسایی و تخم مرغ‌ها را در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی کنید برای این منظور از تصاویر صفحه بعد استفاده کنید.
در زمان برداشتن کيسه هوایی، محتويات تخم مرغ خارج نشود.


نتایج بررسی عمل شکستن (ترابل شوتینگ) تخم مرغ




بی نطفه بودن




تلفات اولیه جنینی (۴۸ ساعت اول)



چشم سیاه (۱۱-۶ روزگی)



تلفات حلقه خونی (۳-۵ روزگی)



تلفات پر (۱۷-۱۲ روزگی)



تلفات چرخیده (۱۸-۱۹ روزگی)

تحقیق
کنید

دلایل اتفاق افتادن هر یک از موارد بالا را در جدول زیر بنویسید.



دلایل	مشکل
	بی‌نطفه بودن
	تلفات اولیه جنینی (۴۸ ساعت اول)
	تلفات حلقة خونی (۳-۵ روزگی)
	چشم سیاه (۶-۱۱ روزگی)
	تلفات پر (۱۲-۱۷ روزگی)
	تلفات چرخیده (۱۸-۱۹ روزگی)

فعالیت کارگاهی

اطلاعات مربوط به هج را در فرم‌های مخصوص ثبت کنید. معیار موفقیت در جوجه‌کشی بستگی به تعداد جوجه‌های درجه یک تولید شده توسط آن جوجه‌کشی دارد. این تعداد براساس درصدی از کل تخم مرغ‌های خوابانیده شده بیان می‌شود که معمولاً به جوجه‌درآوری موسوم است. تمام موارد موجود در فرم‌های بالا به طور کامل و با دقت با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت ثبت اطلاعات هچر تکمیل گردد (برای اطلاعات بیشتر به توضیحات قسمت ستر مراجعه شود).



ثبت اطلاعات هج

فعالیت کارگاهی

تجزیه و تحلیل ضایعات هج

.....	تاریخ خواباندن تخم مرغ	فارم
.....	تاریخ نوربینی	سن
.....	تاریخ شکستن تخم مرغ	اندازه سینی هج
.....	شماره ستر		
.....	شماره هجر		

درصد تخم مرغ های خوابانده شده	جمع کل	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	شماره سینی
۱۱/۶	۵۲							۱۵	۱۸	۱۹		تعداد کل تخم مرغ های بیرون کشیده شده از سینی
۳/۱	۱۴							۴	۴	۶		غیربارور
۳/۳	۱۵						۵	۵	۵			مرگ و میر مرحله ابتدایی (۵-۷ روزگی)
۰/۹	۴						۱	۱	۲			مرگ و میر مرحله میانی (۸-۱۴ روزگی)
۳/۱	۱۴						۴	۵	۵			مرگ و میر مرحله پایانی (۱۵-۲۱ روزگی)
۱/۱	۵						۱	۳	۱			نوك زده به پوسته خارجي
۰/۷	۳						۲	۰	۱			جوچه های حذفی و مرده
۱/۱	۵						۱	۳	۱			آلوده
۰/۲	۱						۱	۰	۰			پوسته ضعیف
۰/۲	۱						۱	۰	۰			پوسته ترک خورده
۰/۲	۱						-	-	۱			نايه جايی ها - سر در قسمت انتهای باریک تخم مرغ
-	-						-	-	-			- سر به سمت چپ
۰/۷	۳						۱	۲	-			- پها روی سر
-	-						-	-	-			- نوك روی بال راست
-	-						-	-	-			- بدشکلی ها - مغز باز / چشم معیوب
-	-						-	-	-			- اعضای اضافی بدن
-	-						-	-	-			- امعا و احشای بیرون زده
ملاحظات:												

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۶	ثبت اطلاعات	فرم‌های مربوطه	۱- ثبت دقیق آمار ۲- ثبت نسبتاً دقیق آمار ۳- ثبت آمار با دقت کم	تعداد صحیح تخم مرغ‌ها و جوچه‌های یک روزه	۳
				تعداد نسبتاً صحیح تخم مرغ‌ها و جوچه‌های یک روزه	۲
				تعداد نادرست تخم مرغ‌ها و جوچه‌های یک روزه	۱

ارزشیابی شایستگی کار با دستگاه هچر

شرح کار:

- ۱- شست و شوی دستگاه هچر
- ۲- ضدغونی دستگاه هچر
- ۳- تنظیم دستگاه هچر
- ۴- انتقال تخم مرغ ها از دستگاه ستر به دستگاه هچر
- ۵- انتقال جوجه ها از دستگاه هچر به اتاق درجه بندی
- ۶- ثبت اطلاعات

استاندارد عملکرد:

کنترل دقیق دستگاه هچر

شاخص ها:

- ۱- شستن دستگاه هچری و لوازم جانبی و سالن های بخش هچری
- ۲- ضدغونی کردن دستگاه هچری و سالن های مربوطه
- ۳- تنظیم دما، رطوبت و تهویه دستگاه هچر
- ۴- انتقال تخم مرغ ها از شانه به سبد های هچری
- ۵- مشاهده سبد های حاوی جوجه در اتاق درجه بندی
- ۶- تکمیل نمون برگ های مربوطه

شرایط انجام کار:

دستگاه هچر - نمون برگ های مربوطه - مواد ضدغونی کننده - سینی های هچری - دستگاه محلول پاش

ابزار و تجهیزات:

دستگاه هچر - سبد های حمل جوجه - لوازم جانبی - حس گرها - فرم های مربوط به اطلاعات دستگاه هچر - مواد شوینده - مواد ضدغونی - لوازم شست و شو و ضدغونی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرحو
۱	شست و شوی دستگاه هچر	۲	
۲	ضدغونی دستگاه هچر	۲	
۳	تنظیم دستگاه هچر	۱	
۴	انتقال تخم مرغ ها از دستگاه ستر به دستگاه هچر	۲	
۵	انتقال جوجه ها از سبد های هچری به اتاق درجه بندی	۱	
۶	ثبت اطلاعات	۱	*
شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجيهات زیست محیطی و نگرش: تصمیم گیری، مستوی لیت بدیری، محاسبه و ریاضی، حفظ سلامتی فرد حین انجام کار، حفظ سلامتی جوجه ها در زمان انتقال، دفع بهداشتی پسماندها و پس اپ حاصل از شست و شو و ضدغونی، مدیریت ابزار و تجهیزات، صداقت، امانتداری			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرحو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری: ۵

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

واحد یادگیری ۶

درجه‌بندی جوجه یک روزه

آیاتا به حال پی برده‌اید؟

- ۱ جداسازی جوجه‌ها براساس درجه کیفیت به چه صورتی خواهد بود؟
- ۲ چه روش‌هایی برای انتقال جوجه به کارتون وجود دارد؟
- ۳ برای حمل و نقل جوجه‌ها از چه وسایلی استفاده می‌شود؟
- ۴ براساس چه ویژگی‌هایی جوجه‌های واژده را از سالم تفکیک می‌کنند؟
- ۵ چه شاخص‌هایی را باید در فرم گزارش جوجه‌کشی درنظر گرفت؟
- ۶ چه روش‌هایی برای از بین بردن ضایعات کارخانه جوجه‌کشی به کار می‌رود؟

هدف از این بخش درجه‌بندی، شمارش و انتقال جوجه‌ها به کارتون‌های حمل و سپس تعیین جوجه‌های واژده و معده‌سازی پسماندهای حاصل است. سلامت جوجه‌ها در زمان تفریخ می‌تواند بر روی کیفیت جوجه‌ها، مراحل رشد و ویژگی‌های گوشت و تخمرغ آنها تأثیر بگذارد. جداسازی جوجه‌های ضعیف بعد از هج انجام می‌گردد. جوجه‌های سالم را می‌توان با نگاه کردن به هوشیاری آنها، وجود هرگونه جراحت و یا نقص و بررسی وضعیت ناف تشخیص داد. در حال حاضر ارزیابی کیفیت جوجه‌های تفریخ شده با توجه به مشاهدات فردی کارکنان جوجه‌کشی و یا کشن جوجه‌ها جهت نمونه‌برداری از حضور باکتری‌ها در کیسه زرد، صورت می‌گیرد. به جهت افزایش احتمال تولید جوجه‌های قوی، مدیریت خوب کارخانه جوجه‌کشی حیاتی است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که جوجه‌ها را براساس استاندارد مربوطه درجه‌بندی کنند.

درجه‌بندی جوجه‌ها

برای تعیین کیفیت جوجه‌ها باید استانداردی وجود داشته باشد. جوجه‌هایی که کیفیت پایین‌تر از استاندارد دارند نباید برای خریدار ارسال شوند. استاندارد برای همه نژادها یکسان بوده و در تمام فصول قبل اجرا است.

عملیات ارزیابی و درجه‌بندی جوجه در جوجه‌کشی توسط افراد مجبوب و با تجربه انجام می‌گیرد.

توجه



- ۶ ناف کاملاً بسته و علائمی از زخم و ورم دیده نشود.
- ۷ وزن جوجه‌ها نرمال باشد.
- ۸ دهیدراته نباشد (کاهش شدید آب بدن).
- ۹ بدن جوجه بدون نقص و بد شکلی باشد (در صورت داشتن بدشکلی، نوک طوطی شکل و متقطع، کوری و ... حذف گردد).
- ۱۰ جوجه سرزنه و پاهایش صاف و شفاف باشد و در هنگام لمس، بدن محکم بوده و نباید هیچ به خوبی بتواند باشد.
- ۱۱ کلواک سالم و طبیعی باشد.

علایم برای ارزیابی کیفیت جوجه‌ها

- ۱ رنگ کرک مطابق با رنگ نژاد باشد.
- ۲ چشم‌های پرنده شفاف و براق باشد.
- ۳ کرک‌ها خشک و نرم باشد.
- ۴ بدن جوجه بدشکلی، نوک طوطی شکل و متقطع، علامتی از تورم نشان دهد.

در صورت مشاهده نکردن هر یک از علائم و مشخصات بالا جوجه را حذف کنید.

توجه



در درجه‌بندی جوجه‌های یک روزه با وسوس عمل کنید تا وقت و نیرو و سرمایه هدر نرود و جوجه‌های مشکل‌دار را از چرخه پرورش خارج کنید.

اخلاق
حرفه‌ای



فعالیت کارگاهی

مراحل انجام کار

درجه‌بندی جوجه‌ها

- ۱ ابزار و سایل مورد نیاز لباس کار مناسب
- ۲ قبل از ورود به داخل سالن‌های جوجه‌کشی دوش ماسک دفترچه یادداشت کارت حمل جوجه بگیرید و لباس مناسب و تمیز بپوشید. چرا؟

هنگام درجه‌بندی جوجه حتماً از ماسک استفاده شود.

توجه



- ۲** جوجه‌های آماده را به اتاق درجه‌بندی انتقال فلچ، دارای چسبندگی مقعد، نوک متقطع و ...) را از سایر جوجه‌ها سالم و طبیعی جدا کنید.
- ۳** دمای اتاق جوجه باید ۲۲-۲۴ درجه سانتی‌گراد و قرار دهید (در زمستان ۱۰۰ قطعه و در تابستان ۸۰ رطوبت ۶۵-۷۰ درصد باشد).
- ۴** جوجه‌های درجه ۲ (جوجه‌های ضعیف، ورم نافی، قطعه جوجه در هر کارتنه).

توجه

در برخی از واحدهای جوجه‌کشی علاوه بر درجه‌بندی جوجه‌ها، تعیین جنسیت، واکسیناسیون، نوک چینی، قطع بال یا قطع تاج و ... نیز صورت می‌گیرد.



- ۵** کارتنهای را در گاری چیده و در اتاق مخصوص تا زمان تحویل جوجه‌ها نگهداری کنید.
- ۶** در پایان دوش گرفته و لباس‌های خود را تعویض کنید.
- ۷** تعداد جوجه‌های درجه ۱ و ۲ را بشمارید.
- ۸** پس از درجه‌بندی، به طور تصادفی چند کارتنه را وزن کرده و سپس میانگین وزن جوجه‌ها را محاسبه کنید.
- ۹** بعد از اتمام درجه‌بندی، تمام تجهیزات و وسائل



انتقال جوجه‌ها برای درجه‌بندی

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ایزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۱	جدا کردن جوجه‌ها براساس نوع درجه	کارتنهای جوجه یک روزه	۱- جداسازی درست جوچه‌ها	قرار گرفتن جوجه‌های هماندازه در هر درجه تعیین شده	۳
			۲- جداسازی نسبتاً درست جوچه‌ها	قرار گرفتن جوجه‌های نسبتاً هماندازه در هر درجه تعیین شده	۲
			۳- جداسازی نادرست جوچه‌ها	قرار گرفتن جوجه‌های غیر هماندازه در هر درجه تعیین شده	۱

برای تسريع در کار، توصیه می‌شود جوچه‌ها را از سبد هچر تخلیه کرده و به دقت شمارش کنید.

توجه



فعالیت کارگاهی

شمارش جوچه‌ها

مراحل انجام کار

- ۱ ابتدا لباس کار مناسب و تمیز بپوشید و حتماً از ماسک و دستکش استفاده کنید.
- ۲ تمام جوچه‌ها به غیر از آنهایی که به طور واضح دور ریختنی هستند را تخلیه کنید.
- ۳ تعداد تخم مرغ‌های هچ نشده، جوچه‌های مرده و دور ریختنی سبد را بشمارید.
- ۴ با توجه به اینکه تعداد تخم مرغ در هر سبد مشخص است. تعداد تخم مرغ‌های کل را از تعداد (تخم مرغ‌های هچ نشده، جوچه‌های مرده و دور ریختنی) کم کنید تا تعداد جوچه‌های هچ شده مشخص شود.
- ۵ تعداد جوچه‌های هچ شده سبد را در کارت هچر ثبت کنید.
- ۶ تعداد کل جوچه‌های هچ شده را می‌توان با جمع تعداد جوچه‌های ثبت شده روی کارت هر سبد محاسبه کرد.

بیشتر
بدانیم



با توجه به اینکه انجام مراحل بالا در هنگام هچ زمان زیادی می‌برد. اکثر جوچه‌کشی‌ها برای محاسبه

تعداد کل جوچه هچ شده در هر هچر از روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

الف) تعداد کارتنهای پرشده از جوچه را شمارش کنید.

ب) با توجه به این مطلب که در تابستان تعداد جوچه گذاشته شده داخل هر کارتنهای ۸۰ و در زمستان

۱۰۰ قطعه است. پس از پایان تخلیه جوچه به کارتنهای، تعداد کارتنهای شمرده شده را در تعداد

جوچه‌های ریخته شده در آن ضرب کنید تا تعداد جوچه هچ شده درجه یک به دست آید.

ج) سپس تعداد جوچه‌های درجه ۲ ریخته شده در کارتنهای دیگر را شمارش کنید.

د) در پایان تعداد جوچه‌های درجه ۱ و ۲ را با یکدیگر جمع کنید تا کل جوچه‌های هچ شده در هر

دستگاه مشخص شود.

برای درجه بندی، جوچه های سالم و قوی را به عنوان جوچه درجه یک و جوچه های ضعیف را به عنوان درجه ۲ مشخص می کنند.

توجه



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۲	شمارش جوچه ها	- ماسک - سبد یا ریل خودکار	۱- شمارش دقیق جوچه ها	رضایتمندی مشتری	۳
			۲- شمارش نسبتاً دقیق جوچه ها	رضایتمندی نسبی مشتری	۲
			۳- بی دقت شمردن جوچه ها	عدم رضایت مشتری	۱

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۳	انتقال جوچه ها به کارتنه	ماسک، کارتنه های جوچه یک روزه	۱- تراکم درست جوچه ها براساس شرایط وسیله نقلیه و آب و هوا	کارتنه های حاوی تعداد مناسب جوچه	۳
			۲- تراکم نسبتاً درست جوچه ها براساس شرایط وسیله نقلیه و آب و هوا	کارتنه های حاوی تعداد نسبتاً مناسب جوچه	۲
			۳- تراکم نادرست جوچه ها براساس شرایط وسیله نقلیه و آب و هوا	کارتنه های حاوی تعداد نامناسب جوچه	۱



معمولًاً کارتون مورد استفاده در جوچه کشی ها به چهار کارتون ها قرار دهید. کارتون های آماده شده را در گاری بچینید و از قرار دادن کارتون ها روی زمین خودداری کنید. وقتی جوچه های تازه هج شده در کارتون ها قرار در فصول گرم سال در صورتی که درجه حرارت بالای ۲۱ درجه سانتی گراد باشد در کارتون ها ۸۰ کامل کرک ندارد و به خوبی قادر به ایستادن نیستند. قطعه جوچه و در صورتی که حرارت از ۲۱ درجه به همین دلیل باید اجازه داد تا بدن جوچه ها سفت سانتی گراد پایین تر باشد ۱۰۰ قطعه جوچه را در شود.



۲. انتقال جوچه ها به کارتون ها با استفاده از نوار نقاله



۱. انتقال جوچه ها به کارتون ها به صورت دستی

حمل و نقل جوچه ها

از وسایل مختلفی مانند هواپیما، قطار، اتوبوس، ماشین های سواری می توان برای حمل جوچه ها استفاده کرد ولی در اغلب مناطق حمل جوچه ها با کامیون صورت می گیرد. دو نوع کامیون برای حمل جوچه ها وجود دارد.

- ۱ کامیون سرپوشیده
- ۲ کامیون های محفظه دار

پس از خروج همه جوچه ها از هجر دوازده ساعت بعد باید جوچه ها را به خریدار تحویل داد تا جوچه ها زمان کافی برای سفت شدن داشته باشند.

نکته مهم



در صورت حمل با هواپیما، زمان تفریخ جوچه ها و حمل و نقل آنها تا حد امکان نزدیک به هم باشد. جوچه ها در قسمتی از هواپیما قرار بگیرند که تهویه مناسب داشته باشد.



کامیون‌های محفظه‌دار

ظرفیت حمل ۵۰۰۰ قطعه یا بیشتر را دارند. در این کامیون بدن و بخش حمل جوچه جدا از هم است.



در زمان حمل جوچه از کارخانه به سالن پرورش، محیط اطراف جوچه باید کاملاً تحت کنترل باشد.

فعالیت کارگاهی

ماشین حدود ۲۴ درجه سانتی‌گراد باشد. اگر از جعبه‌های پلاستیکی برای حمل استفاده می‌شود، درجه حرارت داخل کامیون حمل باید حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد.

۱ استفاده از جعبه‌های پلاستیکی برای حمل جوچه در مقایسه با جعبه‌های مقوایی، احتمال گرم‌گردگی یا سرماخوردگی جوچه‌ها را بیشتر می‌کند.

۲ جعبه‌های جوچه باید به درستی در داخل کامیون چیده شود، به طوری که فضای کافی برای برقراری هوای موردنیاز بین جعبه‌ها موجود باشد. جعبه‌های چیده شده در کامیون باید به وسیله یک میله مهار شوند.

۳ رانندگان باید با لباس کار، چکمه مخصوص و ... کار کنند تا آلودگی را انتقال ندهند.

۴ کامیون‌های حمل جوچه باید بعد از هر سرویس تحویل جوچه، به وسیله آب و مواد ضد عفونی کننده، شستشو و ضد عفونی شوند.

راعیت شرایط محیطی در زمان حمل و نقل جوچه‌ها

مراحل انجام کار

۱ حداقل تهویه مورد نیاز برای تأمین اکسیژن به ازای هر ۱۰۰۰ جوچه در هوای زمستان ۳۴ مترمکعب در ساعت و در تابستان دو برابر این میزان است. تمام کامیون‌های حمل باید به سیستم گرم‌کننده کمکی یا تأمین‌کننده جریان هوای تازه کافی به منظور گرم کردن و یا خنک کردن مجهز باشند. اگر در تابستان درجه حرارت از ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالاتر رود باید از سیستم خنک‌کننده استفاده شود.

۲ کامیون حمل جوچه باید مجهز به وسائل نشان‌دهنده درجه حرارت در قسمت بار باشد تا راننده بتواند میزان هوای ورودی را برای خنک کردن جوچه‌ها تنظیم نماید.

۳ درجه حرارت در داخل جعبه‌های جوچه باید حدود ۳۲ درجه سانتی‌گراد و درجه حرارت داخل



نحوه چیدن کارتن‌ها در ماشین‌های حمل



مهار شدن سبد جوجه‌ها در ماشین‌های حمل

مشخصات جوجه‌های درجه ۲ (وازده)

جوجه‌های درجه ۲ یا وازده ممکن است برخی از علائم زیر را داشته باشند که منجر به حذف شدن آنها می‌شود.

- ۱ عدم التیام ناف: این جوجه‌ها غیرفعال بوده و اغلب روی سینه می‌نشینند، دارای شکم متورم و مفصل خرگوشی قرمز رنگ نیز هستند.
- ۲ عفونت کیسهٔ زرد: کیسهٔ زرد بدبو و بذرنگ بوده و در سطح آن رگ‌های خونی دیده می‌شود.
- ۳ از دست دادن آب بدن (دهیدراتاسیون): تجمع جوجه‌ها در مناطق گرم سالن، عدم مصرف آب و دان، عضلات تیره و خشکی پوست و عضلات.
- ۴ چسبندگی مقعد: خشک شدن و چسبیدن مدفوع در ناحیه مقعد که منجر به انسداد آن می‌شود.
- ۵ آب آورده‌گی پرده قلب: عمدتاً به علت کاهش جریان هوا در هچری و در نتیجهٔ کمبود اکسیژن است که با تهویه ضعیف مرغداری تشدید می‌شود.
- ۶ جوجه‌های کوچک و کم وزن بودن جوجه
- ۷ وجود نواقصی نظیر آسیب‌دیدگی متعدد و رنگ پریدگی پاها
- ۸ پنجه‌های خمیده و یا کج در گله به علت نوسانات حرارتی دستگاه خصوصاً درجه حرارت بالا ممکن است مشاهده شود.
- ۹ جوجه‌ای که زودتر تفریخ شده و بند ناف در آنها بهبود نیافته است.
- ۱۰ جوجه‌های چسبناکی که محتويات تخمرغ‌ها به بدن آنها چسبیده است.
- ۱۱ جوجه‌های خشکی که پوسته تخمرغ‌ها به بدن آنها چسبیده است.

توجه



در صورت مشاهده هریک از نشانه‌های فوق جوجه را حذف کنید؛ چرا که وجود این جوجه‌ها در مرغداری موجب کاهش راندمان در طول دوره پرورش خواهد شد.

تحقيق
کنید



- چند درصد از کل جوجه‌های هچ شده در گروه جوجه‌های وازده طبقه‌بندی می‌شوند؟
- با چه کارهایی می‌توان میزان وازده‌گی جوجه‌ها را کاهش داد؟

فعالیت کارگاهی

ورود کرک‌ها به دهان).
۴ قبل و بعد از درجه‌بندی دست‌های خود را ضدغونی کنید.

۵ فقط جوجه‌های عاری از عوامل بیماری‌زا را هج کنید.

۶ از کارتنهای جدید برای حمل جوجه و یا سبدهای پلاستیکی ضدغونی شده استفاده کنید.

۷ جوجه‌کشی فقط یک در ورودی و خروجی برای افراد داشته باشد. یک حوضچه بزرگ همراه با یک برس در مدخل درب ورودی جوجه‌کشی برای تمیز کردن چکمه پرسنل وجود داشته باشد. ماده ضدغونی باید به طور مرتبت تعویض گردد.

۸ مواد زائد جوجه‌کشی باید به طور صحیح حذف و سوزانده شوند تا از انتقال عوامل بیماری‌زا جلوگیری شود.

جداسازی جوجه‌های واژده

مراحل انجام کار

۱ لباس کار، ماسک و دستکش مناسب بپوشید.

۲ جوجه‌ها را با دقیق در دست گرفته و بررسی کنید.

۳ در صورت مشاهده هر یک از نشانه‌های زیر جوجه را حذف کنید.

۴ جوجه‌های واژده را در کارتنهای جداگانه بریزید و به روش اصولی معدهای کنید.

۵ دست‌های خود را ضدغونی کنید

۶ دوش بگیرید و لباس‌های خود را تعویض کنید.

۷ همه پرسنل قبل از ورود به جوجه‌کشی دوش گرفته و از لباس، کفش و کلاه تمیز استفاده کنند.

۸ در هنگام درجه‌بندی جوجه‌ها حتماً از ماسک، دستکش و کلاه استفاده کنید (برای جلوگیری از شود).

علت واژدگی جوجه‌های زیر چیست؟ این فرد کدامیک از اصول ایمنی را رعایت نکرده است؟

گفت و گو
کنید





از بین بردن ضایعات کارخانه جوجه‌کشی

در یک کارخانه جوجه‌کشی با متوسط جوجه‌درآوری ۸۵ درصد، حدود ۱۵ درصد از تخممرغ‌ها فاقد نطفه و یا دارای جنین تلف شده هستند. این دسته از تخممرغ‌ها به همراه پوسته تخممرغ‌های باقیمانده پس از خروج جوجه‌ها و همچنین تخممرغ‌های نوک‌زده و جوجه‌های واژده به عنوان ضایعات کارخانه جوجه‌کشی محسوب می‌شوند. در برخی از کشورها استفاده از این مواد در کارخانه‌های تهیه پودر مازاد واحدهای جوجه‌کشی به دلیل احتمال انتقال عوامل بیماری‌زا منوع شده است. از آنجایی که مضرات استفاده از پودر ضایعات جوجه‌کشی بیش از مزایای آن است؛ بنابراین در اغلب واحدهای جوجه‌کشی ضایعات مذکور را معذوم می‌کنند.

۱ تخممرغ‌های هچ نشده باقیمانده در سینی باید به منظور از بین بردن هرگونه جنین خارج‌نشده خرد و پرس شوند. تخممرغ‌های نوک‌زده و جوجه‌های واژده نیز به وسیله گاز دی‌اکسیدکربن و یا هر وسیله مجاز دیگری باید در جوجه‌کشی معذوم شوند.

۲ تمام مواد پرس شده و ضایعات باید به وسیله اوگر به یک تریلی و یا مخزن مخصوص منتقل شوند و یا توسط پمپ مکش وارد مخازن سرپوشیده مخصوص گردند. این مواد باید با توجه به موقعیت و قوانین محلی معذوم شوند که شامل این موارد است.

- الف) سوزانیدن در کوره ۶۰۰ درجه (سوزاندن مواد هچری بهترین راه است).
- ب) تبدیل به فراوردهای فرعی هچری که یکی از منابع مورد استفاده در خوراک طیور است.
- ج) دفن کردن ضایعات توسط بیل مکانیکی در چاله‌هایی به عمق ۲ متر.
- د) دفع از طریق فاضلاب.



برای پایین نگهداشتن هزینه‌ها، مدیر باید بعد از هر هج، هر هفته و در پایان هر ماه و هر سال آماری داشته باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	معدهم نمودن جوچه‌های واژده	آب و هوا	۱- دفع به روش درست در محل مناسب ۲- دفع به روش نسبیتاً درست ۳- دفع به روش نادرست	عدم مشاهده ضایعات در واحد	۳
۲	معدهم نمودن جوچه‌های واژده	آب و هوا	۱- دفع به روش درست در محل مناسب ۲- دفع به روش نسبیتاً درست ۳- دفع به روش نادرست	مشاهده مقدار کمی ضایعات در واحد	۲
۳	معدهم نمودن جوچه‌های واژده	آب و هوا	۱- دفع به روش درست در محل مناسب ۲- دفع به روش نسبیتاً درست ۳- دفع به روش نادرست	مشاهده مقدار زیادی ضایعات در واحد	۱

گزارش مسئول جوچه کشی

بلافاصله بعد از هر هج، مسئول جوچه کشی باید گزارشی تهیه و تنظیم کرده و تحويل مدیر دهد. این گزارش باید شامل کارهای رایج در جوچه کشی، بازده دستگاه‌ها، درصد هج جوچه‌ها، درصد جوچه‌های هج شده فروخته شده به خریدار، قیمت جوچه فروخته شده و ... باشد. تمام موارد به‌طور کامل در فرم آمده است.

فعالیت کارگاهی

برای ثبت اطلاعات و گزارش عملکرد جوچه کشی فرم‌های مطابق نمونه فرم صفحه بعد تهیه کنید.

نمونه فرم گزارش مسئول جو چه کشی

فعالیت کارگاهی



اطلاعات لازم برای تکمیل فرم تهیه شده در این صفحه را جمع آوری کنید.

نحوه ثبت فرم‌ها

- ۱ فرم‌ها را به طور کامل مطالعه کنید.

۲ از زمان ورود تخم مرغ به انبار تا زمان تحویل جوجه کلیه مراحل را ثبت کنید.

۳ با دقیق کاملاً و داشتن اطلاعات کافی، فرم‌ها را با

صحت کامل پر کنید.

- ۴ از نتایج این فرم‌ها برای برنامه‌ریزی‌های بعدی شامل: بررسی مسائل مدیریتی، حمل جوچه، جوچه کشی و بررسی گله مادر استفاده خواهد شد.

فعالیت کارگاهی

اطلاعات به دست آمده را در فرم تهیه شده ثبت کنید.
مسئول جوچه کشی باید تمام فرم‌های قبل را با دقت مطالعه کند، سپس در طول دوره بعدی هج بآ دقت فراوان و به طور کامل ثبت کند. در پایان هرماه گزارشی از هزینه اداره جوچه کشی و عوامل مؤثر در قابلیت جوچه کشی تهیه کند، همچنین باید یک گزارش جمع‌بندی سالیانه داشته باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۱	مستندسازی	فرم‌های مربوطه	۱- ثبت دقیق آمار و اطلاعات ۲- ثبت نسبتاً دقیق آمار ۳- ثبت آمار با دقت پایین	تعداد صحیح جوچه‌های یک‌روزه	۳
				تعداد نسبتاً صحیح جوچه‌های یک‌روزه	۲
				تعداد نادرست جوچه‌های یک‌روزه	۱

ارزشیابی شایستگی درجه‌بندی جوچه‌های یک‌روزه

شرح کار:

- ۱- شمارش جوچه‌ها
- ۲- درجه‌بندی جوچه‌ها
- ۳- انتقال جوچه‌ها به کارتون
- ۴- معدوم‌سازی جوچه‌های واژده
- ۵- مستندسازی

استاندارد عملکرد:

تعیین درجه جوچه‌ها با دقت و سرعت

شاخص‌ها:

- ۱- تعیین تعداد جوچه‌ها
- ۲- تقسیم جوچه‌ها براساس نوع درجه
- ۳- کارتون‌های حاوی تعداد مناسب جوچه
- ۴- معدوم‌سازی جوچه‌های واژده به صورت بهداشتی
- ۵- تکمیل نمون برق‌های مربوطه

شرایط انجام کار:

جوچه‌های درجه ۱ و ۲ و ۳

کارتون‌های حمل جوچه یک روزه

نمون برق‌های مربوطه، چاه تلفات یا کوره لاشه‌سوز، سبدهای نگهداری جوچه

ابزار و تجهیزات:

فرم‌های مربوط به ثبت آمار - سبدهای نگهداری جوچه - کارتون‌های جوچه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	شمارش جوچه‌ها	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱			۱	
۲	جدا کردن جوچه‌ها براساس نوع درجه		۲	
۳	انتقال جوچه‌ها به کارتون		۱	
۴	معدوم نمودن جوچه‌های واژده		۲	
۵	مستندسازی		۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری، حفظ سلامتی فرد حین انجام کار، حفظ سلامتی فرد در زمان درجه‌بندی جوچه‌ها، دفع بهداشتی ضایعات جوچه‌کشی، معدوم کردن صحیح جوچه‌های واژده، امانت داری، صداقت، آسایش پرنده				
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.				

واحد یادگیری: ۶

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

پودمان ۳

پرورش جوجه



توجه به اهمیت پاکسازی و آماده‌سازی واحدهای مرغداری پس از پایان هر دوره ضروری می‌باشد. بعد از پایان پرورش در روش بستر و یا هر چند روز یک بار در سیستم قفس کود باید به روش‌های دستی یا مکانیزه از سالن خارج شود و در زمینی خارج از مرغداری و در فضای سرپوشیده روی هم دبو گردد و یا در گودالی سیمانی ذخیره شود. هفته‌های ابتدایی زندگی جوجه‌ها، زمان بحرانی از زندگی آنها است که نقش بسزایی در عملکرد نهایی گله خواهد داشت. در زمان جوجه‌ریزی، زندگی جوجه‌های جوان کاملاً به تدبیر مدیریتی که در گله به کار می‌گیرید وابسته است. هدف دوره ابتدایی پرورش (۴ هفتگه اول)، ایجاد شرایط محیطی مناسب برای جوجه‌ها است. توجه دقیق پرورش دهنده به تمام جزئیاتی که در رابطه با مدیریت پرورش توصیه شده، در نیل به این هدف الزامی است.

واحد یادگیری ۷

آماده‌سازی سالن پرورش مرغ

آیا تابه حالت پی بوده‌اید؟

- ۱ خارج کردن تجهیزات مورد استفاده در سالن مرغداری به چه روشی صورت می‌گیرد؟
- ۲ انواع مواد ضد عفونی کننده و شویننده جهت آماده‌سازی سالن‌های پرورش مرغ کدام است؟
- ۳ در سیستم پرورش مرغ در بستر و قفس به منظور پاکسازی و ضد عفونی از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۴ راهاندازی تجهیزات مورد استفاده در سالن مرغداری چگونه انجام می‌شود؟

هدف از این بخش تخلیه، شست و شو، ضد عفونی و آماده‌سازی تجهیزات و سالن برای پرورش مرغ است. به طور کلی به آماده نمودن سالن‌ها برای پرورش جوجه، آماده‌سازی می‌گویند. آماده‌سازی شامل یک سری فعالیت‌ها برای فراهم‌آوردن شرایط محیطی لازم جهت پرورش جوجه‌ها است. سالن‌های مرغداری (شامل نوساز و قدیمی) قبل از دوره جوجه‌ریزی حتماً باید دوره آماده‌سازی را طی کنند. یک آماده‌سازی خوب می‌تواند در عملکرد گله در آینده نقش مؤثری داشته باشد، بنابراین مدیران باتجربه در دوره آماده‌سازی نهایت دقیق و تلاش را به کار می‌برند. اگر چه آماده‌سازی مطلوب ممکن است هزینه‌بر و وقت‌گیر باشد ولی عملکرد خوب گله در آینده آن را جبران خواهد کرد. نگاهی به تعداد واحدهای مرغداری کشور (گوشتی و تخمه‌گذار) که از لحاظ بازدهی و تولید براساس ظرفیت در وضعیت مطلوبی نیستند و کیفیت محصولات تولیدی آنها، اهمیت و ضرورت آموزش در این حوزه را به دنبال دارد. تربیت نیروی ماهر در این حوزه و رعایت استانداردهای تولید، با توجه به ظرفیت کار در این حوزه می‌تواند هم مقدار کمی تولید را افزایش داده هم تولید کیفی را به دنبال داشته باشد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که سالن پرورشی به مساحت ۵۰۰ متر مربع را طی ۱۵ روز آماده‌سازی کنند.

برای گلهای دیگر غیر قابل مصرف بوده و باید معدهوم گردد. همچنین تأخیر در خروج دان از دانه‌خوری‌ها و انتقال آن به بیرون از سالن موجب هجوم موش‌ها به داخل سالن خواهد شد.

پس از اینکه مرغ‌ها به طور کامل از داخل سالن‌ها تخلیه شدند، دان از دانه‌خوری‌ها جمع‌آوری و به خارج از سالن منتقل گردد. توجه داشته باشید که دان جمع‌آوری شده به دلیل امکان انتقال آلودگی دان جمع‌آوری شده به دلیل امکان انتقال آلودگی



بهتر است که قبل از خروج کود از سالن‌ها، توسط سمپاش و استفاده از سmom حشره‌کش علیه حشرات در داخل سالن سمپاشی انجام شود و به مدت ۲۴ ساعت درب سالن‌ها بسته بماند تا سم اثر کند. بهتر است که برای تأثیر بهتر سmom حشره‌کش تازمانی که سالن گرم است عمل سمپاشی انجام شود. سمپاشی در روی بستر با دقیق‌تری انجام شود.

دان داخل سیلوها در گونی تمیز جمع‌آوری و با رعایت نکات بهداشتی به محلی دور از سالن‌ها منتقل گردد. این دان با رعایت نکات بهداشتی برای مرغ‌های مسن قابل مصرف است. دقیق‌تر گردد عملیات انتقال دان سیلوها قبل از خروج کود و یا هر نوع وسیله دیگر از سالن‌ها صورت پذیرد. طعمه‌گذاری برای از بین بردن موش‌ها در سالن انجام گیرد. به منظور کنترل حشرات



جمع‌آوری دان



دان در دانه‌خوری تراف



دان در دانه‌خوری سطی

پس از تخلیه سالن از مرغ چه کارهایی لازم است در سالن انجام شود؟

گفت و گو
کنید



باز کردن وسایل

۱ انواع دانه خوری های دستی (Handle Feeder) به دو گروه دانه خوری بشقابی (سطلی) یا Handle pan Feeders و دانه خوری ناودانی (تراف) یا است. وسایل سالن مرغداری دارای انواع و اشکال مختلفی Handle trough feeder تقسیم بندی می شود.

(الف) دانه خوری بشقابی (سطلی)

دانه خوری سطلی شامل کفی، سطل، سه سوراخ تنظیم دان، نخ نگهدارنده، میله اصلی، ۴ مهره اتصال و قلاب است.

بسته به نوع سیستم پرورش جوجه (تمام بستر، نیمبستر- نیم زرد، تمام زرد و تمام قفس) تجهیزات و وسایل سالن مرغداری دارای انواع و اشکال مختلفی است. وسایل و تجهیزاتی که قابلیت بازشدن را دارند عبارت اند از:

انواع دانه خوری دائمی یا ثانویه: به دو صورت دستی و خود کار وجود دارد که با توجه به نوع دانه خوری نحوه باز کردن آن نیز متفاوت است.



فعالیت کارگاهی

- مهره بالایی میله اصلی را باز کنید.
- سطل دانه خوری را درآورید.

باز کردن دانه خوری سطلی


- لباس کار مناسب بپوشید.
- قلاب را از درون نخ نگهدارنده جدا کنید.

(ب) دانه خوری ناودانی (تراف)

این نوع دانه خوری ها به شکل ناودان می باشند و جنس آن گالوانیزه می باشد. دانه خوری ناودانی در اکثر موارد به طول ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی متر ساخته می شود و برای اینکه مرغ ها وارد دانه خوری نشوند در قسمت بالای آن میله گردن نصب می شود و یا اینکه قسمت بالای دانه خوری به صورت شبکه میله ای محافظت ساخته می شود. اجزای تشکیل دهنده آن عبارت اند از: ناودانی (تراف یا کanal دانه خوری)، پایه تراف (جهت تنظیم ارتفاع) و شبکه محافظ.



دان خوری ناودانی



فعالیت کارگاهی

باز کردن دانه خوری ناودانی

لباس کار مناسب پوشید.

پایه تراف یا ناودانی را باز کنید.

شبکه یا میله محافظ را از روی ناودانی خارج کنید.

۲ انواع دان خوری خودکار (automatic feeders):

این دان خوری ها به طور خودکار دان را در سالن مرغداری توزیع می کنند.

(الف) دان خوری زنجیری

این دان خوری مانند دانه خوری ناودانی دستی است و فقط توزیع دان آن توسط نقاله زنجیری به صورت خودکار صورت می گیرد. قطعات تشکیل دهنده آن عبارت اند از: کanal دان خوری (ناودانی)، رابط، گیره و پایه کanal، زاویه (گوشه ها)، پایه زاویه، هاپر (مخزن دان)، زنجیر و صافی (الک). دان خوری زنجیری بر حسب طول و عرض سالن و نوع استفاده از نظر مرغ مادر یا گوشتی تقسیم بندی می شود. البته در این مورد تنها ساختاری که متفاوت است، سرعت حرکت زنجیر در دان خوری گوشتی ۱۷ متر در دقیقه و در دان خوری مادر به ۲۸ تا ۳۰ متر در دقیقه می رسد و همچنین حجم و اندازه ها پر و کanal ها نیز متفاوت است.



دان خوری زنجیری




مخزن دان (هاپر) و الکتروموتور

بخشی از کanal اصلی، زنجیر و پایه

صفی



زاویه دان خوری




فعالیت کارگاهی

- شبکه یا میله محافظ را از روی ناوданی خارج کنید.
- لباس کار بپوشید و جعبه ابزار تهیه کنید.
- نقاله زنجیری را از درون ناودان بیرون آورید.
- برق دستگاه را قطع کنید.
- رابط و پایه ناودانی ها و گوشه ها را باز کنید.
- الکتروموتور را باز کنید.
- باز کردن دان خوری زنجیری

مارپیچی که اصلی‌ترین قسمت دان‌خوری بشقابی را تشکیل می‌دهند. بشقاب‌های دان‌خوری بشقابی از جنس پلاستیک صنعتی و قابل جداسازی از یکدیگر و شستشوی کامل هستند.



دان‌خوری بشقابی خودکار و اجزای آن



الکتروموتور



مخزن (هاپر)



دان‌خوری بشقابی



وینج دان‌خوری بشقابی

ب) دان‌خوری بشقابی (اوگر) خودکار

سیستم دان‌خوری بشقابی خودکار تشکیل شده از لوله گالوانیزه انتقال دان از مخزن به انتهای سالن، مخزن، موتور گیربکس، تابلوی برق اصلی، وینج، قرقره‌ها، سیم بکسل، بشقاب‌های دان‌خوری و نقاله

فعالیت کارگاهی

- ۱ لباس کار بپوشید.
- ۲ جعبه ابزار تهیه کنید.
- ۳ برق دستگاه را قطع کنید.
- ۴ باز کردن دان خوری بشقابی خودکار با نظارت هنرآموز و رعایت نکات اینمی مراحل زیر را انجام دهید.
- ۵ بشقاب‌های دان خوری را از لوله انتقال دان باز کنید.
- ۶ نقاله حلزونی را از درون لوله‌ها بیرون بکشید.
- ۷ محل اتصال لوله‌ها به سیم بکسل، قرقره‌ها و وینچ را باز کنید.
- ۸ الکتروموتور را باز کنید.

در بسیاری از موارد در مورد دان خوری بشقابی نیاز به باز شدن و خارج کردن سیستم دان خوری از سالن بعد از پایان دوره تولید برای شستشوی سالن وجود ندارد.

توجه



انواع آب خوری دائمی یا ثانویه

برای جوجه‌های جوان از این نوع آب خوری‌ها استفاده می‌شود و در پایان دوره پرورش در مرغداری‌های صنعتی استفاده نمی‌شود. این نوع آب خوری از یک مخزن دور و یک بشقاب در زیر آن تشکیل شده است و آب به تدریج از سوراخ‌های پایین مخزن وارد بشقاب می‌شود.

به دو صورت دستی و خودکار وجود دارد که با توجه به نوع آب خوری نحوه باز کردن آن نیز متفاوت است.

۱ انواع آب خوری‌های دستی (Handle drinker):

به دو گروه آب خوری دستی بشقابی (کله قندی) و آب خوری ناودانی (تراف) تقسیم‌بندی می‌شود.



فعالیت کارگاهی

- ۱ مخازن دور آب خوری‌ها را روی هم قرار بدهید.
- ۲ بشقاب آب خوری‌ها را روی هم قرار دهید.
- ۳ آب خوری را باز کنید.
- ۴ باز کردن آب خوری دستی بشقابی با نظارت هنرآموز و رعایت نکات اینمی مراحل زیر را انجام دهید.
- ۵ لباس کار مناسب بپوشید.

۲. آب خوری ناودانی (تواف)



این آب خوری‌ها بیشتر در سیستم پرورش مرغ تخم‌گذار در قفس استفاده می‌شود و می‌تواند به شکل سرتاسری یا قطعات کوچک نصب شود. مقطع آن به صورت U یا V شکل است. جنس آن از آهن سفید یا آلومینیوم و یا پلاستیک بوده و معمولاً به تانکر آب و یا سیستم لوله‌کشی وصل است. در این نوع آب خوری، آب تازه همیشه به طور ملایم جریان داشته و آب اضافی از دریچه‌ای در انتهای آن سرازیر می‌شود.

فعالیت کارگاهی

۱. آب خوری مخروطی آویز

این آب خوری‌ها از جنس پلاستیک بوده و در سالن‌های پرورش روی بستر استفاده می‌شوند. به دو شکل سیفونی یا زنگوله‌ای و جامبو وجود دارند.

۱-۱. آب خوری سیفونی یا زنگوله‌ای

این نوع آب خوری‌ها از وزنه، آویز وزنه، قیف زنگوله‌ای شکل، سوپاپ، فر استیل، پیچ تنظیم‌کننده، مهره قفل کننده، فیلتر آب، کلاهک، قلاب آویز، نخ نگهدارنده، تنظیم‌کننده نخ، شلنگ و رابط آن تشکیل شده است.

باز کردن آب خوری ناودانی


مراحل زیر را انجام دهید.

۱ لباس کار مناسب بپوشید.

۲ قطع کردن آب و لوله متصل به ناودانی را انجام دهید.

۳ اتصالات ناودانی‌ها را باز کنید.

۴ انواع آب خوری خودکار (**automatic drinker**) این آب خوری‌ها به طور خودکار آب را در سالن مرغداری توزیع می‌کنند.



فعالیت کارگاهی

باز کردن آب خوری سیفونی

مراحل زیر را انجام دهید.

۱ لباس کار بپوشید.

۲ قطع کردن آب از طریق بستن قفل اتصال T شکل

۳ قلاب فلزی را از درون نخ نگهدارنده جدا کنید.

۴ شلنگ متصل به کلاهک آب خوری را خارج کنید.

۵ آویز وزنه از درون قلاب را در آورید.

۶ مهره قفل کننده برای جدا کردن سوپاپ، فنر و... را باز کنید.



آب خوری جامبو

۱-۲. آب خوری جامبو

در مقایسه با نوع سیفونی به جای استفاده از وزنه، آویز دارای یک دیسک پلاستیکی سنگین یا کف پر شده است و نحوه باز کردن آن مشابه آب خوری سیفونی است.

۲. آب خوری پستانکی یا نیپل

طیور به صورت فطری و ذاتی اقدام به خوردن و آشامیدن می کنند. به طور مثال جوجه در روز اول سرخود را بلند کرده و آب از آب خوری بدون آموزش دیدن می نوشد. در قرآن مجید آیات زیادی در ارتباط با این میل و غریزه وجود دارد.

سیستم آب خوری نیپل از یک یا چندین لوله تشکیل شده که در امتداد طول سالن با تراز مناسب کشیده شده است. در فواصل مناسب سوراخ های کوچکی در این لوله ها ایجاد شده و سوپاپ کوچکی به این سوراخ ها نصب می شود. این سوپاپ ها حساس به فشار بوده به طوری که در اثر فشار آب موجود در لوله ها، سوپاپ ها بسته هستند؛ اما زمانی که پرنده با منقار خود به آن فشار وارد می کند، سوپاپ باز شده و آب به بیرون از لوله جريان می یابد.



سیستم آب خوری نیپل متشکل از رگلاتور، نیپل، وینج سقفی، لوله های انتقال آب، لوله های نگهدارنده، شیر انتهای خط، شیر میان خط، نشانگر سطح آب، قرقره های آویز، گیره های نگهدارنده و سیستم ضد نشت و سیکل آب است. اگر جریان آب موجود در لوله ها ۸۰-۹۰ میلی لیتر در هر دقیقه باشد در آن صورت به منظور ممانعت از ریزش قطرات آب روی بستر، در زیر نیپل ها فنجانک نصب می شود.

فعالیت کارگاهی

باز کردن آب خوری قطره ای



اجزای آب خوری نیپل

مراحل انجام کار

- ۱ لباس کار بپوشید.
- ۲ آب را قطع کنید.
- ۳ خطوط آب خوری توسط وینچ را پایین آورید.
- ۴ شیر انتهای خط را جهت تخلیه آب باز کنید.
- ۵ نیپل ها را از محل اتصال به لوله انتقال آب باز کنید.

۳. آب خوری فنجانی

این آب خوری مشابه آب خوری نیپل یا قطره ای است با این تفاوت که همه بخش های آن داخل یک فنجان مخروطی قرار گرفته و آب وارد فنجان می شود.



در پایان هر دوره پرورش و پس از تخلیه سالن از مرغ ها قبل از باز کردن تجهیزات، باید آب و برق سالن ها قطع شود. سپس کلیه ادوات و تجهیزات قابل انتقال مانند آب خوری ها، شلنگ آب خوری ها، دان خوری ها (ناودانی، رنجیری، پایه و....)، بخاری، هواکش ها و لامپ ها به خارج از سالن ها منتقل شوند.

فعالیت کارگاهی

لوازم از قبیل دان خوری، آب خوری و غیره از سالن‌ها خارج و جهت شستشو و ضدغونی به محوطه خارج از سالن منتقل شوند.

۱ **بخاری یا هیتر:** در صورتی که در سالن از بخاری به عنوان وسیله گرمایش استفاده می‌کنید. باید در پایان دوره آن را از جایگاه خارج کرده و سرویس‌های لازم را انجام دهید.

۲ **هواکش‌ها:** تمام هواکش‌های موجود را باید کنترل نموده و در صورت نیاز به تعمیر از سالن خارج کنید.

۳ **لامپ‌ها:** باید کلیه لامپ‌ها را باز کنید تا در هنگام

شستشو و ضدغونی آسیب نبینند.

خارج کردن وسایل از سالن

ابزار و وسایل مورد نیاز

- لباس کار و چکمه
- ماسک مخصوص
- دستکش
- کلاه
- گاری یا فرغون

مراحل انجام کار

۱ آب خوری‌ها و دان خوری‌ها: کلیه تجهیزات و



در آماده‌سازی سالن پرورش، اصول و ضوابط علمی را به گونه‌ای با وسوس و با تقوا آماده کنید تا در آینده با بیماری و به تبع آن با مصرف دارو و مواد شیمیایی مجبور به کنترل بیماری نشود.

اخلاق
حرفه‌ای



فعالیت کارگاهی

جمع آوری و خارج کردن بستر

ابزار و وسایل مورد نیاز

- لباس کار و چکمه
- دستکش
- کلاه
- ماسک مخصوص
- فرغون و بیل
- کاردک

مراحل انجام کار

پس از جمع آوری و تخلیه بستر کود کودهای چسبیده به کف جایگاه را به سیله کاردک های مخصوص جدا و سپس از جایگاه خارج کنید. انتقال کود تا حدامکان توسط کامیون های چادردار انجام شود تا از ریخت و پاش اضافی کود جلوگیری گردد. محل دپوی کود حداقل ۲ کیلومتر دورتر از سالن ها باشد. تخلیه کود در جلوی سالن ها کار صحیحی نیست.

پس از باز کردن و خارج کردن تجهیزات و وسایل از سالن، باید بستر (کود) را با کمترین ریخت و پاش از سالن ها خارج کرد. در سالن های کوچک جمع آوری و خارج کردن بستر را به سیله بیل و فرغون انجام دهید. در هنگام جمع آوری بستر از ماسک ها و لباس مخصوص استفاده کنید. ضمناً باید پنجره های سالن را حین کار باز کرده تهویه را روشن کنید. در سالن های بزرگ برای جمع آوری و تخلیه کود از وسایل مکانیکی استفاده شود. در صورتی که امکانات مالی اجازه می دهد استفاده از نوار نقاله متحرک جهت خروج کود از سالن ها توصیه می شود.



انتقال کود به خارج از سالن مرغداری

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهنده)	نمره
مرغ	تخلیه سالن پرورش دستکش - عینک - بیل - فرغون	لباس کار - ماسک -	۱- خروج کامل کود و تجهیزات از سالن ۲- خروج نسبتاً کامل کود و تجهیزات از سالن ۳- خروج ناقص کود و تجهیزات از سالن	عدم مشاهده کود و تجهیزات در سالن	۳
۱				مشاهده مقدار کود جزئی در سالن	۲
				مشاهده کود و دان خوری و آب خوری آلووده در سالن	۱

روش‌های شست و شوی سالن

- ۱ شست و شوی کامل سطوح مختلف سالن‌ها.
۲ پس از شست و شوی سالن‌ها، اتاق سرویس و اتاق هیتر، راهرو و پدهای سلولزی نیز باید شست و شو شوند.
۳ حوضچه‌های آب مربوط به پدهای سلولزی به دقت شست و شو شوند.
۴ در صورت امکان سطوح خارجی سالن‌ها نیز باید شسته شود.
۵ شست و شوی سیلوی دان همراه با لوله‌های انتقال دان.
۶ شست و شوی کلیه وسایل خارج شده از سالن به وسیله مواد شوینده مناسب و نگهداری آنها در محلی مناسب.
۷ شست و شوی راه‌های آسفالت داخل واحد مرغداری.
۸ شست و شوی رختکن، دوش، کمد، دفتر کار، اتاق پرسنلی و سایر قسمت‌ها.
- قبل از ضدغونی سالن و پس از خروج کامل وسایل و مواد بستری سالن باید شسته شود. برای شست و شوی سالن از دستگاه محلول پاش یا سمپاش می‌توان استفاده کرد، بدین منظور مواد شوینده با نسبت معین با آب ترکیب می‌شود. قبل از شست و شو نیز باید برق سالن قطع شود. لباس کار و تجهیزات ایمنی توصیه شده را فراموش نکنید.

نکات ضروری قبل و حین شست و شو

- ۱ پس از تخلیه کامل کود از داخل سالن‌ها، جارو کردن و گردگیری سطوح ناصاف به کمک جارو، کاردک و برس سیمی انجام گردد.
۲ شست و شوی دقیق منابع آب به وسیله برس و اسکاج و مواد شوینده انجام شود.
۳ منابع آب پس از شست و شوی دقیق، از آب پر شوند و بعد از کلرزنی تا ۴۸ ساعت آب کلردار در منابع آب بماند.

فعالیت کارگاهی

مراحل انجام کار

شست و شوی کامل سطوح مختلف سالن‌ها (کف، دیوارها، در صورت امکان سقف) باید با آب گرم تحت فشار انجام گیرد. بهتر است که ابتدا سقف‌ها و سپس دیوارها و در انتهای کف سالن‌ها شسته شود (از مایع ظرفشویی به نسبت نیم لیتر برای ۱۰۰۰ لیتر آب می‌توان استفاده کرد).

شست و شوی سالن

ابزار و وسایل مورد نیاز

لباس کار ■ چکمه ■ دستکش ■ کلاه ■ ماسک
محصول ■ دستگاه محلول پاشی ■ جارو ■ برس
اسکاج ■ مواد شوینده مناسب و آب به میزان لازم



شست و شوی کف



شست و شوی دیوارها



شست و شوی سقف

دقت کنید تا به تجهیزات برقی و سایر وسایل آسیب‌پذیر در مقابل رطوبت خسارتی وارد نیاید.



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۲	پرورش مرغ شستشوی سالن	لباس کار - ماسک - دستکش - مواد شوینده - وسایل نشت و شو	۱- نظافت کامل سالن پرورش	عدم مشاهده آلودگی فیزیکی در سالن پرورش	۳
			۲- نظافت نسبی سالن پرورشی	مشاهده آلودگی فیزیکی جزئی در سالن پرورش	۲
			۳- نظافت ناقص سالن پرورشی	مشاهده آلودگی فیزیکی زیاد در سالن پرورش	۱

آشنایی با روش‌های ضدغوفونی

بسته به نوع موادی که برای ضدغوفونی در پرورش در سرداخنه‌ها استفاده می‌شود.

جوچه به کار می‌رود، معمولاً به سه دسته تقسیم **روش‌های ضدغوفونی فیزیکی** می‌شوند:

بهترین ضدغوفونی کننده فیزیکی حرارت است

۱ روشهای ضدغوفونی طبیعی

که از آن می‌توان به دو صورت خشک و مرطوب استفاده کرد. از حرارت خشک به صورت شعله دادن به وسیله شعله افکن استفاده و کف و دیوار سالن‌های مرغداری را ضدغوفونی می‌کنند. با این روش می‌توان

۲ روشهای ضدغوفونی فیزیکی

میکروب‌های بیماری‌زا و تخم انگل‌ها را به خوبی از بین برده. در تصاویر پیوست به خوبی روش شعله دادن کف و سطوح نشان داده شده است. یکی دیگر از

۳ روشهای ضدغوفونی شیمیایی

ضدغوفونی کننده‌های فیزیکی حرارت مرطوب است. شاید بهترین ماده ضدغوفونی کننده باشد. یکی دیگر از

۱ روشهای ضدغوفونی طبیعی

با خار آب جوش بهترین ماده ضدغوفونی کننده به شمار می‌رود. حرارت آب جوش معمولاً بیش از ۱۰۰ درجه است و در این حرارت کمتر میکروب یا انگلی

۲ روشهای ضدغوفونی فیزیکی

تاب مقاومت دارد. از آب جوش برای ضدغوفونی لانه و وسایل جوجه‌کشی و قفس و آب‌خوری و دان‌خوری استفاده می‌شود.

مستقیم آن به مقدار زیادی فعالیت خود را از دست می‌دهند. در بین انوار مختلف اشعه خورشید اشعه ماوراء بنفش سبب کشتن میکروب‌ها و باکتری‌ها می‌شود. از این رو آفتاب ارزان‌ترین و آسان‌ترین و

شاید بهترین ماده ضدغوفونی کننده باشد. یکی دیگر از ضدغوفونی کننده‌های طبیعی سرما و برودت است. البته روش سرماده‌ی اثر ضدغوفونی و کشنندگی قوی برای

میکروب‌ها ندارند؛ بلکه فقط رشد و نمو آنها را به تعویق می‌اندازد و درنتیجه برای نگهداری گوشت و تخم مرغ



ضدغونی کننده فیزیکی با حرارت

ابزار و وسائل مورد نیاز


این مواد مورد استفاده در این روش‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌انداز آهک، فرمالدئید، دستگاه محلول پاشی ترکیبات چهارتایی آمونیوم، مواد فنلی، مواد یدی و کلریدی که اغلب به صورت محلول پاشی، گازدهی و گردپاشی به کار می‌روند.

- لباس کار
- چکمه
- دستکش
- کلاه
- ماسک مخصوص
- شعله افکن
- آب به میزان لازم
- مواد ضدغونی کننده
- تجهیزات قابل ضدغونی

۳ روش‌های ضدغونی شیمیایی

تلهیه محلول ضدغونی کننده برای تهییه محلول ضدغونی کننده، مراحل زیر به ترتیب انجام گیرد:

- ۱ پوشیدن لباس کار، چکمه، دستکش و ماسک مخصوص.
- ۲ مطالعه دقیق دستورالعمل و توصیه‌های کارخانه سازنده ماده ضدغونی کننده.
- ۳ محاسبه مقدار لازم از ماده ضدغونی کننده مورد



فعالیت کارگاهی

استفاده مطابق با دستورالعمل و بر اساس مساحت و حجم سالن (کف، ارتفاع، طول، عرض و ...).

۴ اضافه کردن مقدار معین آب محاسبه شده با توجه به دستورالعمل.

۵ انتخاب ظرف مناسب برای تهییه و نگهداری محلول ضدغونی کننده.

تهییه محلول ضدغونی کننده

برای تهییه محلول ضدغونی کننده، مراحل زیر به ترتیب انجام گیرد:

- ۱ پوشیدن لباس کار، چکمه، دستکش و ماسک مخصوص.
- ۲ مطالعه دقیق دستورالعمل و توصیه‌های کارخانه سازنده ماده ضدغونی کننده.

- ۳ محاسبه مقدار لازم از ماده ضدغونی کننده مورد

فعالیت کارگاهی

روش تهیه محلول ضدغونی کننده

- ۱ محلول های غلیظ: ابتدا باید رقیق سازی محلول های غلیظ صورت گیرد و پس از تهیه محلول رقیق شده با غلظت مورد نظر نسبت به غوطه ورسازی وسایل و تجهیزات در زمان توصیه شده اقدام شود.
- ۲ محلول های آماده مصرف: مواد آماده مصرف نیازی به رقیق سازی ندارند.



تهیه محلول ضدغونی کننده

۷ شناسایی و شناخت مواد شیمیایی یا سایر موادی که با ماده ضدغونی کننده واکنش می دهند و یا به نوعی فعالیت آن را خنثی می کند.

۸ در صورت تماس با چشم، چشم را به مدت ۱۰ دقیقه در آب سرد باز نگه دارید.

۹ آشنایی با اثرات سمی یا سایر خطراتی که برای استفاده کنندگان ماده ضدغونی وجود دارد و همچنین تعیین معیارهای لازم برای حفاظت افراد در مقابل ماده ضدغونی کننده از قبیل پوشیدن دستکش یا چگونگی باز کردن درب ظرف محتوی ماده ضدغونی کننده و مخلوط کردن آن و نیز اقداماتی که باید هنگام تماس با پوست و یا ریختن ماده در چشم انجام گیرد.


به طور کلی در هر دو روش پرورش بستر و قفس از روش های محلول پاشی، حرارت دهی و گازدهی برای ضدغونی سالن پرورش جوجه استفاده می شود. باید

نکات قابل توجه در هنگام استفاده از ضدغونی کننده ها

- ۱ ضدغونی کننده ها و گندزداها تنها برای استعمال خارجی بوده و از ورود آنها به دهان، چشم، گوش و دستگاه تنفسی جدا باید جلوگیری کرد.
- ۲ مواد ضدغونی کننده را نباید با هم استفاده کرد. مثلاً صابون، ساولن را ب اثر می کند.
- ۳ جعبه کمک های اولیه در هر مرغداری باید در دسترس باشد.
- ۴ مواد ضدغونی کننده را باید در مقدار توصیه شده، تهیه و استفاده کرد.
- ۵ برای تهیه محلول رقیق، همیشه باید محلول غلیظ را به آب اضافه کرد و از افزودن آب به محلول ضدغونی کننده خودداری شود.
- ۶ اثر میکروب کشی هر گندزادایی با آب داغ بیشتر می شود (با آب ژاول و ید، این کار را نباید کرد).

زوایای قفس با روش محلول پاشی کاملاً شست و شو و ضد عفونی شود. با توجه به مواد شیمیایی مناسب، متداول ترین روش برای ضد عفونی شیمیایی سالن های مرغداری، گاز دادن با فرم ال دئید است.

توجه داشت که شعله افکن حرارت خشک ایجاد می کند و در نتیجه کف و دیوارهای سالن از داخل و خارج تا ارتفاع $1/5$ متر و سطوح مواد غیر قابل اشتعال را می توان با آن ضد عفونی کرد. در سالن های دارای قفس باید سعی شود تمام



ضد عفونی در سیستم پرورش قفس و بستر

فعالیت کارگاهی

- نکنید.
- ۷ دیوارهای و کف سالن‌ها به‌ویژه سطوح ناصاف و گوشه‌ها شعله‌افکنی شوند.
 - ۸ شعله دادن کف و دیوارهای سالن از داخل و خارج تا ارتفاع $1/5$ متر.
 - ۹ سطوح داخلی سالن‌ها، کف و قفس‌ها با ماده ضدغونی (با نظر افراد متخصص) ضدغونی شده و پس از ضدغونی، در سالن‌ها تا ۲۴ ساعت بسته بماند تا ماده ضدغونی خشک شود (ترجیحاً محلول ۲ درصد ترکیبات ضدغونی با طیف گسترده).

ضدغونی سالن مرغداری

ابزار و وسایل مورد نیاز

- لباس کار ■ چکمه ■ دستکش ■ کلاه
- ماسک مخصوص ■ دستگاه محلول‌پاشی
- شعله افکن ■ آب به میزان لازم

مواد ضدغونی‌کننده ■ تجهیزات قابل ضدغونی

مراحل انجام کار

- ۱ لباس کار و تجهیزات ایمنی توصیه‌شده را فراموش



ضدغونی سالن مرغداری

- ۵ برای ضدغونی از محلول ۱۰ درصد فرمالین (فرمالین تجاری ۴۰ درصد) هم می‌توان استفاده کرد.
- ۶ سطوح خارجی و محوطه ضدغونی شوند.
- ۷ اتاق هیتر، راهرو و پد سلوزلری ضدغونی شوند.
- ۸ اطراف محل‌های ورود هوا و هوکش‌ها به دقت ضدغونی شوند.
- ۹ سیلولوها با محلول ۴ درصد فرمالین ضدغونی شوند.
- ۱۰ دفتر، اتاق کارگری، رختکن و دوش ضدغونی شوند.
- ۱۱ برای اطمینان از برنامه آماده‌سازی بار دیگر نمونه‌گیری از محیط‌های مختلف به عمل آید.
- ۱۲ پس از انتقال وسایل به داخل سالن، ضدغونی مرحله دوم انجام شود.



آهک پاشی محوطه اطراف سالن‌های مرغداری

ایمنی



توجه



در زمان سم پاشی به محوطه مرغداری باید توجه نمود این کار در خلاف جهت وزش باد صورت نگیرد.

در بعضی موارد که آلودگی شدید است پس از ضدعفونی مرحله دوم، شعله افکنی مرحله دوم به شرح قبل انجام می شود. پس از ضدعفونی مرحله دوم، آهک پاشی محوطه، به ویژه در مسیرهای تردد انجام شود (به ضخامت ۳ سانتی متر).

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها/ داوری / نمره دهی)	نمره
	ضد عفونی سالن پرورش مرغ	لباس کار - ماسک - دستکش - مواد ضد عفونی - وسایل و تجهیزات ضد عفونی	۱- ضد عفونی کامل سالن پرورش ۲- ضد عفونی نسبتاً کامل سالن پرورش ۳- ضد عفونی ناقص سالن پرورش	بار میکروبی کم در سالن پرورش	۳
				بار میکروبی نسبتاً کم در سالن پرورش	۲
				بار میکروبی زیاد در سالن پرورش	۱

پخش پوشال

جوچه ها برای پرورش نیاز به بستر دارند. بستر و وضعیت آن در آشیانه های پرورش جوچه اهمیت زیادی دارد. بسترهای که در یک سالن استفاده می شود باید به گونه ای باشد که جایگاهی نرم و راحت برای جوچه ها فراهم کند.

اقتصاد محلی و قابلیت دسترسی، دو عامل مهم در تعیین نوع بستر هستند. یک بستر خوب باید دارای شرایط زیر باشد:

- ۱ جذب خوب رطوبت
- ۲ قابلیت زیست تخریب پذیری
- ۳ راحتی پرنده
- ۴ میزان پایین گرد و خاک
- ۵ فقدان آلوهه کننده ها
- ۶ دسترسی مداوم به منبعی زیست ایمن

برای بستر از موادی از جمله تراشه چوب (پوشال)، کاه، کلش، سبوس برنج، خزه، خاک اره، ماسه، رول کاغذی و مواد مشابه استفاده می شود.



کاغذ عمل آوری شده



پوست کاج



خزه



خرده چوب



تراشه و خاک اره کاج



پوست نارگیل



پوسته بادام زمینی



شلتونگ برنج



مائسه



کاه یا علف ریز شده



تراشه و خاک اره (پوشال)



پلت کاه

به نظر شما بهترین بستر برای جوجه‌های گوشتی کدام است؟ چرا؟
عمده‌ترین نقش بستر برای چیست؟

تحقیق
کنید



فعالیت کارگاهی

می تواند دسترسی جوجه ها به آب و دان را محدود کرده و منجر به غیر یکنواختی رشد شود. اگر دمای کف سالن در حد مطلوب یعنی ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتی گراد باشد می توان ضخامت بستر را به ۵ سانتی متر کاهش داد.

مراحل انجام کار
پوشال باید به طور یکنواخت به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتی متر در کف سالن پخش شود. بستر ناهموار در طی دوره پرورش باید بستر شل و خشک نگه داشته شود. با گرم شدن سالن، هوا منبسط شده و توانایی آن در نگهدارشتن رطوبت افزایش یافته و در نتیجه بستر خشک می‌ماند.

یہن کردن پستہ

- اہزار و وسائل مورد نیاز
- لباس کار دستکش ماسک مخصوص
- پوشال شنکش بیل

افزایش رطوبت بستر سبب افزایش تولید گاز آمونیاک و به دنبال آن افزایش میزان مشکلات تنفسی در جوجه‌ها می‌شود.

توجه



دستگاه پوشال پخش کن

در سالن های بزرگ
به منظور صرفه جویی
در وقت، پخش
پوشال با دستگاه
پوشال پخش کن یا
Spreader انجام
می شود.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۴	آماده سازی پستر پرورش	بستر نرم، غیر رسمی، ارزان، این من با ارتفاع مناسب در سالن	۱- آماده سازی بستر با رعایت اصول فنی ۲- آماده سازی بستر با رعایت نسبی اصول فنی ۳- آماده سازی بستر بدون در نظر گرفتن اصول فنی	بستر نرم، غیر رسمی، ارزان، این من با ارتفاع نسبتاً مناسب	۲
	آماده سازی پستر جهت پرورش مرغ	بستر خشن با وجود مواد سمی و صدمه‌رسان و با قیمت و ارتفاع نامناسب			۱
					۳

روش گاز دادن سالن

۱ قبل و هنگام گاز دادن، هواکش‌ها خاموش و هواده‌ها مسدود و کلیه منافذ سالن بسته شوند.

۲ برای دود دادن از ظروف سفالی یا فلزی حدود ۵ برابر فرمالین و پرمنگنات استفاده شود.

۳ ابتدا پرمنگنات و سپس فرمالین به آن اضافه شود.

۴ برای ضدغوفونی بهتر و مؤثرتر از تعداد بیشتری ظروف استفاده شود.

۵ در حین کار از ماسک ضدگاز استفاده شود.

۶ بعد از گاز دادن به مدت ۴۸ ساعت درهای سالن بسته نگه داشته شود (در این مدت کلیه رفت و آمدّها به سالن قطع شود).

۷ بعد از گذشت ۴۸ ساعت از گازدهی درهای سالن باز شده و هواکش‌ها روشن شود تا دود کاملاً تخلیه شود (این مرحله یک الی دو روز طول می‌کشد).

۸ پس از اینکه دود کاملاً تخلیه شد به گرم کردن سالن اقدام شود.

عمل دوددادن سالن باید حدود ۵ روز قبل از ورود جوجه‌ها به سالن انجام شود (۲ روز برای دود دادن،

۲ روز برای تخلیه دود و ۱ روز برای گرم کردن سالن‌ها).

گازدهی سالن‌ها توسط ماده پرمنگنات پتابسیم و مایع فرمالین انجام می‌شود. از واکنش دو ماده ذکر شده گاز فرمالدئید آزاد می‌شود که خاصیت ضدغوفونی کنندگی بسیار قوی دارد.

توجه: واکنش فوق گرمایی است؛ بنابراین نباید از ظروف پلاستیکی استفاده شود.

برای ضدغوفونی سالن مرغداری به ازای هر ۲۰ گرم پرمنگنات پتابسیم حدود ۴۰ میلی لیتر فرمالین تجاری ۴۰ درصد برای هر ۲/۸۳ مترمکعب فضای سالن باید استفاده شود. بهترین اثر در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۶۵ الی ۷۰ درصد می‌باشد.

در گاز دادن سالن توجه به نکات زیر ضروری است:



گاز فرمالدئید



پرمنگنات پتابسیم



استفاده از ماسک ضدگاز فرمالین



فعالیت کارگاهی

ضدغوفونی لوازم و تجهیزات

مراحل انجام کار

مرحله ۱: کلیه لوازم و تجهیزات از قبیل دان‌خوری، آب‌خوری و آنهایی که قابل شست و شو هستند به خارج از سالن‌ها منتقل شده و سپس در آب گرم غوطه‌ور شوند.

مرحله ۲: لوازم فوق را با دیگر با آب گرم و برس شسته و سپس در ماده ضدغوفونی کننده مؤثر به مدت دو ساعت غوطه‌ور شوند تا ضدغوفونی و سپس با آب تمیز شسته شوند.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ایزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
	ضدغونی تجهیزات	لباس کار - ماسک- دستکش - مواد ضدغونی - مواد شوینده	۱- ضدغونی مناسب تجهیزات ۲- ضدغونی قابل قبول تجهیزات ۳- ضدغونی نامناسب تجهیزات	شستن کامل تجهیزات شستشو و ضدغونی آنها و نظافت تعدادی از تجهیزات با ...	۳
۵				شستن نسبتاً کامل تجهیزات قابل شستشو و ضدغونی آنها و نظافت تعدادی از تجهیزات با ...	۲
				عدم شستن مناسب تجهیزات قابل شستشو و ضدغونی آنها و نظافت تعدادی از تجهیزات با ...	۱

موارد ایمنی و بهداشتی



- ۱ ضدغونی‌کننده‌ها و گندزدaha تنها برای استعمال خارجی است و از ورود آنها به دهان، چشم، گوش و دستگاه تنفسی جداً باید جلوگیری کرد.
- ۲ رعایت ایمنی کامل پرسنل با استفاده از لوازم حفاظت شخصی (لباس کار، ماسک، کلاه و دستکش) ضروری هست.
- ۳ رعایت اصول ذخیره‌سازی مناسب ضدغونی‌کننده‌ها ضروری است، برخی از ضدغونی‌کننده‌ها و گندزدaha برای بهداشت انسان و دام خطرات جدی دارند.
- ۴ ایجاد آمادگی در نحوه صحیح مخلوط کردن ضدغونی‌کننده‌ها و روش‌های کاربردی آنها
- ۵ مواد ضدغونی‌کننده را باید در مقادیر کم استفاده کرد.
- ۶ عوامل محیطی نظیر هدایت جریان آب به داخل نهرها و رودخانه‌ها باید در انتخاب ضدغونی‌کننده در نظر گرفته شود. بسیاری از این مواد تهدیدی برای محیط زیست، زندگی گیاهان و آبزیان محسوب می‌شوند.

راهاندازی تجهیزات سالن پرورش

در مرغداری‌ها برای جوجه‌های کمتر از ۲ هفتگی از دان خوری‌های اولیه استفاده می‌شود. حداکثر پس از یک هفته دان خوری‌های سینی از سالن خارج شده و از دان خوری ناوادانی دستی، سلطی و یا خودکار استفاده

می‌شود و پس از آن متناسب با سن جوجه‌ها ارتفاع دانه‌خوری افزایش یابد (پشت جوجه‌ها مماس با لبه دانه‌خوری باشد).



دانه‌خوری سینی شکل




دانه‌خوری دستی ناودانی یا تراف



دانه‌خوری دستی بشقابی (سطلی)

دانه‌خوری‌های دستی، بر روی بستر قرار می‌گیرند یا به صورت آویزان نصب می‌شوند. با رشد طیور ارتفاع دانه‌خوری‌ها باید مرتبًا زیاد شود. افزایش ارتفاع دانه‌خوری‌ها حداقل هفته‌ای یکبار انجام می‌شود تا از ریخت‌وپاش بی‌رویه دان و آلوده‌شدن آن به فضولات که با داخل شدن جوجه‌ها به دانه‌خوری صورت می‌گیرد، جلوگیری گردد. برای جلوگیری از به هدر رفتن دان در دانه‌خوری، باید سعی شود تا بیش از ارتفاع دیواره دانه‌خوری پر نشود.

سیستم دانه‌خوری خودکار متشکل از ناودانی‌ها و لوله‌های به هم پیوسته بوده که در یک یا چند حلقه (لوب) تودر تو به دور سالن مرغداری بر روی پایه‌های قابل تنظیم ارتفاع نصب شده است. هر حلقه، ۲ خط دانه‌خوری در طول سالن ایجاد می‌کند. این حلقه‌های کanal دو طرف هاپر دانه‌خوری (مخزن دان) را به یکدیگر وصل می‌کند. به وسیله یک موتور گیربکس، زنجیر یا مارپیچ حلقه‌نی درون کanal به حرکت در آمده و دان موجود در مخزن دان را با خود حمل و ناودانی‌ها یا بشقاب‌ها را ارتفاع مشخص از دان پر می‌کند. این حرکت پیوسته ادامه داشته و از این رو دان، دائمًا در اختیار پرندگان قرار می‌گیرد. برای جدا کردن پوشال و مواد زائد درون دان از وسیله‌ای به نام صافی در دانه‌خوری زنجیری استفاده می‌شود. در دانه‌خوری‌های بشقابی چون دان در لوله‌ها منتقل می‌شود، امکان ورود مواد زائد به آن وجود ندارد؛ به همین دلیل، نیازی به نصب صافی نیست.





منتقل می‌شوند و آب‌خوری‌های خودکار آویز پایین کشیده می‌شوند. بهتر است قبل از اینکه جوجه‌ها از آب‌خوری‌های خودکار استفاده کنند حدود ۱۰ دقیقه شیر فلکه باز گذاشته شود که جرم‌های درون لوله خارج شود. آب‌خوری‌های دستی نیاز به آویز کردن ندارند.

در مرغداری‌ها برای جوجه‌های کمتر از سن یک هفتگی از آب‌خوری‌های اولیه استفاده می‌شود. از ۴ الی ۷ روزگی آب‌خوری‌های دستی باید به خارج از سالن منتقل شوند و آب‌خوری‌های خودکار برای استفاده جوجه‌ها آماده شوند. بعد از ۴ الی ۷ روزگی ۷۵ درصد آب‌خوری‌های دستی جمع‌آوری و به بیرون



آب‌خوری قارچی شکل

آب‌خوری ۳ لیتری (کله قندی)

آب‌خوری پلاستیکی

آب‌خوری پلاستیکی

آب خوری‌های خودکار از طریق نخ نگهدارنده تنظیم می‌شود.

آب خوری نیپل و فنجانی برای تأمین آب مصرفی طیور از یکروزگی تا پایان دوره استفاده می‌شود. نیپل و فنجان‌ها را باید روی لوله‌های انتقال آب نصب کرد. برای اتصال لوله‌های انتقال آب به یکدیگر از دو سری اتصالات استفاده می‌شود که شامل اتصالات ثابت و متحرک است. اتصالات متحرک این امکان را می‌دهد تا بتوان در صورت نیاز به تعمیر، لوله‌های انتقال آب را به سهولت از هم جدا کرد. لوله‌های نگهدارنده را باید از طریق گیره‌های نگهدارنده به رگلاتور نیز جهت تنظیم فشار آب خطوط آب خوری نصب می‌شود.



آب خوری نیپل

برای راه اندازی آب خوری سیفونی باید لوله‌های کم‌شاری را در مرغداری و در یک ارتفاع مناسب از سقف آویزان کرد. آب مناسب در داخل این لوله‌ها در جریان خواهد بود و سپس این آب خوری‌های زنگی یا سیفونی از طریق شلنگ‌های نازکی از طریق کلاهک به این لوله‌ها وصل خواهد شد. آب خوری‌های سیفونی شکل از طریق رابط و یک اتصال T شکل به این لوله سیاهرنگ وصل می‌شوند. اتصال T شکل همانند قفل (شیر و یا فلکه) عمل می‌کند. وقتی بخواهیم یک آب خوری را از مدار خارج کنیم از این اتصال T شکل استفاده می‌کنیم. اگر مسیر شلنگ را به سمت سقف سوله دنبال کنید می‌توانید رابط T شکل و همچنین لوله آب سیاهرنگ را مشاهده کنید. نکته مهم آن است که لوله سیاه رنگ خود به یک مخزن آب وصل است و برای اینکه آب مخزن بتواند تمامی آب خوری‌ها را سیراب کند باید با یک شیب ملایم و مناسب از سقف آویزان شود. همان‌طور که قبلًا بیان شد ارتفاع همه



آب خوری فنجانی




نصب فیلتر در محل خروجی منبع آب



مسافت (حداکثر ۱ متر) به آب‌خوری یا دانه‌خوری دسترسی پیدا کند. برای این منظور باید با توجه به وضعیت ساختمان و امکانات خود، آنها را در مکان‌های مناسب قرار دهید. در شکل‌های زیر چند نمونه آرایش آب‌خوری و دانه‌خوری دیده می‌شود.

برای تجهیز سالن، باید کلیه وسایل از قبیل گرم‌کننده‌ها، خنک‌کننده‌ها، تهویه‌ها و وسایل روشنایی را با دقت کامل در جایگاه نصب کنید. آب‌خوری و دانه‌خوری‌ها باید به صورت یکنواخت روی بستر چیده شوند، به طوری که جوچه در هر نقطه از سالن با طی کمترین



سالن‌های آماده پرورش جوجه

پرورش جوجه

سیستم قفس تمام خودکار مرغ گوشتی مجهز به سیستم خودکار، جمع آوری کود خودکار، تخلیه مرغ، دانه خوری بشقابی، آب خوری نیپل و سیستم روشنایی با چراغ های LED است.



سیستم قفس تمام خودکار مرغ گوشتی

فعالیت کارگاهی

بازبینی دان خوری های دستی

- ۱ صافی را مرتب تمیز کنید.
- ۲ قسمت های مختلف اجزای معیوب را بازدید کنید.
- ۳ کلیه قسمت ها را ماهانه تمیز کنید.
- ۴ گریس کاری قسمت های مورد نیاز را انجام دهید.
- ۵ بازدید روزانه سیستم و رفع گرفتگی ها و مواعن موجود در مسیر انتقال دان را در برنامه داشته باشید.
- ۶ ارتفاع ناودانی را مطابق با رشد مرغ تنظیم کنید (حداقل هفتاهی یکبار).
- ۷ داخل مخزن را بازدید کنید.

مراحل انجام کار

- ۱ داخل مخزن را بازدید کنید.
- ۲ ارتفاع ناودانی را مطابق با رشد مرغ تنظیم کنید (حداقل هفتاهی یکبار).

فعالیت کارگاهی

بازبینی دان خوری های بشقابی (مارپیچی) و زنجیری

- ۱ تنظیم ارتفاع لوله ها حداقل هفتاهی یکبار
- ۲ بازدید قسمت های مختلف و تعویض اجزای معیوب مسیر نقاله و لوله ها
- ۳ تمیز کردن ماهانه کلیه قسمت های سیستم گریس کاری قسمت های مورد نیاز
- ۴ بازدید روزانه سیستم و رفع گرفتگی احتمالی در رسوب گیری آنها در صورت نیاز

فعالیت کارگاهی

بازبینی آب خوری های خودکار

- ۱ بازدید دوره ای کلیه مدار آب و محل های اتصال و برطرف کردن هر گونه نشتی
- ۲ بازدید واشرها و فررهای آب خوری و تمیز کردن و تنظیم ارتفاع آب خوری ها

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، موارد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۶	راهاندازی تجهیزات	آب خوری - دان خوری - ادوات مربوطه جهت نصب	۱- نصب آب خوری و دان خوری با رعایت استانداردها ۲- نصب آب خوری و دان خوری با رعایت نسبی استانداردها ۳- نصب آب خوری و دان خوری با عدم رعایت اصول فنی	تعداد و فاصله مناسب آب خوری و دان خوری در سالن	۳
		آب خوری و دان خوری ها سیستم‌های تهویه، گرمایش و سرمایش، لامپ‌ها		تعداد و فاصله نسبتاً مناسب آب خوری و دان خوری در سالن	۲
				تعداد کم و فاصله نامناسب آب خوری‌ها و دان خوری در سالن	۱

ارزشیابی شایستگی آماده‌سازی سالن پرورش مرغ

شرح کار:

- ۱- پاکسازی سالن پرورش
- ۲- شست و شوی سالن پرورش
- ۳- ضدغونی سالن پرورش
- ۴- تهیه و آماده‌سازی بستر
- ۵- ضدغونی تجهیزات
- ۶- راه اندازی تجهیزات

استاندارد عملکرد:

آماده کردن سالن مرغداری به مساحت ۵۰۰ متر مربع در مدت ۱۵ روز

شاخص‌ها:

- ۱- مشاهده نکردن کود، مواد بستر و تجهیزات قابل انتقال در سالن پرورش
- ۲- سالن پرورش تمیز و عاری از بقایای کود و مانند آن
- ۳- انتخاب ماده ضدغونی کننده بر اساس نوع و غلظت ماده مؤثر و استفاده از آن طبق دستورالعمل
- ۴- کف سالن پوشیده از بستر مناسب
- ۵- تجهیزات (آبخوری، دان خوری و مانند آن) ضدغونی شده
- ۶- نصب آب خوری و دان خوری‌ها طبق سن، تعداد و نوع پرنده پرورشی (گوشتی یا تخم‌گذار)

شرایط انجام کار:

مواد شوینده و ضدغونی کننده - لوازم و ادوات شست و شو و ضدغونی - بسترهای بهداشتی - دان خوری و آب خوری استاندارد

ابزار و تجهیزات:

مواد شوینده - مواد ضدغونی کننده - وسایل شست و شو - وسایل ضدغونی کننده - بستر - آب خوری - دان خوری - لوازم جانبی جهت نصب تجهیزات (گارد و ...)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تخلیه سالن پرورش مرغ	۱	
۲	شست و شوی سالن پرورش مرغ	۲	
۳	ضدغونی سالن پرورش مرغ	۱	
۴	آماده‌سازی بستر پرورش مرغ	۲	
۵	ضدغونی تجهیزات	۲	
۶	راه‌اندازی تجهیزات	۱	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
مدیریت مواد و تجهیزات، محاسبه و ریاضی، استفاده از لباس کار، ماسک، دستکش و عینک، حفظ سلامت فردی در زمان انجام کار، تخلیه بهداشتی پس از آماده‌سازی سالن، صداقت در انجام کار			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری: ۷

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

واحد یادگیری ۸

جمع آوری و ذخیره سازی کود مرغی

آیا تابه حال پی بوده‌اید؟

- ۱ به چه روش‌هایی می‌توان کود را از سالن‌های مرغداری جمع‌آوری کرد؟
- ۲ برای جمع‌آوری کود از چه تجهیزاتی استفاده می‌شود؟
- ۳ انواع روش‌های ذخیره‌سازی کود کدام‌اند؟
- ۴ کود مرغی را به چه روش‌هایی می‌توان فراوری کرد؟

هدف از این بخش بررسی انواع روش‌های جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و فراوری کود مرغی است. یکی از مسائل صنعت طیور چگونگی حذف مواد زائد از سالن‌های مرغداری است. کود به علت داشتن عوامل بیماری‌زا، افزایش رطوبت بستر، تولید بوی نامطلوب و نیز ازدیاد حشرات، مشکلات زیادی در واحدها ایجاد می‌کند. جمع‌آوری مناسب کود، بهویژه در واحدهای مرغ تخم‌گذار که دوران پرورش طولانی‌تری دارند، بسیار مهم است. هر چند فضولات، جزئی از مواد زائد واحد پرورش مرغ محسوب می‌شود ولی لازم است یادآور شویم که این کود ماده بالارزشی برای حاصلخیزی خاک کشاورزی و ماده غذایی قابل استفاده برای سایر حیوانات اهلی است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که کود یک سالن مرغداری به ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه را در مدت ۳ روز تخلیه کنند.

مقدار فضولات مرغ در دوره پرورش و تخم‌گذاری

مادر گوشتی (۳۸ هفته)	مرغ تخم‌گذار (۶۰ هفته)	جوچه گوشتی (۸ هفته)	شرح
۶۱	۷۳/۵	۲/۱	فضولات (کیلوگرم)

کود مرغی دارای مقادیر قابل توجهی متبوعین، لیزین و سیستئین است.



روش‌های جمع‌آوری کود



در پرورش روی بستر، کود در پایان دوره با ابزار ساده مانند بیل یا به صورت مکانیکی جمع‌آوری می‌شود.

قفس استفاده می‌کنند. این صفحات سبب می‌شوند کود به راهروی بین قفس‌ها یا زیر قفس‌ها بریزد و سپس کارگران زیر قفس را با وسایل ابتدایی مانند

در سیستم قفس دو روش دستی و خودکار برای جمع‌آوری کود وجود دارد:

۱. دستی: در روش دستی از صفحات مایلی در زیر



جمع‌آوری کود قفس‌ها به صورت دستی

کاردک تخلیه می‌کنند.
۲. خودکار: در قفس‌های دارای نقاله، کود در زیر قفس روی صفحه‌ای از جنس پلاستیک ضخیم یا برزنت می‌ریزد. صفحه به صورت نوار بی‌انتهایی است که روزانه یک بار به حرکت در می‌آید. در انتهای سالن روی هر نوار یک تیغه به صورت ثابت نصب شده است که تیغه کود را می‌ترانش و در چاله می‌ریزد.



جمع‌آوری کود به روش نوار نقاله

تیغه‌های کود جمع کن

کود خشک کن منتقل می‌شوند. در صورت ثابت بودن نوار و متحرک بودن تیغه همین عمل برعکس انجام می‌شود. این دو قطعه شامل نوار نقاله و تیغه متحرک باشد. این دو قطعه شامل نوار نقاله و تیغه است. زمانی که نوار نقاله متحرک و تیغه ثابت است، نوار نقاله کودها را به انتهای سالن جایی که تیغه ندارند نیز می‌توانید از تیغه کود جمع کن استفاده کنید. در این حال کود زیر قفس‌ها می‌ریزد و به وسیله تیغه‌ای در قفس‌های پله‌ای، که قفس‌ها دقیقاً در زیر هم قرار می‌شود.

در این حال کود زیر قفس‌ها می‌ریزد و به وسیله تیغه‌ای در قفس‌های پله‌ای، که قفس‌ها دقیقاً در زیر هم قرار ندارند نیز می‌توانید از تیغه کود جمع کن استفاده کنید. در این حال کود زیر قفس‌ها می‌ریزد و به وسیله تیغه‌ای در این حال کود زیر قفس‌ها می‌ریزد و به وسیله تیغه‌ای به طور خودکار به انتهای سالن انتقال می‌یابد.

جمع آوری کود با مخزن خلا



ماشین جمع آوری کود با مخزن خلا

با استفاده از این مخازن، نیازی به طراحی‌های پرهزینه برای ایجاد شبکه‌های یک‌پارچه جمع آوری کود نیست. این مخازن به راحتی جایگزین پمپ‌ها، اوگرها (ماربیچ‌ها) و کانال‌های بتی حمل کود از سالن‌ها به حوضچه‌های نگهداری کود می‌شوند.

اجزای ماشین جمع آوری کود با مخزن خلا




۱. سیستم پارویی

این سیستم دارای یک محور مرکزی بوده و پاروهای جانبی می‌توانند حول آن به چپ و راست حرکت کنند وجود این محور به همراه دو پیچ کوتاه شده در دو طرف بازوی پارو مانع از آسیب دیدن پاروها در حین حرکت می‌شود.

پاروهای جانبی

۲. بال‌های جمع‌کننده کود

آزادی حرکت پاروها به طرفین از یک طرف مانع آسیب دیدن حرکت دستگاه شده و از طرف دیگر راننده می‌تواند بدون توجه به وضعیت پاروها صرفاً روی هدایت دستگاه تمرکز کند.




۳. مکش فوری

با توجه به استفاده از پمپ قوی، کود جمع‌آوری شده توسط بازوها بدون هیچ‌گونه افت در فشار خلاً به سرعت به داخل مخزن مکیده می‌شود.

۴. سیستم تخلیه

وجود مارپیچ سراسری در قسمت تحتانی مخزن به دستگاه این اجازه را می‌دهد تا هر نوع کود (اعم از مایع و جامد) را به راحتی تخلیه کند.



جمع‌آوری کود به روش گودال عمیق

در این سیستم زیر سالن یک گودال قرار دارد و مرغ‌ها در قفس یا بر روی کف تمام نرده پرورش می‌یابند و کود مرغ‌ها در دوره پرورش به گودال زیر می‌ریزد. گودال جمع‌آوری ۱/۸ تا ۲ متر ارتفاع دارد که پس از انباشته شدن کود طی یک دوره، کود گودال جمع‌آوری می‌شود.



جمع‌آوری کود به روش گودال عمیق

اخلاق
حرفه‌ای



در جمع‌آوری کودهای دام و طیور ضمن حفظ اصول علمی و بهداشتی و استفاده از چکمه، دستکش و ماسک بهداشتی و سایر نکات علمی، سالن را برای مراحل بعد تولید آماده کنید تا در وقت و هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. به هر حال رعایت هر نکته‌ای که در این خصوص (علمی، بهداشتی، ایمنی و اقتصادی) فرا گرفته‌اید دقیقاً عین رعایت احکام شرعی، واجب و لازم و عین تقوای الهی است. حداکثر بهره‌وری از حداقل امکانات و سالم‌ترین بهره‌وری با حفظ کمیت تولید، نشانه موفقیت شما در رعایت تقوای الهی و از بهترین عبادت‌ها و بهترین اعمال صالح و خدمت به بندگان خداست.

از مجموع روش‌های ممکن برای جمع‌آوری کود، بر حسب شرایط و امکانات سالن مرغداری شما باید بتوانید شرایط را بررسی و بهترین روش را انتخاب کنید.

فعالیت کارگاهی

- ۱ از مجموع مناسب‌ترین روش جمع‌آوری کود، بر حسب شرایط و امکانات سالن مرغداری شما باید بتوانید تعیین مناسب‌ترین روش جمع‌آوری کود در واحد مرغداری
- ۲ با توجه به وضعیت سالن بهترین روش را پیشنهاد ابزار و وسائل مورد نیاز نوشتافزار دسترسی دهید.
- ۳ به منابع علمی معتبر بازدید مشاوره مراحل انجام کار
- ۴ لباس کار مناسب به ویژه ماسک و دستکش بپوشید.
- ۵ از واحد مرغداری مورد نظر در منطقه بازدید کنید.

۴ کود جمع‌آوری شده را در مکان مناسب و دور از پس از پایان کار، دوش گرفته و لباس‌های خود سالن مرغداری انبار کنید.

۱. پس از اتمام کار، وسایل کار را به صورت مرتب و منظم سر جای خود قرار دهید.
۲. در حین انجام کار از شوخی کردن با یکدیگر بپرهیزید.

توجه



فعالیت کارگاهی

تنظیم تیغه کود جمع کن

از لباس و تجهیزات ایمنی کار (کلاه، ماسک، چکمه، دستکش) استفاده کنید.

- ۱ طرفیت و نوع ساختمان سالن مرغداری را در نظر بگیرید.
- ۲ بر حسب مقدار کود ریخته شده در داخل کاناال به دستگاه برنامه بدھید (در برنامه مشخص کنید که تیغه در هر مرحله چه مسافتی را طی کند).



تیغه کود جمع کن

به طور مثال هرگاه تیغه را روی ۵ متر تنظیم شود، تیغه از انتهای سالن حرکت می‌کند و تا ۵ متر جلو می‌آید، سپس متوقف می‌شود و به عقب برمی‌گردد و تمام کودهای این فاصله را به داخل کاناال در عرض سالن می‌ریزد. در مرحله بعد فاصله را بیشتر کنید، این عمل را آنقدر ادامه دهید تا تمام طول سالن پاک شود.
دقت کنید: طول مرحله رفت و آمد از ۱ تا ۵۰ متر قابل تنظیم است.

- ۳ کودها را جمع‌آوری کنید.
- ۴ در پایان کار دوش بگیرید و لباس‌ها را تعویض کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	جمع کردن کود با مکانیزه کود بیل، بیل الکتریکی، نوار نقاله	۱- آماده‌سازی به موقع سالن جهت جوچه‌ریزی بعدی ۲- عدم آماده‌سازی به موقع سالن جهت جوچه‌ریزی بعدی	تخليه دستی با مکانیزه کود بیل، بیل الکتریکی، نوار نقاله	تخليه کامل و به موقع سالن از کود	۳
				تخليه نسبتاً کامل و به موقع سالن از کود	۲
				عدم تخليه کامل و به موقع سالن از کود	

روش‌های آماده‌سازی و ذخیره‌سازی کود مرغی



۱ خشک کردن با استفاده از حرارت زیاد دستگاه‌های مخصوص: در این روش معمولاً از کوره با حرارت زیاد استفاده می‌شود. خشک کردن کود در حرارت بالا (حداقل ۷۰ درجه سانتی‌گراد) به مدت ۳ ساعت موجب پاستوریزه شدن کود بدون کاهش مواد آرژن آن می‌شود.



۲ خشک کردن در هوا: این روش نیاز به وقت طولانی داشته و مواد مضر میکروبی کود کاملاً از بین نمی‌روند.

ارزش کود مرغ بستگی به نوع و ترکیب جیره غذایی، روش نگهداری مرغ و نوع ماده‌ای که برای بستر مرغ استفاده می‌شود، دارد.



۳ کود سیلوشده: کود را با فشاری روی هم ریخته، هوا و رطوبت آن را خارج می‌کنند و این روش نیاز به ۶ هفته زمان دارد.

قابل ذکر است که بدانید: روش حرارت‌دهی بهترین روش آماده‌سازی کود مرغی است. محصول نهایی آماده‌سازی شده، کودی ارگانیک بدون هیچ افزودنی شیمیایی، دارای $pH = 7/9$ و مواد ارگانیک به میزان ۳۸ درصد و نسبت پتاسیم، فسفر و نیتروژن ۲:۲:۲ است.

برای ذخیره‌سازی و جلوگیری از پراکندگی کود در محیط چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

تحقيق
کنید



ابار کردن کود

رهاسازی کود آلوده در طبیعت با وجود مواد غذایی و رطوبت آن، علاوه بر بوی نامساعد و تجمع حشرات،

باکتری‌های کمپیلوباکتر، سالمونلا، ای‌کلای و ویروس آنفلوآنزا هستند. کود مرغی یکی از عوامل تهدیدکننده در گسترش بیماری‌های طیور در ایران است؛ بنابراین باید کود را به طور صحیح و درست در محل انبار نگهداری کود ذخیره کرد.

شرایط مساعدی را برای تکثیر و تداوم عوامل بیماری‌زا در خارج از بدن موجود مهیا می‌کند و این عوامل توسط باد، آب، پرنده‌گان و ... به سایر نقاط منتقل شده و باعث ایجاد خطر برای پرنده‌گان و انسان‌ها می‌شوند. برخی از عوامل بیماری‌زا موجود در کود شامل



انبار نگهداری و ذخیره کود

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۲	انبار کردن کود	ذخیره سازی کود بیل، لودر، نوار نقاله	۱- تهییه شرایط مناسب جهت خشک کردن و انبار کردن ۲- عدم تهییه شرایط مناسب جهت خشک کردن و انبار کردن	تعیین محل مناسب جهت ذخیره سازی کود	۳
				تعیین محل نسبتاً مناسب جهت ذخیره سازی کود	۲
				عدم تعیین محل مناسب جهت ذخیره سازی کود	۱

تحقیق
کنید

انبار نگهداری کود در چه مکانی از مرغداری باید قرار گیرد؟



اهداف فراوری کود مرغی عبارت‌اند از:

- ۱ جمع‌آوری کود تازه و مهار بو و سایر مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آن.
- ۲ فراوری بیولوژیک کود تازه جهت مهار انتقال عوامل بیماری‌زا.
- ۳ کنترل بیماری‌های مشترک انسان و حیوان.
- ۴ تولید مواد پسمانده بهداشتی برای جایگزین در محل پرورش مرغ.
- ۵ اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده.
- ۶ تولید گاز متان و استفاده از گاز تولیدی برای تولید برق.
- ۷ اصلاح خاک‌های کشاورزی و تهییه غذای سالم با استفاده از کود فراوری شده.



در خاک‌های حاصلخیز یا غنی از مواد غذایی، گیاهان شاداب و پر محصول می‌شوند.

فراوری کود مرغی

هرچه فضولات و کود تولید شده زودتر جمع‌آوری شود؛ مقدار کمتری از مواد آلی مانند پروتئین خام و دیگر مواد غذایی پرارزش تلف خواهد شد. رطوبت و حرارت زیاد مهم‌ترین عوامل در تجزیه کود هستند و هرچه رطوبت و حرارت بیشتر باشد مقدار بیشتری از ازت آلی (اسید اوریک و اوره) به ارت معدنی تبدیل می‌شود.



فعالیت کارگاهی

- (الف) روش روی هم انباشت (دیوکردن)**
- ۱ کرده و آن را به هم بزنید.
۲ پس از پایان کار وسایل را سر جای خود قرار دهید و دوش بگیرید.
- (ب) روش خشک کردن**
- خشک کردن کود ممکن است به دو روش طبیعی و یا مکانیکی صورت پذیرد.
۱ لباس کار مناسب، چکمه، ماسک و دستکش بپوشید.
۲ کودها را در روش بستر و یا در روش قفس بعد از پایان مرحله پرورش از سالن خارج کنید و در زمینی خارج از مرغداری و در فضای سرپوشیده روی هم دپو کرده و یا در گودالی سیمانی ذخیره کنید.
۳ کود دپو شده را هر چند روز یکبار باید مرتب زیر و رو

از رطوبت کود را کاهش می‌دهد (حدوداً ۳۰ درصد).

۲ در روش دیگر از کود خشک کن‌های مکانیکی برای خشک کردن کود استفاده می‌شود.

۳ از مراحل مختلف کار عکس بگیرید و گزارش خود را به مربی خود ارائه دهید.

مراحل انجام کار

۱ لباس کار مناسب، چکمه، ماسک و دستکش بپوشید.

۲ کود را در مکان مناسب و به دور از مرغداری پهنه کنید تا در برابر آفتاب خشک شود. در روش طبیعی از اشعه آفتاب استفاده می‌شود و مقدار زیادی



خشک کردن کود مرغ با سیستم خشک کن
علامت اخطار: عدم رعایت اصول ایمنی



خشک کردن کود به روش طبیعی

تجهیزات مختلفی برای خشک کردن مکانیکی کود در بازار وجود دارد که طی آن کود مرغ پس از خشک شدن تبدیل به پلت یا بلوک شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

بیشتر
بدانیم



پرسش



امروزه خشک کردن کود پس از جمع‌آوری در اغلب کشورها متداول است؟ چرا؟ مزیت‌های آن را بیان کنید.

با کاه یا پوسته برج یا ذرت علوفه‌ای استفاده کرد.
در ایران می‌توان از روش دپو کردن و یا خشک کردن طبیعی و یا مکانیکی برای آماده کردن و ذخیره کود مرغی به سهولت استفاده کرد.

ج) سیلو کردن کود مرغ

برخی از کشورها فضولات مرغ را همراه با ضایعات کشاورزی، علوفه و دیگر مواد خشبي سیلو می‌کنند. برای سیلو کردن کود مرغی می‌توان از توأم کردن آن

- ۱ لباس مناسب بپوشید (به‌ویژه ماسک و دستکش).
۲ از مکان‌هایی که فراوری و ذخیره کود دارند همراه

بازدید از مکان‌های فراوری کود

۱ گروه‌های چهار تا پنج نفره تشکیل دهید.

- هنا آموز خود بازدید به عمل آورید.
- ۵** عکس و فیلم بگیرید.
- ۶** در پایان کار، گزارشی تهیه کرده و به هنا آموز خود ارائه دهید.
- ۴** دقت کنید که آن واحد برای ذخیره و فراوری کود از چه روشی استفاده می کند.

در کشور ما ایران، برای آماده کردن و ذخیره کود مرغی از چه روش هایی بیشتر استفاده می کنند؟

پرسش



در این مورد باید نکات زیر رعایت شود:

- ۱** در هنگام کار با کود، تجهیزات ایمنی بهویژه ماسک، دستکش و چکمه فراموش نشود.
- ۲** برای جلوگیری از مشکلات زیست محیطی و عوارض ناشی از آن، امنیت زیستی را رعایت کنید.
- ۳** در حین حمل و نقل، کود نباید در محیط پخش شود زیرا باعث انتشار بیماری ها می شود.
- ۴** بعد از کار کردن دست های خود را ضد عفونی کرده و دوش بگیرید.

از کود گله هایی که دارو در آنها به منظور پیشگیری یا معالجه استفاده می شود در تغذیه دام و طیور استفاده نشود.

توجه



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها/ داوری / نمره دهی)	نمره
	فراوری کود	فراوری کود به روش خشک کردن به وسیله خشک کن ها	۱- تولید کود با کیفیت و فروش با قیمت مناسب ۲- تولید کود بی کیفیت و فروش با قیمت کم ۳- عدم فراوری کود و فروش به قیمت خیلی کم	کود خشک شده و بسته بندی شده	۳
				کود نسبتاً خشک شده بدون بسته بندی شده	۲
				کود خشک نشده و بسته بندی شده	۱

ارزشیابی شایستگی جمع‌آوری و ذخیره‌سازی کود مرغی

شرح کار:

- ۱- تخلیه دستی و مکانیزه کود
- ۲- ذخیره‌سازی کود
- ۳- فراوری کود به روش خشک کردن، تخمیر و مانند آن

استاندارد عملکرد:

جمع‌آوری کود در زمان تعیین شده و تخلیه کامل آن از سالن‌ها

شاخص‌ها:

- ۱- تخلیه کامل کود از سالن‌های پرورش مرغ
- ۲- تعیین محل مناسب ذخیره‌سازی کود طبق اصول بهداشتی
- ۳- فراوری کود طبق دستورالعمل

شرایط انجام کار:

کود، وسایل و ابزار جمع‌آوری کود

ابزار و تجهیزات:

لومزم جمع‌آوری کود - جارو - دستگاه‌های فراوری کود - لباس کار - ماسک

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	جمع کردن کود	۲	
۲	انبار کردن کود	۲	
۳	فراوری کود	۱	
	شاخصی‌های غیرفنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: به کارگیری فناوری‌های مناسب، حفظ بهداشت فردی، ذخیره کردن بهداشتی کود، جلوگیری از ورود کود و پساب حاصل از آن به محیط زیست، درستکاری	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری: ۸

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

واحد یادگیری ۹

جوجه‌ریزی در سالن پرورش مرغ

آیا تابه حالت پی برده‌اید؟

- ۱ چه نژادهایی را می‌توان برای تولید گوشت و تخم مرغ پرورش داد؟
- ۲ از چه روش‌هایی می‌توان جهت ضدغونی ماشین حمل جوجه استفاده کرد؟
- ۳ روش‌های تغذیه جوجه در هفته اول کدام است؟
- ۴ نحوه جداسازی جوجه‌های واژده از سالم به چه صورتی است؟
- ۵ استفاده از آب شکر و مولتی‌ویتامین در جوجه‌های یک‌روزه چه نقشی دارد؟
- ۶ به چه طریقی می‌توان از شناسایی آب‌خوری و دان‌خوری توسط جوجه‌ها مطمئن شد؟

هدف از این بخش بررسی انواع سویه‌های تجاری مرغ، تعیین درجه کیفیت جوجه، روش‌های ضدغونی ماشین حمل جوجه، نحوه جابه‌جایی، چیدمان و تخلیه کارتنهای جوجه در سالن پرورش، آزمون دریافت خوارک و خارج کردن و معده‌سازی جوجه‌های واژده است. جوجه یک‌روزه بسیار حساس و ظریف است و به‌آسانی تحت تأثیر عوامل نامساعد محیطی قرار می‌گیرد. با پیشرفت زنتیکی و بهبود توان تولید، جوجه‌ها حساسیت بیشتری نسبت به عوامل محیطی یافته‌اند. بنابراین مدیریت صحیح پرورش جوجه، سخت‌تر شده و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در بسیاری از موارد تنها با اصلاح برخی از روش‌ها و شیوه‌های قدیمی می‌توان عملکرد گله مرغ را به نحو قابل توجهی ارتقا داد و سود بیشتری به دست آورد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود آسایش جوجه‌های یک‌روزه را حین جابه‌جایی و تخلیه در سالن ۵۰۰۰ قطعه‌ای تأمین کنند.

نژاد چیست؟

نژاد به مجموعه حیوانات یک گونه گفته می‌شود که دارای صفات مشابهی هستند و قدرت حیات و تولید مثل دارند و نتاج آنها نیز دارای همین خصوصیات است. مانند نژاد مرغ تخم‌گذار که دارای رنگ پر، پوست، تاج، وضعیت اندام‌ها و تولید ممثل مشابه هستند.

سویه چیست؟

آمیخته‌گری چیست؟ آمیخته‌گری عبارت است از جفت‌گیری دو نژاد خالص که رابطه خویشاوندی با هم ندارند.

آیا تمام مرغ‌ها استعداد تولید گوشت را دارند؟

آیا نژادهای مختلف مرغ می‌توانند به یک میزان تخم مرغ تولید کنند؟

بهترین سویه‌های تجاری تولید کننده گوشت و تخم مرغ با توجه به شرایط کشورمان کدام هستند؟ اگر چه در گذشته نژادهای گوشتی، تخم‌گذار و دو منظوره توسعه یافته‌اند، در حال حاضر از هیچ یک از آنها به عنوان نژاد تجاری استفاده نمی‌شود، بلکه با اجرای برنامه‌های اصلاح نژادی، در تعداد محدودی از نژادها، آمیخته‌هایی حاصل می‌شود که با نام‌های تجاری به بازار عرضه می‌گردند.

در آمیخته‌گری نژادها را طوری انتخاب می‌کنند که دارای صفت مورد نظر باشند.

به شکل‌های زیر با دقت نگاه کرده و سپس مفهوم آنها را بیان کنید؟



پلیموث راک سفید



جوچه‌های گوشتی تجاری



کورنیش سفید

درباره مرغ‌های تخم‌گذار اکثر کمپانی‌ها (در حال حاضر کمتر از ۱۰ کمپانی) جهت تأمین نیاز بازار می‌گیرد که از تلاقی سویه‌های حاصل از لگهورن سفید به وجود می‌آیند. در صورتی که تخم مرغ‌های پوسته قهوه‌ای توسط مرغ‌های حاصل از تلاقی سویه‌های دو منظوره با سویه‌هایی از نژاد ردايلندرد، پلیموث راک راهراه و ساسکس تولید می‌شود.

دربرابر مرغ‌های تخم‌گذار اکثر کمپانی‌ها (در حال حاضر کمتر از ۱۰ کمپانی) جهت تأمین نیاز بازار می‌گیرد که از تلاقی سویه‌های حاصل از لگهورن سفید هر دو نوع مرغ تخم‌گذار، یعنی مرغ‌های تولید کننده تخم مرغ با پوسته سفید و قهوه‌ای را تولید می‌کنند. در برخی کشورها مانند ایالات متحده امریکا، کانادا، ژاپن و آلمان بازار تخم مرغ پوسته سفید و در فرانسه و انگلیس بازار تخم مرغ پوسته قهوه‌ای رواج دارد. تولید



ساسکس



لگهورن



پلیموت راک



ردايلندرد

عمده سویه‌های گوشتی پرورشی در ایران شامل سویه‌های آرین، راس، هوبارد، آربوراکرز، کاب و لوهمن است. هر کدام از این سویه‌ها برای دسترسی به حداکثر رشد، شرایط تغذیه‌ای و مدیریتی ویژه‌ای نیاز دارند که در دفترچه راهنمای پرورش آنها ذکر شده است.

طی ۵۰ سال گذشته شاهد پیشرفت‌های خوبی در زمینه بھبود عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار از نظر درصد تولید وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل غذایی و کیفیت پوسته تخم مرغ بوده‌ایم. هم‌اکنون در کشور ما سویه‌های مختلفی نظیر های لاین، بونز، لوهمن، ایزابراؤن، های‌سکس و غیره پرورش داده می‌شود که در حال حاضر مهم‌ترین سویه‌هایی که بیشتر مورد توجه است؛ سویه لوهمن لایت (LSL)، های‌لاین و بونز می‌باشد. عملکردهای تولیدی هر سویه براساس دفترچه راهنمای پرورش ذکر شده است.

با گفت‌وگو با مرغداران محلی بررسی کنید که چه نزادها و سویه‌هایی در منطقه وجود دارد؟

تحقیق
کنید



پژوهش
کنید


عملکرد سویه مورد نظر را با استانداردهای داده شده در دفترچه راهنمای پرورش مقایسه کرده و سپس در صورت عدم مغایرت با استانداردها، علت را بررسی کنید.

پرسش

برای دستیابی به بالاترین عملکرد سویه‌ها، یک مرغدار باید به چه مسائلی توجه کند؟



عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مرغ



گفت و گو
کنید

کیفیت جوجه چیست؟ و چه اثری بر عملکرد تولید مرغ‌های پرورشی دارد؟



ب

الف

- جوجه یک روزه مناسب و با کیفیت عالی در عملکرد درصد تلفات و حذفی آن کمتر است.
- تولیدی و اقتصادی بسیار مؤثر می‌باشد زیرا: نسبت به تغییرات محیطی مقاوم‌تر است.
- فعال‌تر است. نسبت به واکسیناسیون و استرس‌ها حساسیت کمتری دارد.
- دارای عملکرد بهتر است.

با توجه به مطالب بیان شده کدام جوجه را انتخاب می‌کنید؟ الف یا ب

پرسش



خصوصیات جوجه یک روزه با کیفیت بالا

- جوجه‌ها دارای وزن مناسب بوده و از نظر پراکندگی وزنی یکنواخت و یکدست باشند.
- جوجه‌ها از نظر بیماری‌های باکتریایی سالم باشند.
- از نظر بیماری‌های قابل انتقال از طریق ماشین جوجه‌کشی سالم باشند.
- کمبود غذایی نداشته باشند.
- دارای ایمنی مادری مناسب باشند.
- جوجه‌ها در حد امکان هم‌سن بوده از یک گله مادر تهیه گردند.

جوجه‌ها دارای خصوصیات ظاهری به شرح زیر باشند

- ۱ هوشیار، چابک و فعال باشد.
- ۲ ساق پا و پوست پا روشن و موئی شکل باشد (خشک و ترد نباشد).
- ۳ ناف جوجه‌ها به خوبی بسته شده و بدون تورم و عفونت باشد.
- ۴ تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی، کرک‌های سطح بدن بلند، پاکیزه و پف کرده و رنگ خوبی داشته باشند.
- ۵ چشم جوجه‌ها گرد و براق و عاری از هرگونه جراحت و بدشکلی باشد.
- ۶ فاقد هرگونه بدشکلی و نقص فیزیکی از قبیل فلنجی، پنجه و منقار کج و غیر عادی، پاهای خمیده و شکم خمیری و چسبناک باشند.

فعالیت کارگاهی

تهیه جوجه‌های مورد نیاز

مراحل انجام کار

- ۱ سویه تجاری مورد نظر را با توجه به شرایط سالن، بُعد مسافت و رضایتمندی پرورش‌دهندگان از عملکرد یک سویه تعیین کنید.



- ۲ مراکز معابر فروش جوجه یک روزه را تعیین کنید.
- ۳ قیمت جوجه را از مراکز معابر مختلف استعلام کنید.
- ۴ سالن را برای جوچه‌بیزی آماده کنید.
- ۵ جوچه‌های خریداری شده را بیمه کنید.
- ۶ کارت بهداشتی جوچه‌ها را هنگام تحويل گرفتن جوچه‌ها بررسی کنید.
- ۷ دقیقت داشته باشید: جوچه‌های خریداری شده حتماً دارای مادر جوان، وزن مناسب و قادر بیماری‌های قابل انتقال باشند.
- ۸ حمل و نقل بهداشتی و اصولی جوچه‌ها تا مزرعه صورت پذیرد.

سازمان‌های جهاد کشاورزی و دامپزشکی اطلاعات مطمئنی در زمینه خرید جوچه در اختیار شما قرار می‌دهند.


توجه



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۱	تهییه جوچه یک روزه	بروشورهای شرکت‌های مختلف، اینترنت وسیله حمل و نقل	۱- تهییه جوچه درجه ۱ ۲- تهییه جوچه به کیفیت نسبتاً مناسب ۳- تهییه جوچه به کیفیت پایین	جوچه سرحال و دهیدراته نشده باشد	۳
				جوچه‌ها نسبتاً سرحال و دهیدراته نشده باشد	۲
				جوچه‌هایی حال و دهیدراته باشند	۱

روش صحیح حمل کارتون جوچه



- جوچه‌ها در ساعت‌های اولیه بعد از هج ممکن است تحت تأثیر چه استرس‌هایی قرار گیرند؟
- چگونه می‌توانیم به طور صحیح کارتون جوچه‌ها را حمل کنیم؟
- راننده باید چه نکاتی را در رابطه با حمل جوچه‌ها رعایت کند؟
- نحوه چیدن کارتون‌های جوچه در روزهای گرم

و سرد چگونه باید باشد؟

نداشتن تهویه و رطوبت مناسب در کامیون‌های حمل جوجه چه مشکلاتی را زمان پرورش ایجاد خواهد کرد؟

برای حمل و نقل جوجه‌ها به سالن نکات زیر باید رعایت گردد

- ۱ یک حمل و نقل خوب، حمل و نقلی است که سریع، مناسب است.
- ۲ بین کارتون جوجه‌ها باید فضای کافی موجود باشد راحت و تحت شرایط بهداشتی باشد.
- ۳ از کامیون سالم از لحاظ فنی و مناسب با ظرفیت حمل جوجه با سیستم فنریندی عالی و مجهز به سیستم تهویه مطلوب استفاده کنید.
- ۴ قبل از بارگیری کلیه سطوح اتاق دوجداره حمل جوجه‌ها ضدغفونی شود.
- ۵ نشانگر درجه حرارت و رطوبت باید در کامیون‌ها تعییه شود. دمای اطراف ۲۲-۲۴ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۷۰-۷۵ درصد در کامیون برای حمل جوجه شوند.
- ۶ بعد از تخلیه جوجه‌ها، جعبه‌های حمل جوجه باید به سرعت از سالن مرغداری خارج گردیده و معدهوم شوند.
- ۷ کارتون جوجه باید از جنس مرغوب و محکم باشد.


توجه



- بهتر است تابستان در هر کارتون ۸۰ قطعه جوجه و در زمستان ۱۰۰ قطعه جوجه ریخته شود.
- در مسافت‌های طولانی از سبد‌های پلاستیکی به جای کارتون استفاده شود.
- در زمان بارگیری یا تخلیه جوجه‌ها از کارتون‌ها، باید موتور کامیون خاموش باشد زیرا تجمع گازهای خروجی آگزو ز سبب بروز عوارض تنفسی و حتی خفگی جوجه‌ها می‌شود. همچنین وقتی که کارتون‌ها در کامیون چیده می‌شود باید حداقل ۱۵ سانتی‌متر از دیواره‌های جانبی فاصله داشته باشد.



کارتون حمل جوجه



سبد پلاستیکی حمل جوجه

فعالیت کارگاهی

ضدغونی کردن ماشین حمل جوجه



ابزار و وسائل مورد نیاز

■ ماده پاک کننده

■ ماده ضدغونی کننده (فرمالین، پرمنگنات

یا آجر ضدغونی) ■ شلنگ آب

■ لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی (دستکش،

ماسک) ■ دماسنجد ■ رطوبت سنج

مراحل انجام کار

۱ مواد ضدغونی باید دقیقاً طبق استانداردهای کارخانه سازنده مصرف شود.

۲ هنرجویان باید به خوبی با نحوه حمل، انبار کردن، استفاده و مخلوط کردن مواد ضدغونی کننده آشنا شوند.

۳ قبل از به کار گیری هرگونه مواد ضدغونی کننده، باید تمام مواد آلی را شسته و تمیز کرد.

۴ گاری های حمل کارتون جوجه با آب فشار قوی و مواد پاک کننده شسته شود.

۵ ماشین حمل جوجه باید قبل از ضدغونی شدن، به خوبی با آب و مواد پاک کننده در هر بار حمل جوجه، شسته شود.

دقت کنید: برای گازدهی مکان های مختلف، غلظت های متفاوتی از گاز فرمالین لازم می شود. غلظت برای ضدغونی کامیون حمل جوجه، با ترکیب ۲۰۰ سی سی فرمالین با ۱۰۰ گرم پرمنگنات پتابسیم برای هر ۲/۸ متر مکعب فضا استفاده می شود.

۶ درجه حرارت اتاق کامیون در طی ضدغونی باید حدود ۲۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی آن بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باشد. ضدغونی باید ۲۰ تا ۳۵ دقیقه به طول انجامد.

پرورش جوجه



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، ماده، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۱	حمل جوجه در مزرعه	مواد ضدغونی ماشین ابزار ضدغونی	۱- ضدغونی کامل ماشین حمل جوجه ۲- ضدغونی نسبتاً کامل ماشین حمل جوجه ۳- ضدغونی ناقص ماشین حمل جوجه	بار میکروبی ماشین حمل جوجه کم باشد.	۳
۲				بار میکروبی ماشین حمل جوجه نسبتاً کم باشد.	۲
۳				بار میکروبی ماشین حمل جوجه زیاد باشد.	

اطلاعات به دست آمده از تصاویر زیر را یادداشت کنید.

..... ۴ ۳ ۲ ۱



خارج کردن جوجه‌ها از کارتون

ابزار و وسائل مورد نیاز

لباس کار ■ چکمه ■ ماسک ■ دماستج ■ رطوبت‌سنجد

مراحل انجام کار

۱ در زمان تحویل جوجه باید همه پرسنل مرغداری قرنطینه و بهداشت را رعایت کرده و لباس‌های مرتب و چکمه تمیز و عاری از آلودگی بپوشند.

۲ در ابتدا یک سوم از فضای کل سالن را مجزا و سپس در آن قسمت جوجه‌ریزی کنید.

۳ دما و رطوبت نسبی باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدن جوجه‌ها ثبیت شود. (مقادیر توصیه شده در جدول استاندارد هر سویه)

۴ پس از رسیدن ماشین حمل جوجه به مزرعه، کارتون‌های حاوی جوجه را در داخل سالن به‌طور منظم و پراکنده چیده و پس از تخلیه کامل کارتون‌ها از داخل ماشین، جوجه‌ها را به سرعت و در اسرع وقت در سطح بستر و اطراف آب‌خواری‌ها خالی کنید.

۵ کارتون‌ها را به سرعت از سالن خارج کنید و در محل مناسبی معدهوم کنید.



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۳	انتقال کارتنهای سریع و با دقت کارتن‌ها زمان از خودرو حمل و نقل به داخل سالن	۱- جابه‌جایی سریع و با دقت کارتنهای سریع و با دقت کارتنهای سریع و با سرعت و دقต کم	۱- جابه‌جایی سریع و با دقت کارتنهای سریع و با سرعت و دقت کم	کارتنهای زمان کمی در سالن تخلیه شده باشند.	۳
		۲- جابه‌جایی نسبتاً سریع و با دقت کارتنهای سریع و با سرعت و دقت کم	۲- جابه‌جایی نسبتاً سریع و با سرعت و دقت کم	کارتنهای زمان نسبتاً کمی در سالن تخلیه شده باشند.	۲
		۳- جابه‌جایی کارتنهای سرعت و دقت کم	۳- جابه‌جایی کارتنهای سرعت و دقت کم	کارتنهای زمان طولانی در سالن تخلیه شده باشند.	۱

توجه

سیستم تهویه در هنگام ورود جوجه‌ها باید خاموش باشد.

!

- ۶ جوجه‌ها طی ۶ الی ۸ ساعت ابتدایی در آرامش کامل و نور زیاد باشند تا با محیط آشنا شوند.
- ۷ کامیون حمل جوجه نباید وارد سالن پرورش شود.
- ۸ برای اطمینان از درستی تعداد جوجه‌ها، ۲ تا ۵ درصد کارتنهای را به صورت تصادفی انتخاب و شمارش کنید.

نکته مهم

!



تخلیه جوجه‌ها از کارتنهای



سوzanدن کارتنهای حمل جوجه

جلوگیری از استرس جوجه‌های یک روزه

توجه داشته باشید هنگامی که جوجه‌های یک روزه به سالن می‌رسند، به شرایط محیطی سالن بسیار حساس بوده و تأمین شرایط محیطی مناسب و تأمین آب و دان برای آنها بسیار حیاتی است. تأمین شرایط محیطی مناسب، استرس جوجه‌ها را کاهش می‌دهد که در نهایت نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت.

جوچه‌ریزی در سالن‌ها با آرامش صورت گیرد و نسبت جوجه به محیط، شرایط علمی حمل و نقل و جابه‌جایی، و سایر جنبه‌های علمی کار را نیز با دقت و وسوس و با تقوای کامل رعایت کنید.

اخلاق
حرفه‌ای



در بدو ورود جوجه‌ها به سالن برای خنثی کردن استرس‌های حمل و نقل، محرومیت از آب و واکسیناسیون می‌توان از محلول‌های مولتی ویتامین، الکتروولیت طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و آب شکر ۵ درصد یا ترکیبات تجاری که کلیه احتیاجات جوجه‌ها را در روزهای ابتدایی تأمین می‌کند، استفاده نمود.

نکته مهم



به تجربه ثابت شده است که گلوکز باعث افزایش خوراک مصرفی و افزایش وزن جوجه‌ها می‌شود. موارد زیر را در نظر داشته باشید:

- ۱ استفاده بیش از حد مجاز از شکر باعث بروز اسهال می‌شود.
- ۲ به هیچ وجه به جای شکر از ملاس استفاده نکنید.
- ۳ بهتر است به منظور کاهش استرس حمل و نقل مولتی ویتامین مصرف گردد.
- ۴ اگر گله مادر وضعیت تغذیه مطلوب داشته باشد نیازی به استفاده از مولتی ویتامین نیست.



با توجه به تصویر بالا، دلیل استفاده از رول کفی موج‌دار در زیر آب خوری را توضیح دهید؟

گفت و گو
کنید



فسفر نیز با افزایش میزان متابولیسم سبب تسريع جذب زرده و کاهش عوارض ناشی از عدم جذب کیسه زرده (مانند عفونت کیسه زرده یا بند ناف) می‌شود. پس از ۱۲ ساعت نیز می‌توان ویتامین‌های گروه B و یا مواد پروبیوتیک را به آب افزود.



پروبیوتیک چیست؟

تحقیق
کنید



فعالیت کارگاهی

- ۱ ۲ تا ۳ ساعت قبل از رسیدن جوجه‌ها دانه‌خوری‌ها بررسی شود.
- ۲ باید همه جوجه‌ها بلافصله پس از رسیدن به سالن بتوانند دان‌خورده و آب بیاشامند.
- ۳ یک ساعت قبل از رسیدن جوجه‌ها آب‌خوری‌ها را پر کنید.
- ۴ تأخیر و یا عدم دسترسی کامل به آب و دان در اولین ساعت پرورش بر وزن و عملکرد آینده جوجه‌ها تأثیر زیادی دارد.
- ۵ لازم است قبل از رسیدن جوجه‌ها چگونگی توزیع و قابلیت دسترسی به آب و دان در همه جای سالن را پر کنید.



سالن بعد از جوجه‌ریزی



سالن آماده جوجه‌ریزی

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
	تخلیه جوجه‌ها از کارتنهای با کمترین صدمات زمان و با کمترین صدمات زمان	۱- خارج کردن جوجه‌ها با حداقل زمان ۲- خارج کردن جوجه‌ها در مدت زمان نسبتاً مناسب	چوجه‌ها در زمان کمی بدون خدمات فیزیکی در سالن تخلیه شده باشند.	۳	
۴		۳- خارج کردن جوجه‌ها در مدت زمان نامناسب	چوجه‌ها در زمان نسبتاً کوتاهی با کمترین صدمات فیزیکی در سالن تخلیه شده باشند.	۲	
			چوجه‌ها در زمان طولانی با صدمات فیزیکی زیادی در سالن تخلیه شده باشند.	۱	

تفذیه جوجه‌ها در بدو ورود به سالن

چوجه‌ها تا سن ۱۲ الی ۱۴ روزگی نمی‌توانند دمای بدنشان را تنظیم کنند. در این مدت به گرمای اضافی احتیاج دارند. هدف اصلی این است که هرچه زودتر اشتها را در تحریک شده و شروع به فعالیت بکند.

یک یا دو ساعت چوجه‌ها را به حال خود رها کنید تا با محیط جدید آشنا شوند. سپس بررسی کنید که دسترسی آسان به آب و دان داشته باشند و اگر لازم باشد تغییرات لازم را در تجهیزات و دما ایجاد کنید.



استفاده از دان روی رول کفی

در ابتدا دان باید به شکل کرامبل که گرد و خاک ایجاد نمی‌کند و یا پلت خرد شده باشد و در سینی‌ها (هر سینی ۱۰۰ قطعه چوجه) و روی رول کفی ریخته شود. چوجه‌ها باید روی رول کفی قرار گیرند تا بلا فاصله دان را پیدا کنند. سیستم‌های دان‌خوری و آب‌خوری خودکار باید در مجاورت رول کفی قرار گیرند.



استفاده از دان خوری سینی و آب خوری کله قندی



استفاده از دان خوری و آب خوری خودکار

۲۴ ساعت پس از جوجه‌ریزی

با بررسی چینه‌دان جوجه‌ها، صبح روز بعد از ورود به سالن، از شناسایی آب خوری و دان خوری توسط جوجه‌ها مطمئن شوید. در این حالت، حداقل ۹۵ درصد چینه‌دان‌ها بایستی با لمس کردن نرم و پر باشد که نشان‌دهنده شناسایی صحیح محل آب خوری و دان خوری توسط جوجه‌ها می‌باشد.

پرسش

- چینه‌دان سفت می‌تواند بیانگر
- چینه‌دان متورم می‌تواند بیانگر



فعالیت‌کارگاهی

مراحل انجام کار

- ۱ لباس کار و تجهیزات ایمنی توصیه شده را فراموش نکنید.
- ۲ قطعه جوجه را به طور تصادفی انتخاب کنید.
- ۳ میزان پر بودن چینه‌دان را بررسی کنید.
- ۴ نتایج فعالیت را در نمون برگ دارای جدول زیر گزارش کنید.

بررسی چینه‌دان جوجه‌ها

ابزار و وسائل مورد نیاز

- لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی (دستکش، ماسک)
- میزان پر بودن چینه‌دان را بررسی کنید.
- جوجه نمون برگ دارای جدول مربوطه

حالی	پر و متورم فقط آب	پر و سفت فقط دان	پر و نرم آب و دان	پر بودن چینه‌دان
؟	؟	؟	۹۵ درصد	ارزیابی



بررسی چینه دان

تغذیه جوجه ها در هفته اول

برای جذب سریع کیسه زرده، تکامل دستگاه گوارش و سیستم ایمنی، ماندگاری جوجه ها، رشد مناسب عضلات و وزن گیری بهتر، باید در هفته اول، دان با کیفیت در اختیار گله قرار داده شود. تغذیه نامطلوب موجب تضعیف پاسخ سیستم ایمنی به واکسیناسیون و کاهش مقاومت جوجه ها در برابر بیماری ها می شود. در طول دوره پرورش مدیریت هفته اول از اهمیت به سازی بروخوردار است. شروع موفق پرورش می تواند تضمین کننده یک دوره موفق باشد. پس سعی کنید در هفته اول شروع خوبی داشته باشید. وضعیت تغذیه و وزن، در هفته اول مستقیماً با پایان دوره مرتبط است. بنابراین رعایت اصول تغذیه در هفته اول اهمیت بسیار زیادی دارد.

در آب، تغذیه، دما، نور و سلامتی دامها و طیور خودتنبلی و سهلانگاری نکنید چرا که آنها به عنوان مخلوقات خداوند صاحب حق اند و بخشی از غذای ما را تأمین می کنند.

اخلاق
حرفاء



تحقيق
کنید



■ رابطه تغذیه اولیه با وزن پایان دوره پرورش مرغ را ترسیم کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۱	تجهیه جوجه ها با دان کامل و مکمل های ویتامینی	۱- رشد مناسب و تقویت سیستم ایمنی جوجه ۲- رشد مناسب و تقویت سیستم ایمنی جوجه ۳- رشد کم و تضعیف سیستم ایمنی جوجه	خوارک کامل آغازین مولتی ویتامین، آب شکر	تجهیه جوجه ها با دان کامل دوره آغازین و آب حاوی مولتی ویتامین و آب شکر	۳
				تجهیه جوجه ها با دان نامتوازن دوره آغازین	۲
				تجهیه جوجه ها با دان کامل و مکمل های ویتامینی	۱

تشخیص جوجه‌های واژده

این گونه جوجه‌ها توانایی رشد ندارند و باید پس از ۴۸ ساعت از عملیات جوجه‌ریزی جوجه‌های واژده قابل شناسایی هستند؛ بنابراین شناسایی حذف شوند.

فعالیت کارگاهی

جوجه‌های ضعیف، فلچ، دارای پارگی پوست، زخمی، کور، نوک ضربدری و دارای عفونت بندناه را از سایر جوجه‌ها جدا کنید.

نکته مهم

جوجه‌ها از نظر وزن باید یکنواخت باشند. اما در گله به هر حال جوجه‌هایی با جثه کوچک‌تر نیز یافت می‌شوند که میزان آنها نباید از ۱ تا ۲ درصد کل گله تجاوز نماید.



به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید و علت حذف جوجه‌ها را بیان کنید؟



تحت هیچ شرایطی بدون استفاده از دستکش جوجه‌های واژده را لمس نکنید.

توجه



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ایزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۶	جداسازی جوجه‌های واژده	علائم جوجه‌های واژده و سایل معدوم‌سازی جوجه‌های واژده	۱- حذف کامل جوجه‌های واژده واژده از گله	دقت در جداسازی جوجه‌های واژده	۳
			۲- حذف نسبتاً کامل جوجه‌های واژده از گله	دقت نسبتاً مناسب در جداسازی جوجه‌های واژده	۲
			۳- عدم جداسازی کامل جوجه‌های واژده از گله	عدم رعایت دقต در جداسازی جوجه‌های واژده	۱

نحوه حذف جوجه‌های واژده

جوجه‌های واژده و غیرطبیعی را بعد از جوچه‌ریزی جمع آوری کرده و به روش‌های زیر دفع می‌کنیم. انتخاب روش بستگی به امکانات، فضا و شرایط موجود در هر مرغداری، مناطق مجاور آن و قوانین زیست‌محیطی آن کشور دارد.



به سه طریق جوجه‌های واژده را از بین می‌برند

- ۱ سوزانیدن در کوره لاشه‌سوز
- ۲ دفن کردن جوجه‌های واژده در چاله‌های عمیق
- ۳ تهیه کمپوست

ارتباطی بین چاه تلفات با چاه آب مزرعه و شبکه آبرسانی وجود نداشته باشد.

حمل و نقل و ریختن لاشه‌ها به داخل چاه باید به روش کاملاً بهداشتی صورت گیرد. هر روز پس از ریختن تلفات، باید مقدار کافی آب و آهک و سایر مواد ضد عفونی کننده در چاه ریخته و سپس در چاه محکم بسته شود.

هر چند روز یکبار می‌توان باریختن محلول سودسوز آور

استفاده از چاه برای دفن لاشه‌ها، روشی سنتی بوده است که از سالیان قبل در بسیاری از مرغداری‌ها رواج داشته است. برای این منظور باید در فاصله دور از سالن‌ها چاهی با عمق مناسب (نسبت به سطح آب‌های زیرزمینی) حفر گردد و در آن کاملاً غیر قابل نفوذ باشد. به طوری که حیوانات و پرندگان وحشی مختلف نتوانند به داخل آن راه یافته و آلودگی‌ها را پخش کنند. حتی باید توجه کرد که هیچ‌گونه

وقوع آتشسوزی از معایب این روش است. در آمریکا، در چند سال اخیر، لشه تلفات و بسترها کهنه را کمپوست می‌کنند. بعد از گذشت چند ماه، ترکیبی سرشار از مواد آلی برای استفاده در کشاورزی به دست خواهد آمد.

در داخل چاه، روند متلاشی شدن لشه‌ها را تسريع کرد. سوزاندن لشه‌ها نیز روش دیگری است که با استفاده از کوره صورت می‌گیرد. باید لشه‌ها به طور کامل سوزانده شده، موقعیت کوره در جهت وزش باد و به طرف سالن‌ها نباشد. ایجاد بوی نامطبوع و احتمال



تهیه کمپوست



دفن کردن در چاههای عمیق



کوره لشه‌سوز

ارزشیابی شایستگی جوجه‌ریزی در سالن پرورش مرغ

شرح کار:

- ۱- انتخاب و خرید جوجه یک روزه
- ۲- ضدغونی ماشین حمل جوجه یک روزه
- ۳- انتقال کارتنهای جوجه یک روزه به داخل سالن پرورش
- ۴- تخلیه سریع جوجه‌ها از کارتنهای به داخل سالن پرورش
- ۵- تغذیه جوجه‌ها
- ۶- جداسازی جوجه‌های واژده

استاندارد عملکرد:

حفظ آسایش جوجه یک روزه حین جابه‌جایی و تخلیه در سالن

شاخص‌ها:

- ۱- تهیه جوجه یک روزه با کیفیت و قیمت مناسب
- ۲- ماشین حمل ضدغونی شده
- ۳- چیدمان مناسب کارتنهای حاوی جوجه در سالن پرورش
- ۴- پراکندگی مناسب جوجه‌ها در سالن پرورش
- ۵- مشاهده جوجه‌های در حال تغذیه
- ۶- تفکیک جوجه‌های واژده از سالم

شرایط انجام کار:

جوجه یک روزه، کارتنهای حمل جوجه، ماشین حمل جوجه مواد ضدغونی کننده، محلول پاش خوارک کامل جوجه

ابزار و تجهیزات:

شکر - مولتی ویتامین - خوارک آغازین - دستورالعمل‌های کارخانه جوجه‌کشی، دستگاه محلول پاش، ماشین حمل جوجه، کارتنهای حمل جوجه، مواد ضدغونی کننده

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تهیه جوجه یک روزه	۱	
۲	ضدغونی ماشین حمل جوجه در مزرعه	۱	
۳	انتقال کارتنهای به داخل سالن پرورش	۲	
۴	تخلیه جوجه‌ها از کارتنهای	۱	
۵	تغذیه اولیه جوجه‌ها	۲	
۶	جداسازی جوجه‌های واژده	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
آموش دیگران، تصمیم‌گیری، حفظ ایمنی فرد، حفظ آسایش جوجه‌ها، دفع مناسب پسماندها، معدهوم‌سازی کارتنهای حمل جوجه، معدهوم‌سازی جوجه‌های واژده، اهمیت دادن به ابزار و وسائل.			
میانگین نمرات			
*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۴

تغذیه مرغ



در طول سالیان متوالی استفاده از روش‌های ژنتیک و اصلاح نژاد منجر به تولید مرغ‌هایی شده است که از نظر تولید گوشت و تخم مرغ می‌توانند بخش مهمی از نیازهای غذایی انسان را تأمین کنند. دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی نیازمند فراهم کردن تمامی احتیاجات مرغ به ویژه نیازهای تغذیه‌ای آنها می‌باشد. به‌طوری که علاوه بر اینکه خوراک یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده عملکرد گله‌های پرورش مرغ می‌باشد، بخش عمده‌ای از هزینه تولید حدود ۷۰ تا ۶۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهد. خوراک باید طوری تنظیم شود که بتواند مقادیر متناسبی از انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه، موادمعدنی، ویتامین‌ها و اسیدهای چرب ضروری را تأمین کند؛ تا بدین وسیله پرنده فرصت حداکثر رشد و عملکرد را داشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت آن لازم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش‌های جدید تهیه و توزیع خوراک به عنوان یک مسئله مهم و جدی مدنظر پرورش دهنگان قرار گیرد.

واحد یادگیری ۱۰

تهیه خوراک

آیاتا به حال پی برده اید؟

- ۱ از چه اقلام خوراکی می‌توان در جیره مرغ استفاده کرد؟
- ۲ انبار مناسب برای نگهداری خوراک مرغ باید دارای چه شرایطی باشد؟
- ۳ چه آفاتی می‌توانند باعث کاهش کیفیت خوراک موجود در انبار نگهداری شوند؟
- ۴ چه روش‌هایی برای مبارزه با آفات انباری می‌توان استفاده کرد؟
- ۵ چه اطلاعاتی را باید در فرم‌های مورد نیاز برای اداره انبار مرغداری در نظر گرفت؟


هدف از این بخش بررسی دسته‌بندی مواد خوراکی مورد استفاده در جیره غذایی مرغ، شرایط انبار برای نگهداری خوراک مرغ، روش‌های مبارزه با آفات انباری و چگونگی ثبت اطلاعات در فرم‌های مربوط است. پس از خروج جوجه از تخم مرغ تغذیه تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد گله در پایان دوره پرورش دارد. به عبارتی اگر شروع پرورش گله با تغذیه و مدیریت مناسب و صحیح همراه باشد نه تنها گله‌ای یکنواخت از نظر وزنی تولید می‌شود؛ عملکرد آن از نظر ضریب تبدیل غذایی و میزان تلفات بهینه خواهد شد. از نظر اقتصادی ۶۰-۷۰ درصد مخارج روزمره واحدهای پرورش مرغ را هزینه‌های مربوط به تغذیه تشکیل می‌دهد. به علاوه مرغ‌ها هنگامی می‌توانند فعالیت فیزیولوژی خود را به طور مناسب انجام دهند و سالم باشند که به نحو مطلوب تغذیه شوند. بنابراین تغذیه صحیح، چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سلامتی طیور نقش اساسی را در پرورش مرغ، ایفا می‌کند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود برای یک مرغداری به ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه با توجه به دستورالعمل جیره‌نویس خوراک تهیه کنند.

مواد مغذی چیست؟

مواد مغذی به موادی گفته می‌شود که در خوراک‌ها برای تأمین احتیاجات نگهداری، رشد و نرمیم بافت‌های بدن، تولید مثل، تولیدات دامی و سلامتی دام استفاده می‌شود. مهم‌ترین مواد مغذی موجود در بافت‌های گیاهی و جانوری به قرار زیر است:



نمودار مواد مغذی تشکیل‌دهنده مواد خوراکی

مغذی، می‌توان آنها را جایگزین کرد. براساس نوع و شیوه پرورش طیور از نظر گوشتی و یا تخم‌گذار بودن ماده مغذی، ممکن است تنها یک عنصر باشد، مثل آهن، مس و یا مولکولی بزرگ و پیچیده مثل نشاسته یا پروتئین که خود شامل اجزای مختلفی است. تعداد زیادی ماده مغذی مختلف در خوراک‌های دام و طیور تعیین می‌زمان هر ماده غذایی در جیره مرغ باید به این نکات توجه داشت که:

- ۱ ماده غذایی اقتصادی و بهداشتی باشد.
- ۲ تمام نیازهای لازم را تأمین کند.

هر کدام از مواد مغذی فوق، جزئی از خوراک را تشکیل می‌دهند که برای تداوم حیات حیوان ضروری است. ماده مغذی، ممکن است تنها یک عنصر باشد، مثل آهن، مس و یا مولکولی بزرگ و پیچیده مثل نشاسته یا پروتئین که خود شامل اجزای مختلفی است. تعداد زیادی ماده مغذی مختلف در خوراک‌های دام و طیور شناسایی شده‌اند که بعضی به تنها یی برای متابولیسم عادی بدن، رشد و تولید مثل مورد نیاز بوده و برخی دیگر ضروری نیستند؛ یعنی به وسیله سایر مواد

خوراک چیست؟

ماده‌ای است که پس از خورده شدن توسط حیوان، قابل هضم، جذب و قابل استفاده باشد، مانند گندم، سویا، ذرت.



گندم



کنجاله سویا



ذرت

جیره غذایی چیست؟

مجموعه‌ای از مواد خوراکی که تأمین کننده تمام نیازهای مواد مغذی بدن موجود زنده باشد را جیره غذایی می‌گویند.



نمونه‌ای از جیره مرغ



ضریب تبدیل غذایی چیست؟

تحقیق
کنید



تقسیم‌بندی مواد مغذی

آب

میزان مصرف آب توسط طیور در حدود دو تا هفت برابر میزان غذایی است که مصرف می‌کنند و بسته به سن، وزن، عوامل تغذیه‌ای، تولید، رطوبت و دمای محیط متغیر است. مثلاً در مواقعی که درجه حرارت محیط خیلی زیاد باشد میزان نیاز طیور برای ثابت نگهداشتن درجه حرارت داخلی بدن بیش از این مقدار خواهد بود.

انتقال آب در بدن به خاطر انتقال مواد غذایی، شرکت در واکنش‌های شیمیایی، دفع مواد زائد و کمک به حفظ درجه حرارت بدن است. بیش از ۷۰ درصد بدن پرنده‌گان را آب تشکیل می‌دهد؛ بنابراین طیور برای حفظ آن باید به میزان آب کافی دستررسی داشته باشد.

فعالیت کارگاهی

تعیین درصد رطوبت ماده خشک خوراک‌های مورد استفاده در تغذیه مرغ

توزیں، آن را در خشک کن یا آون قرار دهید.
مدت زمان لازم برای انجام این آزمایش بستگی به درجه حرارت دستگاه دارد. چنانچه حرارت آون بین ۱۰۵ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد باشد مدت لازم برای انجام آزمایش ۸ ساعت است و مدت زمان حرارت به ثابت ماندن وزن نمونه بستگی دارد.

۱ بعد از گذشت زمان کافی (حدود ۸ ساعت) دستگاه را خاموش کنید.
۲ نمونه را به دستگاه دسیکاتور منتقل کنید تا نمونه خنک شود.

۳ ظرف حاوی نمونه خشک را بار دیگر وزن کنید.
۴ اختلاف وزن اولیه و وزن ماده خشک شده، وزن آب نمونه را نشان می‌دهد.

۵ در پایان کار، ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.

ابزار و وسایل مورد نیاز

مواد خوراکی

ترمازوی دیجیتال با دقیقیت ۰/۱ گرم بوته چینی آون لباس کار دسیکاتور گیره

مراحل انجام کار

(الف) نمونه‌هایی از چند ماده خوراکی موجود در هنرستان محل تحصیل خود را تهیه کرده و با استفاده از آن، مقدار رطوبت و ماده خشک آنها را تعیین کنید.

(ب) اعداد به دست آمده را با جدول استاندارد مشخصات مواد خوراکی (NRC) مقایسه کنید.

روش کار

۱ ظرف نمونه را وزن کنید.
۲ مقدار معینی از نمونه را در ظرف ریخته و بعد از



دسیکاتور

آون

بوته چینی

کربوهیدرات‌ها

حدود ۷۵ درصد وزن ماده خشک اکثر مواد دانه‌ای را کربوهیدرات‌ها تشکیل می‌دهند. این دسته از مواد مغذی، منبع اصلی تأمین انرژی در خوراک طیور هستند و انرژی تولید شده توسط آنها برای نگهداری و بقای طیور، رشد و نمو، ساخت بافت‌های متعدد، تولید گوشت و تخمر مرغ و همچنین انجام کار، استفاده

منابع کربوهیدرات‌ها در تغذیه مرغ عبارت اند از: گندم، جو، ذرت، برنج، ارزن، سبوس گندم و سبوس برنج.

می‌شود، بیشتر انرژی کربوهیدرات‌ها بلافصله بعد از جذب استفاده نمی‌شود؛ بلکه بعد از تبدیل شدن به گلیکوزن یا چربی در بدن مرغ ذخیره شده تا هنگام لزوم تجزیه و سپس به مصرف برسد. تمامی کربوهیدرات‌ها حاوی عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند که در بیشتر ترکیبات آنها نسبت هیدروژن و اکسیژن، شبیه نسبت این دو عنصر در مولکول آب است (H_2O).

فعالیت کارگاهی

شناسایی مواد خوراکی: از انبار مواد خوراکی مرغداری بازدید کرده و منابع تأمین کننده کربوهیدرات‌ها را مشخص کنید و سپس ترتیب اهمیت هر یک را در جیره مرغ شرح دهید.

لیپیدها

در بافت‌های گیاهی و حیوانی نوعی از ترکیبات آلی وجود دارد که لیپید نامیده می‌شود. این ترکیبات در آب نامحلول، اما در بعضی از حلال‌های آلی (مانند کلروفرم، اتر) محلول هستند. چربی‌ها از مهم‌ترین لیپیدهای موجود در بدن حیوانات و خوراک هستند. اما لیپیدهای دیگر به غیر از چربی‌ها در این گروه وجود دارند که نقش کلیدی در تغذیه و فیزیولوژی دارند. چربی‌ها نیز شبیه کربوهیدرات‌ها در ساختمان خود دارای کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند ولی مقدار کربن و هیدروژن آنها بیشتر است. لیپیدها جزئی از مواد تشکیل دهنده سلول هستند که به طور عمده در ساختمان غشاء سلول‌ها، نقش دارند. لیپیدها در بدن مرغ از نظر تولید انرژی و جذب ویتامین‌های محلول در چربی دارای اهمیت هستند.

از روغن‌های گیاهی می‌توان از روغن ذرت، روغن سویا و روغن آفتاب‌گردان و از چربی‌های حیوانی دنبه، پیه و چربی‌های داخل شکم نام برد.

حداکثر مصرف چربی‌ها در جیره غذایی جوجه‌های گوشته بین ۱۰ - ۵ درصد کل جیره است.

توجه



فعالیت کارگاهی

شناسایی مواد خوراکی دارای چربی: تعدادی از مواد خوراکی دارای چربی را جمع‌آوری کرده و مشخصات ظاهری آنها را بررسی کنید.



روغن ذرت



روغن دنبه



روغن آفتاب‌گردان

پروتئین‌ها

پروتئین‌ها بخش پیچیده‌ای از مواد مغذی هستند که از واحدهای کوچک‌تری به نام اسیدآمینه تشکیل شده‌اند. اسیدآمینه در بدن به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم می‌شوند. اسیدآمینه‌های ضروری باید از طریق غذا تأمین شوند. پروتئین‌ها در بافت‌های ساختاری، خون، آنزیم‌ها و هورمون‌ها یافت می‌شوند. ۲۲ اسیدآمینه وجود دارد که به طور معمول در اجزای سازندهٔ غذا یافت می‌شوند. از این میان فقط ۱۰ اسیدآمینه ضروری هستند و باید در جیرهٔ غذایی وجود داشته باشند. دو اسیدآمینه لیزین و متیونین نقش مهمی در تغذیه مرغ به عهده دارند.

منبع اصلی تأمین پروتئین برای مرغ از طریق پروتئین‌های گیاهی و حیوانی است. میزان پروتئین حیوانی در جیرهٔ غذایی جوجه‌های گوشتی باید حدود ۲۵ درصد کل پروتئین جیره باشد. از منابع پروتئینی می‌توان به پودر ماهی، پودر گوشت، پودر خون و پودر سویا اشاره کرد.

جیره‌های غذایی فقیر از نظر پروتئین و یا سایر مواد مغذی ضروری موجب کاهش سرعت رشد و به خطر افتادن سلامت جوجه‌ها می‌شوند.

فعالیت کارگاهی

تشخیص منابع تأمین پروتئینی: از انبار مواد خوراکی مرغداری واحد آموزشی خود بازدید نموده و منابع پروتئینی گیاهی و حیوانی را شناسایی کنید.

مواد معدنی

مواد معدنی با توجه به اهمیتی که در تغذیه مرغ دارند به دو دستهٔ عناصر پرنیاز و عناصر کم‌نیاز تقسیم می‌شوند:

کمبود مواد معدنی در بدن، موجب بیماری‌های استخوانی، کندی رشد و بسیاری از بیماری‌های دیگر می‌گردد.

- ۱ عناصر پرنیاز: کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلر، گوگرد، منیزیم.
- ۲ عناصر کم‌نیاز: آهن، مس، کبالت، ید، منگنز، روی، سلنیوم، فلورور، مولیبدن. مواد معدنی برای لخته‌شدن خون، فعال کردن آنزیم‌ها، متابولسیم انرژی، تنظیم فشار اسمزی، تعادل اسیدی و بازی بدن و برای عملکرد صحیح عضلات در بدن لازم است.

ویتامین‌ها

ویتامین‌های مورد نیاز بدن مرغ به دو دستهٔ ویتامین‌های محلول در چربی (A, D, E, K) و محلول در آب (گروه B و C) تقسیم می‌شوند.

در طیور ویتامین C در بدن ساخته می‌شود؛ بنابراین هیچ نیازی به وجود این ویتامین در جیرهٔ مرغ نیست.

توجه



جدول علائم ناشی از کمبود ویتامین‌ها در طیور

کمبود ویتامین‌ها	علائم کمبود
ویتامین A	شب‌کوری، کاهش تولید تخمرگ و کاهش جوجه‌درآوری
ویتامین D	نرمی استخوان، انحنا در پاها، تأخیر در رشد، کاهش کیفیت تخمرگ
ویتامین E	کاهش رشد، خونریزی سلول‌های مغزی، کاهش تولید تخمرگ و مرگ و میر جوجه‌ها
ویتامین K	کم خونی، تأخیر در لخته‌شدن خون
ویتامین تیامین (B ₁)	کاهش اشتها، لاغری و از کار افتادن دستگاه عصبی
ویتامین ریبوفلاوین (B ₂)	فلجی پنجه پا، کاهش جوجه‌درآوری و نارسایی در تخمرگ
ویتامین نیاسین (B ₃)	عوارض استخوانی و غیرطبیعی بودن پر
ویتامین پانتوتنیک اسید (B ₅)	کاهش رشد، کم خونی و ضعیف شدن استخوان‌ها
ویتامین پیردوکسین (B ₆)	کاهش جوجه‌درآوری و کاهش تولید تخمرگ
ویتامین اسید فولیک (B ₉)	کم خونی، فلجی گردن و کاهش جوجه‌درآوری
ویتامین کوبالامین (B ₁₂)	پردرآوری ضعیف، ضایعات کلیوی، کم خونی و کاهش اشتها

فعالیت کارگاهی

شناسایی مواد خوراکی دارای ویتامین‌های محلول در چربی و آب: در انبار مرغداری کیسه‌هایی از مواد خوراکی به نام مکمل‌ها موجود است. با مراجعه به انبار مواد خوراکی و مشاهده دقیق آنها، گزارشی تهیه و در کلاس ارائه دهید.

اشکال مختلف دان مرغ

اغلب جیره‌های مرغ به سه شکل آردی (مش)، کرامبل و حبه (پلت) مصرف می‌شوند.
شکل آردی (مش): باید ابتدا مواد اولیه غذای جیره مرغ را که به صورت دانه‌های درشت هستند، آسیاب کنید تا کاملاً آردی شوند. مرغ علاقه‌ای به جیره‌هایی که از ذرات بسیار ریز تشکیل شده باشد ندارند؛ زیرا این گونه مواد چسبناک هستند. در شکل آردی میزان مصرف غذای مرغ افزایش می‌یابد.
 در اینجا توجه شما را به این نکته جلب می‌کنیم، که اندازه ذرات جیره آردی در مصرف آب آشامیدنی مؤثر است؛ هرچه ترکیب جیره آردی درشت‌تر باشد، میزان مصرف آب آشامیدنی کمتر می‌شود.



فرم آردی (مش) خوراک

شکل می‌گیرد. با مصرف غذای پلت، مرغ قدرت انتخاب قسمت‌های مشخصی از جیره غذایی را از دست می‌دهند و باید غذا را به‌طور کامل مصرف کنند.

شکل حبه (پلت): مواد خوراکی به‌وسیله آسیاب ابتدا آرد و سپس با هم مخلوط می‌شود و با کمک بخار آب داغ مروطوب شده و با فشار از دستگاه پلت‌زن عبور کرده، مجدداً سرد می‌شود و درنهایت به صورت استوانه‌های کوچک در اندازه‌های مختلف



شکل حبه (پلت) خوراک



شکل کرامبل: حد وسط غذای آردی و پلت است. اگر پلت‌های درشت به وسیله غلتک‌های مخصوص خُرد شوند محصولی بین دان آردی و پلت حاصل می‌شود که به آن کرامبل گفته می‌شود. معمولاً کرامبل را می‌توان از یک‌روزگی در تغذیه طیور استفاده کرد.

شکل کرامبل خوراک



استفاده از کرامبل در تغذیه باعث افزایش زمان مصرف دان توسط جوجه‌های جوان می‌شود و از بروز عارضه کانیبالیسم (همدیگرخواری) جلوگیری خواهد کرد.

اقلام مورد استفاده در جیره مرغ

هستند. بعد از غلات، این مواد بخش بزرگ جیره را تشکیل می‌دهند.

۱ پروتئین حیوانی: این گروه شامل پودر گوشت، پودر استخوان، پودر ماهی، مازاد کشتارگاه طیور و موادی از این قبیل است.

۲ ضایعات کارخانه آردسازی: این مواد ضایعاتی هستند که هنگام آسیاب شدن گندم، برنج، ذرت و دیگر غلات به دست می‌آید.

۳ گیاهان سبز: شامل گیاهان سبز خشک شده از قبیل پودر یونجه خشک شده و ... هستند.

۴ مکمل‌های اسیدآمینه: اغلب مخلوط‌های حاصل از ترکیب مواد اولیه غذایی طبیعی از نظر یک یا چند اسیدآمینه کمبود دارند. این کمبود را معمولاً با افزودن مکمل‌های اسیدآمینه به جیره برطرف می‌کنند.

۵ مکمل ویتمانی: مکمل‌های ویتمانی به صورت کنسانتره در جیره استفاده می‌شوند.

۶ مکمل مواد معدنی: ممکن است مخلوط‌های حاصل از ترکیب مواد اولیه غذایی طبیعی از نظر یک یا چند ماده معدنی کمبود داشته باشند. این کمبود را معمولاً با افزودن مکمل‌های معدنی به جیره برطرف می‌کنند.

۷ آنتی‌اکسیدان‌ها: به منظور جلوگیری از تخریب و از بین رفتن مواد غذایی، آنتی‌اکسیدان‌ها را به ترکیب جیره می‌افزایند.

در ادامه با برخی از مواد خوراکی رایج در تغذیه مرغ، میزان مصرف و محدودیت آنها آشنا خواهید شد.

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که اقلام مورد استفاده در غذای جوجه‌ها شامل چه موادی هستند. آیا میزان مصرف آنها را در کل دوره می‌دانید؟ چگونه می‌توان ماده خوراکی با کیفیت برای جیره مرغ تهیه کرد؟

به منظور تأمین نیازهای غذایی مرغ در ترکیب هر جیره، مواد غذایی مختلفی استفاده می‌شود. پس از انتخاب مواد اولیه، این مواد باید طبق فرمول و به نسبتی که تعیین گردیده است، با هم مخلوط شوند.

امروزه از تعداد کمی مواد خوراکی در جیره استفاده می‌شود. از قدیم ذرت و کنجاله سویا مواد خوراکی اصلی جیره طیور محسوب می‌شده است و با هم حدود ۷۰-۸۰ درصد جیره را تشکیل می‌دهند. گندم و محصولات فرعی آن نظیر سبوس گندم به همراه تریتیکاله، دیگر غلات اصلی جیره هستند و اغلب جیره‌ها حاوی مکمل چربی با منشأ حیوانی یا گیاهی می‌باشند. استفاده از سایر مواد خوراکی در جیره بسته به میزان دسترسی به آنها در هر منطقه متفاوت است.

اجزای اساسی جیره مرغ

۱ کربوهیدرات‌ها: غلات (ذرت، گندم، جو و ...) و برخی مواد دیگر غنی از کربوهیدرات‌ها از این جمله‌اند. منابع کربوهیدرات‌ها بزرگ‌ترین بخش جیره را تشکیل می‌دهند.

۲ چربی‌ها: معمولاً در جیره‌هایی که بخواهند غنی از انرژی باشند از چربی‌ها استفاده می‌کنند.

۳ پروتئین گیاهی: شامل کنجاله‌های حاصل از سویا، تخم پنبه، بادام‌زمینی و موادی از این قبیل

الف) منابع تأمین کننده انرژی در چیره‌های مرغ



شودت

تخم مرغ لازم می‌باشد. اگر از ذرت به مقدار زیاد و برای مدت طولانی در جیره استفاده شود، به دلیل گازهای فضایی، ممکن است برونشیتی را بروز کند.



گلوتن ذرت

منبع عالی کاروتن و گرانتوفیل (رنگ دانه طبیعی) می‌تواند در رنگ گوشت طیور و زردّه تخم مرغ مؤثر باشد.
گلوبتین ذرت از نظر اسددهای آمنه متبونن و سستین غنی است.



ذیت خوشباد

محدودیت مصرف مایلو در جیره طیور، به دلیل وجود تانن است که قابلیت هضم پروتئین را کاهش می‌دهد.

توجه





گندم

گندم: گندم یکی دیگر از غلات است که تقریباً ۳۱۰۰ کیلوکالری انرژی و ۱۲ درصد پروتئین دارد. در گندمهای سخت پروتئین بیشتری به همراه نشاسته وجود دارد و اصولاً ارزش غذایی گندم به نرمی و سختی آن بستگی دارد. گندم حاوی پروتئین بیشتری نسبت به ذرت می‌باشد و انرژی آن هم اندکی از ذرت کمتر است، اما استفاده بیش از ۳۰ درصد آن بدون آنژیم مناسب در جیره، مشکلاتی را برای پرندگان جوان به وجود می‌آورد.

گندمهای آسیاب شده به صورت خیلی نرم باعث چسبندگی نوک جوجه‌های جوان می‌شود. پروتئین‌های گندم خاصیت چسبندگی دارند؛ بنابراین به نوک و مقعد پرندگه می‌چسبند. چسبندگی شدید نوک سبب کاهش مصرف خوراک، افزایش مقدار خوراک در آب خوری‌ها و فراهم شدن محیط مناسب در دهان برای رشد باکتری‌ها و فارچه‌ها می‌شود که این مشکل با آسیاب کردن درشت دانه‌های گندم برطرف می‌شود.



جو

جو: جو دانه‌ای پرانرژی و میزان پروتئین آن در حد متوسط است. بتاگلوكان‌ها عامل محدود کننده تغذیه جو هستند که باعث چسبندگی مدفعه در طیور و مرطوب شدن بستر می‌گردند، بنابراین در هنگام استفاده از آن باید آنژیم بتاگلوكاناز را به جیره افزود.



سبوس گندم

سبوس گندم: این فرآورده محصول فرعی تولید آرد گندم است. میزان فسفر و منیزیوم آن بالا؛ اما حاوی مقدار کمی کلسیم است. منبع فقیری از انرژی در تغذیه طیور است و مقدار پروتئین آن ۱۵/۷ درصد است. در طیور به سبب محدود بودن قابلیت جذب مواد فیبری موجود در آن باید به میزان محدودی استفاده شود. جیره‌های حاوی سبوس زیاد به رطوبت فضولات می‌افزاید.

■ نقش چربی در تعزیه مرغ چیست؟

■ چرا مرغداران به جیره مرغ چربی اضافه می‌کنند؟

■ افزودن چربی به جیره مرغ چه مزایایی دارد؟

چربی‌ها و روغن‌های گیاهی: چربی‌ها و روغن‌ها در جیره غذایی مرغ، ضمن تأمین انرژی خوراک، در بهبود ترکیب اجزای لاشه مرغ، نقش مؤثری دارند. از چربی‌های سفت حیوانی، پیه گاو و دنبه قابل ذکرند و از روغن‌های گیاهی از روغن سویا، روغن ذرت و سایر روغن‌هایی که از دانه‌های روغنی به دست می‌آیند می‌توان استفاده کرد. اگر از چربی در جیره مرغ استفاده می‌شود افزودن آنتی اکسیدان‌ها در جیره ضروری است و باید در مدت کوتاهی جیره را به مصرف رساند.

- افزایش خوش خوراکی جیره
- افزایش قابلیت هضم خوراک
- افزایش جذب ویتامین‌های محلول در چربی



روغن پیه

- برخی از مزایای افزودن روغن به خوراک مرغ:
- افزایش رشد
- کاهش مصرف خوراک
- کاهش گرد و غبار حاصل از خوراک



روغن سویا

تریتیکاله یکی از انواع غلات است، خصوصیات آن را برای استفاده در تغذیه مرغ بررسی کرده و در کلاس درس گزارش کنید.

تحقیق
کنید

ب) منابع تأمین کننده پروتئین در جیره‌های مرغ



کنجاله سویا

کنجاله سویا: کنجاله سویا، پس از عملیات روغن‌گیری از دانه سویا، در کارخانه‌های روغن‌کشی به دست می‌آید. دارای ۲۵۵۰ کیلوکالری انرژی و ۴۴ تا ۴۸ درصد پروتئین است. کنجاله سویا از بهترین و متدائل ترین موادی است که برای تأمین پروتئین خوراک استفاده می‌شود. حداکثر مصرف آن در جیره طیور ۳۰ درصد است.

توجه

در زمان استفاده از ذرت به همراه سویا، متیونین اولین و لیزین، دومین اسید آمینه محدود کننده است.





کنجاله تخم پنبه

کنجاله تخم پنبه: از کنجاله تخم پنبه به علت داشتن ماده سمی گوسپیپول در جیره مرغ به طور محدود استفاده می شود؛ زیرا در سفیده و زرده تخم مرغ ایجاد رنگ می کند. به هنگام استفاده از کنجاله تخم پنبه در جیره، رنگ زرده به صورت لکه های سبز تا سیاه، بسته به مدت زمان انبارداری تغییر خواهد کرد. میزان مصرف آن براساس مقدار گوسپیپول موجود در آن تعیین می شود و حداکثر مصرف آن در جیره طیور ۱۰ درصد است.

هنگام استفاده از تخم پنبه در جیره مرغ از سولفات آهن به نسبت ۱ به ۱ استفاده کنید؛ زیرا ترکیبات آهن دار با گوسپیپول ترکیب می شوند و آن را از دسترنس دستگاه گوارش مرغ خارج می سازند.

توجه



کنجاله آفتاب گردان

کنجاله آفتاب گردان: فراوردهی باقیمانده از روغن کشی دانه آفتاب گردان، کنجاله آفتاب گردان است. کنجاله آفتاب گردان یکی دیگر از موادی است که برای تأمین پروتئین جیره از آن استفاده می شود. میزان انرژی آن ۱۹۰۰ و پروتئین آن از ۴۰ تا ۴۵ درصد متغیر است. کمبود اسید آمینه لیزین مهم ترین عامل محدود کننده در تغذیه آن به شمار می رود. کنجاله

آفتاب گردان دارای مقدار زیادی پکتین است و در هنگام استفاده حتماً باید یک مولتی آنژیم حاوی پکتیناز به آن اضافه شود. بدون آنژیم می توان مقدار کمی از آن را در جیره جایگزین کنجاله سویا کرد. مثلاً به جای ۲۰ درصد کنجاله سویایی که در جیره آغازین موجود است، ۱۵ درصد کنجاله سویا و ۵ درصد کنجاله آفتاب گردان فرار دهیم. به طور خلاصه می توان در جیره آغازین تا ۲۵ درصد و در جیره پایانی تا ۴۰ درصد کنجاله سویای موجود را با کنجاله آفتاب گردان جایگزین کرد.

پودر گوشت: پودر گوشت یکی از محصولات کشتارگاهی است و در حدود ۵۵ درصد پروتئین خام دارد. میزان متیونین، سیستئین و تریپتوفان آن کم و لیزین بالاست. میزان انرژی پودر گوشت به میزان چربی موجود در آن بستگی دارد. وجود یک آنتی اکسیدان در پودر گوشت برای جلوگیری از فساد آن اهمیت دارد. میزان مصرف پودر گوشت به طور متوسط ۵ تا ۷ درصد و حداکثر ۱۰ درصد است.



پودر گوشت



پودر ماهی

پودر ماهی: پودر ماهی داخلی حدود ۶۰ درصد پروتئین دارد. ترکیب اسیدآمینه‌ها و قابلیت هضم آنها بسیار بالا است. به خاطر بو و مزه‌ای که در گوشت و تخمر مرغ ایجاد می‌کند مصرف آن با محدودیت همراه است و حداکثر ۵ درصد در جیره استفاده می‌شود. در جیره جوجه‌های گوشتی این میزان در آخر دوره باید به حداقل برسد. پودر ماهی هم مانند پودر گوشت باید حاوی آنتیاکسیدان باشد.

توجه



پودر ماهی ممکن است موجب ساییدگی سنگدان شود. زمانی که این جراحات مشاهده شد باید بلافضلله مواد پروتئینی با منشأ حیوانی قطع شده و اندازه دانه‌های خوراک مقداری درشت‌تر گردد تا سنگدان به حالت عادی درآید.



پودر خون

پودر خون: پودر خون از خونی که خشک شده باشد و به آن هیچ‌گونه مواد دیگری اضافه نشده باشد، به دست می‌آید. پودر خون از نظر پروتئین بسیار غنی است و منبع بسیار خوب لیزین به شمار می‌رود. استفاده از آن به میزان ۱۰ درصد جیره غذایی باعث اسهال می‌شود. پودر خون حاوی ۸۰ درصد پروتئین و ۱۰ درصد رطوبت است.



ضایعات کشتارگاهی طیور

ضایعات کشتارگاه‌های طیور: این مواد شامل سر، پاهای روده، چینه‌دان و سایر قسمت‌های حذفی است که پس از تهیه (به روش خشک یا مرطوب) از آن در تغذیه مرغ استفاده می‌کنند و این مواد پس از تهیه نباید بیش از ۱۶ درصد مواد معنی داشته باشند. درصد پروتئین آن حدود ۵۰ درصد است.

ج) منابع تأمین مواد معدنی



پودر استخوان

پودر استخوان: غذای دیگری که از کشتارگاه‌ها به دست می‌آید پودر استخوان است که از پختن در شرایط تحت فشار سپس خشکاندن و آسیاب کردن استخوان‌ها به دست می‌آید و بیشتر به عنوان مکمل کلسیم و فسفر استفاده می‌شود. پودر استخوان، به ترتیب دارای ۲۶ و ۱۳ درصد کلسیم و فسفر است.



پودر صدف

پودر صدف: پودر صدف یکی از فراورده‌های حاصل از موجودات دریایی و منبع بسیار خوب کلسیم است. پودر صدف برای جوجه‌های گوشتی و طیور تخم‌گذار بسیار مفید است. در گله‌های تخم‌گذار چون میزان احتیاج حیوان به کلسیم زیاد است، علاوه‌بر افزودن پودر صدف به جیرهٔ غذایی، مقداری نیز به صورت آزاد به مرغ‌ها داده می‌شود. مقدار کلسیم پوسته صدف ۳۸ درصد است.



سنگ آهک

سنگ آهک: سنگ آهک دارای ۳۵ تا ۳۸ درصد کلسیم است، میزان فلور آن باید کم باشد. سنگ آهک را به صورت پودر در می‌آورند و به جیرهٔ غذایی جوجه‌ها و طیور تخم‌گذار اضافه می‌کنند.



نمک

نمک: نمک منبع تأمین سدیم و کلر است. وجود کمی نمک در جیرهٔ ضروری است. مقدار نمک در جیرهٔ مرغ نباید از $۰/۲۵$ درصد بیشتر باشد. در صورت استفاده از پودر ماهی که حاوی مقدار زیادی نمک باشد، افزودن نمک طعام به جیرهٔ مرغ ضرورت ندارد.



جوش شیرین

جوش شیرین (بیکربنات سدیم): در جیره‌های مرغ برای حفظ تعادل آنیون و کاتیون و به منظور تأمین سدیم می‌توان از بیکربنات سدیم استفاده کرد. مقدار سدیم آن ۲۷ درصد است.

فعالیت کارگاهی

- ۱ تهیه جدول انرژی، پروتئین و محدودیت مصرف برای مواد خوراکی پر مصرف.
- ۲ تهیه و تنظیم جیره مرغ براساس نیازهای پرنده با کمک هنرآموز در کلاس.
- ۳ برآورد مقدار مورد نیاز هر ماده خوراکی از شروع تا پایان دوره پرورش مرغ گوشتی و تخم‌گذار.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
	تهیه جیره از متخصص تغذیه طیور	منابع دریافت جیره غذایی بروشورهای مربوط به اطلاعات جیره‌نویسی	۱- تنظیم جیره غذایی مناسب ۲- تنظیم جیره غذایی نسبتاً مناسب ۳- تنظیم جیره غذایی نامناسب	متوازن بودن مواد مغذی در جیره غذایی و عملکرد مطلوب گله	۳
۱				متوازن بودن نسبی مواد مغذی در جیره غذایی و عملکرد نسبتاً مطلوب گله	۲
				نامتوازن بودن مواد مغذی در جیره غذایی و عملکرد نامطلوب گله	۱

بازدید از کارخانه خوراک طیور

- ۱ همراه هنرآموز خود از کارخانه تهیه خوراک طیور تمام مواد خوراکی را که در تغذیه مرغ استفاده می‌شود بازدید کنید.

۳ با استفاده از بو کردن و در صورت لزوم چشیدن، و سپس مشخص کنید که از هر کدام برای تأمین کدام ماده مغذی جیره استفاده می‌شود.

۴ مواد خوراکی شناسایی شده را ابتدا فهرست کرده

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
	تهیه مواد خوراکی مورد استفاده در جیره مرغ	بروشورهای شرکت‌های مربوطه استاندار مربوط به مقدار مواد مغذی در خوراک‌ها	۱- خرید اقلام استاندارد جهت تهیه جیره غذایی ۲- خرید اقلام نسبتاً استاندارد جهت تهیه جیره غذایی نسبتاً مناسب	ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی مناسب اقلام خوراکی تهیه شده	۳
۲			۳- خرید اقلام جیره غذایی نامناسب	ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی نسبتاً مناسب اقلام خوراکی تهیه شده	۲
۱				ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی نامناسب اقلام خوراکی تهیه شده	

استاندارد ساختمان انبار

در انتخاب محل انبار باید بسیار دقت کرد به‌نحوی که کمترین فاصله را با اتاق مدیریت و فرمان داشته باشد. همچنین نزدیک‌ترین فاصله را با در ورودی مرغداری داشته باشد. در اصلی انبار باید طوری ساخته شود تا وسایل نقلیه باری به‌راحتی داخل و خارج شده و بار خود را تخلیه کنند. با توجه به موقعیت انبار و سالن‌ها یک یا دو در به ابعاد $1 \times 1/8$ متر در طرفین انبار جهت تردد کارگران و حمل و نقل تعییه شود. از آنجا که امکان ایجاد گرد و خاک در داخل انبار هنگام تخلیه بار و یا تهیه جیره وجود دارد؛ بنابراین دو عدد تهویه ۶۰ سانتی‌متری و ۲ الی ۴ عدد پنجره 1×0.8 متر با توجه به موقعیت انبار در نظر گرفته می‌شود.

دیوارهای انبار باید تا ارتفاع ۲ متر قابل شست و شو بوده و همچنین مقاوم و غیرقابل نفوذ برای موجودات موذی باشد. کف انبار نیز باید از جنس قابل شست و شو مانند سیمان باشد.

از جمله عواملی که در انبار روی مواد اولیه تأثیر می‌گذارد رطوبت است. رطوبت زیاد مواد ذخیره شده ممکن است رشد باکتری‌ها و کپک‌ها را تحریک کند که در اثر آن حرارت ایجاد می‌شود. حرارت موجب فساد و انهدام مواد غذایی در غلات و علوفه و احتراق ناگهانی و آتش‌سوزی احتمالی می‌شود. رطوبت زیاد ممکن است خوش‌خوراکی خوراک را کاهش دهد.

حد مجاز و مناسب رطوبت مواد خوراکی به شرح زیر است:

غلات کامل: در انبار اغلب غلات باید کمتر از ۱۳ درصد رطوبت داشته باشند. دانه ذرت تا ۱۴ درصد رطوبت را تحمل می‌کند.

غذاهای آردی یا غلتک زده: این غذاها را باید با ۱۱ درصد رطوبت یا کمتر ذخیره کرد.



انبار

توصیه‌های انبارداری

- ۱ تمام اجزای خوراک باید در دمای زیر ۲۵ درجه شروع خواهد شد.
- ۲ سانتی‌گراد نگهداری شوند.
- ۳ برای حفظ چربی و روغن اجزای خوراکی، از آنتی‌اکسیدان استفاده کنید.
- ۴ از پیش مخلوطهای ویتامینی مقاوم و با کیفیت استفاده کنید.
- ۵ دانستن تاریخ انقضای تمام مواد خوراکی ضروری است.
- ۶ غلات آسیاب شده را در مدت زمان یک ماه استفاده نمایید.
- ۷ کنجاله‌های با بیش از ۲ درصد چربی (مثل کنجاله آفتتاب‌گردان، کنجاله تخم پنبه، پودر گوشت و استخوان، پودر ماهی و پودر ضایعات طیور) به مدت یک سال نگهداری کرد. اگر در ظرف روغن یا چربی باز شود تا یک ماه باید مصرف گردد؛ زیرا در معرض هوا قرار می‌گیرد و فرایند اکسیداسیون روغن محل سرد انبار شوند (زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد).

تابستان این مواد ظرف دو ماه بعد از تولید استفاده **۱** هرگز ویتامین‌ها و مواد معدنی را به شکل مخلوط نگهداری نکنید.

گردند.

رطوبت، حرارت و در بعضی از موارد نور، مواد مغذی خوراک را از بین می‌برد. با تهیه خوراک‌های مرغوب و شرایط انبارداری مناسب، ماندگاری خوراک و اجرای خوراکی را افزایش دهید.

توجه



چرا بسیاری از مرغداران ترجیح می‌دهند خوراک موردنیاز را از کارخانه‌های تولید‌کننده معتبر تهیه کنند؟

گفت و گو
کنید



فعالیت کارگاهی

نکات قابل توجه در انبار کردن مواد خوراکی

ابزار و وسائل مورد نیاز

■ لباس کار ■ جارو ■ ماسک ■ سم برای مبارزه با آفات انباری ■ حفاظ رطوبت

مراحل انجام کار

۱ انبار را قبل از ورود مواد خوراکی، ابتدا تمیز و مرتب، سپس با سموم توصیه شده سمپاشی کنید. استفاده از حشره‌کش‌های تماسی مصنوعی امروزه یکی از استراتژی‌های متداول برای جلوگیری از تغذیه و خسارت آفات انباری است.

۲ مواد خوراکی خردباری شده را قبل از ورود به انبار بازرسی کنید تا پس از مطمئن شدن از آلوده نبودن به حشرات، کنه‌ها و آفات به انبار وارد شوند. علاوه بر این حداقل هر هفته یکبار محتوى انبار را از نظر وجود احتمالی آفات و امراض بازرسی کنید و در صورت لزوم نمونه‌هایی از آن را برای آزمایش به آزمایشگاه بفرستید.

۳ قبل از قرار دادن مواد خوراکی در انبار دقت کنید که کف انبار رطوبت نداشته باشد و در صورت مشاهده از ریختن مواد خوراکی روی بستر جلوگیری کنید تا بستر کاملاً خشک شود. قبل از چیدن کیسه‌ها روی کف انبار از یک حفاظ رطوبتی استفاده کنید. این وسیله بین کف انبار و کیسه‌ها قرار می‌گیرد تا از رسیدن رطوبت به مواد خوراکی، که موجب کیک‌زدگی و فساد می‌گردد، جلوگیری کند. ساده‌ترین حفاظ رطوبتی، نایلون یا لاستیک ضد رطوبت است. نوع دیگر حفاظ رطوبتی، الوارهای چوبی یا پالت هستند.

۴ بهتر است کیسه‌های مواد خوراکی را ابتدا روی حفاظ رطوبتی (پالت‌های چوبی) بچینید و بین کیسه‌هایی که چیده شده در هر ۵ - ۶ متر، راهرویی به عرض $1/5$ متر ایجاد کنید تا امکان تهویه، ضدغونی و دسترسی به تمام کیسه‌ها میسر باشد. همچنین برای ضدغونی سقف انبار، باید فاصله‌ای به میزان $۷۵ - ۱۰۰$ سانتی‌متر بین سطوح فوقانی کیسه‌ها و سقف انبار فاصله باشد.



تهویه کیسه‌ها در انبار



کیسه‌های بزرگ نگهداری غلات



نگهداری فله‌ای مناسب غلات



نگهداری فله‌ای نامناسب غلات در انبار




عدم رعایت بهداشت و قرار دادن نادرست غلات در انبار



بسته‌بندی و پالت‌گذاری مناسب کیسه‌ها در انبار

آفات انباری

در صنعت پرورش طیور، علاوه بر شناسایی و درجه‌بندی مواد، نحوه نگهداری و حفظ کیفیت مواد از اهمیت خاصی برخوردار است. بیشتر خسارت‌های ایجاد شده در طول انبارداری، ناشی از آلودگی قارچی و حشرات در داخل توده غلات است. میکروارگانیسم‌ها با مصرف مواد مغذی رشد کرده و با تولید حرارت و افزایش دمای توده غلات، شرایط مناسبی را برای فساد ایجاد می‌کنند. دما و رطوبت در غلات از عوامل اصلی رشد قارچ‌هایی مانند آفلاتوکسین و ... هستند.



راه‌های آلودگی مواد خوراکی با آفات انباری

الف) **آلودگی با حشرات و آفات انباری:** این موضوع بیشتر در مورد غلات مطرح است تا درمورد علوفه. آفات انباری علاوه بر خسارت کمی، زیان‌های کیفی به محصولات انبارشده وارد می‌کنند. آلوده شدن غلات انبار شده به مدفوع و جلدی‌های لاروی حشرات و کنه‌ها، از بین رفتن عناصر اصلی و ویتامین‌ها، از عوامل مهم کاهش کیفیت غلات هستند. درجه خسارت بستگی به طول مدت ذخیره و درجه حرارت محیط انبار دارد. روش‌های مختلف گازدهی برای ضدغونی غلات و محیط ممکن است موجب کاهش خسارت ناشی از حشرات شود. از مهم‌ترین حشرات می‌توان شپش‌ها، سوسک‌های خرطومی، سوسک سیاه انباری، شپش یا سوسک آرد را نام برد.



کنه آرد



شپش گندم



از تله، مرگ موش، نگهداری گربه در محیط، خارج کردن موادی که موش‌ها در آن لانه می‌کنند و مقاوم‌سازی دیوارها و سیلوها از کارهای مؤثر برای کنترل خسارت جوندگان است.

ب) خسارت ناشی از جوندگان: غالباً موش و موش‌صحرایی به انبارهای مواد غذایی حمله می‌کنند؛ اگر چه مقدار غذایی که این جانوران می‌خورند، خسارت اقتصادی مهمی به شمار نمی‌آید؛ ولی بیش از ده برابر این مقدار غذا توسط ادرار و مدفوع آنها آلوده می‌شود. در اثر آلوده شدن مواد با مدفوع و ادرار جوندگان از خوش‌خوارکی آنها کاسته شده و ممکن است عامل شیوع بعضی بیماری‌ها نیز باشد. باید ترکیبی از روش‌های مختلف مبارزه با جوندگان به کار گرفته شود تا موفقیت خوبی به دست آید. استفاده

مبارزه با آفات انباری

در صورتی که در نمونه برداری ابتدا آلودگی به آفات مشخص شد باید قبل از ورود کالا به انبار مبارزه با آفات انجام گیرد. مبارزه با آفات انباری به روش‌های مختلف انجام می‌شود:

- ۱ مخلوط کردن گرد آفت‌کش‌ها با محصول قبل از ورود به انبار.
- ۲ مایع پاشی آفت‌کش‌ها روی دانه‌ها در زمان حرکت روی تسمه نقاله و یا روی محصول پخش شده در زمین. این سموم کم دوام بوده و اثر آنها سریع از بین می‌رود.
- ۳ پاشیدن آفت‌کش گازی به صورت مایع.
- ۴ انداختن قرص‌ها یا نوارهای تولید کننده گاز سمی به داخل محصول.
- ۵ استفاده از سموم گازی زیر چادر نایلونی که روش بسیار معمولی است.

توجه



به طور کلی، راههای مبارزه با آفات انباری از طریق ضدغونی کردن شامل:

- ۱ ضدغونی و سمپاشی سیلوها و انبار خالی
- ۲ ضدغونی سیلوها و انبارهای نیمه پر.

فعالیت کارگاهی

ماده سمی را محاسبه کنید.

مبارزه با آفات انباری

۵ از ماسک دهانی و دستکش پلاستیکی استفاده کنید.

۱ انبار مواد خوارکی محل تحصیل خود را با استفاده از مواد سمی سمپاشی کنید.

۶ ترازوی آزمایشگاه را آماده کنید (دقت ترازوی حداقل ۱/۰ گرم).

۲ هنگام سمپاشی نکات اینمنی را رعایت کنید.

۷ بسته سم را باز کنید.
۸ سم را با وسیله‌ای مناسب (بدون تماس دست) داخل کیسه پلاستیکی بریزید.

۱ نوع سم یا سموم و مقدار مصرف آنها را از هنرآموز

خود پرسش کنید.

۹ کیسه حامل سم را با دقت توزین کنید.
۱۰ در پایان در کیسه سم را به وسیله مناسب (نوار چسب) محکم بیندید و در مکان خشک و خنک قرار دهید.

۲ برچسب سم را به دقت مطالعه کنید.

۱۱ میزان ماده مؤثر سم را از روی برچسب مشخص کنید.

۳ میزان ماده مؤثر آن، مقدار

۱۲ با توجه به میزان سم و میزان ماده مؤثر آن، مقدار

۴ دهید.



سم وزن شده



ترازوی دیجیتالی



بسته سم

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	نگهداری خوارک	وجود انبار خوارک - زمان انبارداری -	۱- حفظ کیفیت خوارک حین انبارداری ۲- حفظ نسبی کیفیت خوارک حین انبارداری ۳- عدم حفظ کیفیت خوارک حین انبارداری	رعایت شرایط انبارداری خوارک‌ها	۳
۲		شرایط محیطی انبارداری		رعایت نسبی شرایط انبارداری خوارک‌ها	۲
۳				عدم رعایت شرایط انبارداری خوارک‌ها	۱

فعالیت کارگاهی

تهیه فرم‌های مورد نیاز

در اکثر مزارع اهمیت اداره انبارها از نظر دور مانده و به این موضوع که مواد خوراکی ارزش نقدی معادل قیمت خود دارند توجه کافی نمی‌شود. فاسدشدن مواد، عدم توجه در جابه‌جا کردن و حفظ کیفیت مواد خوراکی موجب کاهش سودآوری مرغداری می‌شود. توجه به کنترل اطلاعات ورود و خروج مواد خوراکی، داشتن اطلاعات به روز و صحیح از موجودی انبار، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های یک مرغدار است. جهت افزایش سود و مدیریت صحیح باید یک سری از فرم‌ها برای مدیریت انبار مرغداری‌ها تهیه شوند در این خصوص استفاده از افرادی که دارای تجربه کافی در این زمینه باشند توصیه می‌شود. در ادامه یک سری از فرم‌های مورد نیاز برای اداره انبار مرغداری جهت اطلاع آورده شده است.

فرم کنترل برنامه‌های امنیت زیستی

ملاحظات	موارد نقص	ندارد	دارد		کنترل
			نامناسب	مناسب	
					کنترل جوندگان و حیوانات موزدی
					کنترل حشرات
					کنترل پرندگان
					کنترل ورود و خروج افراد و کارگران
					کنترل انتشار آلودگی خط تولید
					برنامه کنترل نظافت و ضدغونی انبار

فرم ضوابط و شرایط بهداشتی عمومی

توضیحات	مورد تأیید است		سؤالات	رد پوچش
	خیر	بلی		
			آیا از نگهداری طیور (پرنده‌گان زیستی، بومی و سایر ماقایق) و سایر حیوانات ممانعت شده است؟	۱
			آیا دان و نهاده‌ها به صورت مناسب و در شرایط مطلوب نگهداری می‌شوند؟	۲
			آیا انبار نگهداری دان و نهاده‌ها از نظر بهداشتی در وضعیت مناسب است؟	۳
			آیا مواد شوینده و ضدغذوی کننده و ... از طرف مراجع ذیصلاح تأیید شده‌اند؟	۴
			آیا نتایج نمونه‌برداری آب از لحاظ میکروبی و شیمیایی در هر دوره مناسب (مطابق معیارهای آب قابل شرب) است؟	۵

فرم ویژگی‌ها و شرایط بهداشتی انبار تخلیه مواد اولیه

توضیحات	مورد تأیید می‌باشد		سؤالات	رد پوچش
	خیر	بلی		
			آیا نظافت و ضدغذوی انبار تخلیه و ماشین‌آلات مربوط به خوبی انجام می‌پذیرد؟	۱
			آیا تهییه در انبار مواد اولیه به خوبی صورت می‌گیرد؟	۲
			آیا وسیله‌ای برای اندازه‌گیری دمای انبار تخلیه مواد اولیه وجود دارد؟	۳
			آیا امکان ورود پرنده‌گان به انبار مواد اولیه وجود دارد؟	۴
			آیا انبار مواد اولیه دارای ارتباط مناسب با سالن تولید است؟	۵

فرم ویژگی‌ها و شرایط بهداشتی سیلوها

ردیف	سوالات	مورد تأیید است		توضیحات
		خیر	بلی	
۱	آیا تخلیه کامل خوراک و مواد اولیه از سیلو از طریق کف صورت می‌گیرد؟			
۲	آیا درزبندی کامل در سیلوها رعایت شده است؟			
۳	آیا امکان نظافت، ضدغونه و گازدهی سیلوها وجود دارد؟			
۴	آیا سیلوها به ضربه زن مغناطیسی جهت ریزش گرد و غبار کامل دیواره‌ها مجهر است؟			
۵	آیا سیلوها به نشانگر سطح سنج مجهر است؟			
۶	آیا طراحی و نصب سیلوها به نحوی است که در زوایای آن مواد اولیه به جای نماند؟			

فرم اطلاعات موجودی انبار

ردیف	ماده خوراکی	میزان سفارش (kg)	میزان مصرف (kg)	موجودی باقی‌مانده (kg)	تاریخ	توضیحات
۱						
۲						
۳						
۴						

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۴	مستندسازی به طور صحیح	فرم‌های ثبت آمار	مستندسازی به طور صحیح	ثبت دقیق اطلاعات و آمار	۳
	مستندسازی به طور نسبتاً صحیح	مستندسازی به طور نادرست	مستندسازی به طور نسبتاً صحیح	ثبت نسبتاً دقیق اطلاعات و آمار	۲
	مستندسازی			ثبت نادرست اطلاعات و آمار	۱

ارزشیابی شایستگی تهیه خوراک

شرح کار:

- ۱- دریافت جیره غذایی از متخصص تغذیه طیور
- ۲- تهیه مواد خوراکی مورد استفاده در جیره مرغ
- ۳- انبار کردن خوراک
- ۴- مستندسازی اطلاعات

استاندارد عملکرد:

تهیه خوراک با توجه به دستورالعمل متخصص تغذیه برای گله ۵۰۰۰ قطعه‌ای

شاخص‌ها:

- ۱- استفاده از جیره غذایی متوزن براساس نیاز پرنده و مواد خوراکی در دسترس
- ۲- اقلام خوراکی تهیه شده طبق دستورالعمل
- ۳- خوراک انبار شده در شرایط محیطی استاندارد
- ۴- ثبت آمار مربوط به ورود و خروج اقلام خوراکی

شرایط انجام کار:

سالن سرپوشیده انبار نهاده‌ها و خوراک

فرمول جیره غذایی

نهاده‌های مورد استفاده در جیره یا خوراک آماده

ابزار و تجهیزات:

ترازو - بیل - فرمول جیره غذایی - رطوبت سنج - دماسنجد

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	توضیحات	نمودار شایستگی
۱	تهیه جیره از متخصص تغذیه طیور		
۲	تهیه مواد خوراکی مورد استفاده در جیره مرغ		
۳	نگهداری خوراک		
۴	مستندسازی		
		شایستگی‌های غیرفنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: محاسبه و ریاضی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مواد و تجهیزات، استفاده از لباس کار، تهیه مواد خوراکی فاقد هرگونه آلودگی، جلوگیری از پراکنده شدن مواد خوراکی در محیط اطراف، دقت و صداقت در کار	
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری: ۱۰

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

واحد یادگیری ۱۱

خوراک دهی مرغ

آیا تابه حال پی برده‌اید؟

- ۱ لوازم و ابزار آماده‌سازی و انتقال خوراک شامل چه تجهیزاتی است؟
- ۲ نحوه کار با آسیاب و میکسر به چه صورتی است؟
- ۳ چه روش‌هایی برای خوراک دهی در مرغ به کار می‌رود؟
- ۴ چه اطلاعاتی را باید در فرم‌های ثبت خوراک دهی در مرغ در نظر گرفت؟


هدف از این بخش بررسی انواع تجهیزات آماده‌سازی خوراک و نحوه کار با آن، انواع روش‌های خوراک‌دهی در مرغ و ثبت اطلاعات مرتبط با آن در فرم‌های مربوط به آن است. در پرورش مرغ، تهیه خوراک مناسب و خوراک‌دهی صحیح مهم‌ترین نکته است؛ زیرا تغذیه خوب، سلامت طیور و بالاترین تولید گوشت و تخم مرغ را به همراه دارد. برای رسیدن به بالاترین تولید باید جیره غذایی مرغ براساس نیازهای غذایی آن باشد. این جیره غذایی براساس سن، جنس، نوع تولید و... تهیه می‌شود. آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که طیور، دست کم به چهل ماده غذایی ضروری نیاز دارند. این مواد غذایی باید به اندازه کافی و به نسبتی مناسب با یکدیگر در جیره غذایی مرغ وجود داشته باشند. به‌طوری که بیشترین سرعت رشد، مناسب‌ترین تعداد تخم‌گذاری و تولید مثل را در مرغ ایجاد کنند. خوراک‌دهی طبق یک برنامه زمانی موجب بهبود عملکرد می‌شود. عدم دسترسی به غذا موجب تحریک اشتها در نوبت بعدی تحويل غذا به سالن پرورش می‌شود. اگر چه اصول تهیه و روش خوراک‌دهی طبق برنامه زمانی بسیار واضح است، اما این امر نیازمند دقت فراوان و مدیریت صحیح می‌باشد. به دلیل آنکه اگر پرندگان مدت زیادی گرسنه بمانند موجب کاهش عملکرد آنها می‌شود.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود روزانه عملیات خوراک‌دهی یک مرغداری به ظرفیت ۵۰۰ قطعه را با حداقل دورریز انجام دهنند.


آسیاب چیست؟ چه نوع آسیابی برای مرغداری‌ها استفاده می‌شود؟ ملاک انتخاب آسیاب چه چیزهایی است؟ آسیاب دستگاهی است صنعتی که برای خرد کردن و آرد کردن انواع اقلام مورد استفاده در جیره مرغ، نظیر سویا، غلات مختلف از جمله ذرت، گندم، جو و تولید پودر استخوان از استخوان در مرغداری‌ها استفاده می‌شود. این محصول در ظرفیت‌های مختلف برای مرغداری‌ها با گنجایش‌های متفاوت تولید و عرضه می‌گردد که از لحاظ ظرفیت، بازدهی و تجهیزات اضافی با یکدیگر تفاوت دارند. انتخاب نوع آسیاب و آگاهی از ویژگی‌های مربوط به آن از اولین مراحل کار محسوب می‌شود. در ادامه مهم‌ترین انواع آسیاب‌ها بررسی می‌شوند. از بین انواع آن، آسیاب چکشی، غلتکی بیشتر در مرغداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آسیاب‌های غلتکی: آسیاب غلتکی برای شکستن دانه یا سایر مواد فیبری استفاده می‌شود. این آسیاب‌ها موجب ورقهای شدن دانه یا سایر مواد دیگر می‌شوند. در صورت وجود دو نوع غله مختلف برای آسیاب، از دو جفت آسیاب غلتکی استفاده می‌شود. در استفاده از دو غله ذرت و سورگوم، سمت غلتک‌های خردکننده حاوی دو غلتک، یکی برای خرد کردن ذرات درشت (ذرت) و دیگری برای خرد کردن ذرات ریز (سورگوم) نیاز است.



در آسیاب غلتکی، دو غلتک با دو سرعت چرخش مختلف در نظر گرفته می‌شود (یک غلتک سریع‌تر از دیگری می‌چرخد) تا تمام مواد فیبری شامل دانه غلات محصولات پلت‌شده، دانه‌های روغنی و محصولات فرعی و سایر اجزای خوارکی دیگر را خرد کند.

از آسیاب‌های دارای سه جفت غلتک برای تولید خوارک‌های مختلف مثل دانه‌های کامل، خوارک‌های میکس شده یا سایر ترکیبات استفاده می‌شود. معمولاً یک غلتک ثابت و غلتک دیگر با توجه به فاصله بین آنها تنظیم می‌شود، غلتک‌ها باید نسبت به هم موازی باشند.

**مزایا**

- ۱ راندمان بهتر انرژی
- ۲ توزیع یکنواخت ذرات
- ۳ سر و صدا و گرد و غبار کمتر

معایب

- ۱ دارای اثر کم بر مواد فیبری
- ۲ ایجاد ذرات مستطیل شکل
- ۳ هزینه اولیه بالا (بستگی به طراحی سیستم دارد)
- ۴ افزایش هزینه‌های نگهداری

اجزای تشکیل دهنده آسیاب غلتکی


- ۱ محل خروج مواد آسیاب شده
- ۵ شاسی و پایه

- ۱ فیدر
- ۲ یک یا دو جفت غلتک
- ۳ موتور الکتریکی آسیاب



آسیاب‌های غلتکی

معمولًاً یک غلتک ثابت و غلتک دیگر متحرك بوده و فاصله بین آنها به صورت دستی یا خودکار تنظیم می‌شود. شیارهای غلتک متناسب با نوع مواد و یا اندازه اولیه و پایانی ذرات تعیین می‌شود (میزان نرمی). شیارهای درشت برای آسیاب کردن اقلام خوراکی با ذرات درشت و در ظرفیت بالا و شیارهای ریز در تولید ذرات نرم و در ظرفیت‌های پایین‌تر استفاده می‌شود. گاهی نیز لازم است برای تولید محصول خیلی نرم از غلتک‌هایی با شیارهای مختلف استفاده شود. در شکل صفحه بعد انواع شیار روی غلتک نشان داده شده است.



شیارهای مختلف روی غلتک

نحوه خردکردن با غلتک

فعالیت کارگاهی

- ۳ قسمت‌های مختلف آسیاب را مشاهده کنید.
- ۴ درهای ورودی و خروجی را باز و بسته کنید.
- ۵ غلتک‌ها را بررسی کنید.

شناسایی قسمت‌های مختلف آسیاب غلتکی


- ۱ لباس کار بپوشید.
- ۲ در محفظه آسیاب را باز کنید.

آسیاب‌های چکشی

آسیاب چکشی برای خرد کردن مواد خوراکی مختلف استفاده می‌شود. این نوع آسیاب در فراوری دانه‌های روغنی مثل سویا، آفتاب‌گردان، پنبه‌دانه و موارد مشابه آن و همچنین جهت پوسته‌گیری دانه و کنجاله کردن آن (مواد خوراکی با پروتئین بالا بعد از روغن‌گیری آسیاب می‌شوند) استفاده می‌شود.

مزایای آسیاب چکشی

- ۱ آسیاب کردن طیف وسیعی از مواد خورکی
- ۲ قابل استفاده برای خرد کردن مواد فیبری و ترد
- ۳ دارای هزینهٔ خریداری کمتر نسبت به آسیاب غلتکی
- ۴ هزینهٔ نگهداری پایین
- ۵ کارکرد ساده و راحت



معایب آن

- ۱ راندمان انرژی پایین‌تر نسبت به آسیاب غلتکی
- ۲ تولید حرارت زیاد
- ۳ ایجاد سر و صدا و گرد و غبار
- ۴ ایجاد ذراتی با اندازه‌های مختلف (یکنواختی کمتر)


بخش‌های مختلف آسیاب چکشی

- ۱ موتور الکتریکی
- ۲ تغذیه‌کننده آسیاب (feeder)
- ۳ محور اصلی آسیاب (rotor)
- ۴ چکش‌ها
- ۵ الک یا توری آسیاب (screen)
- ۶ خروجی آسیاب
- ۷ شاسی و پایه

میزان خردشدن مواد به تعداد چکش، اندازه چکش، سایش آن، سرعت ضرب‌ها، نیروی ماشین، صفحه توری، قطر منافذ توری، نرخ آسیاب و کیفیت غلات (رطوبت، سختی، تست وزن، دانسیته مواد و نوع غله) بستگی دارد. بیشترین فرسایش در صفحه توری آسیاب مشاهده می‌شود. بهترین راه کاهش هزینه‌های آسیاب و حفظ ظرفیت راندمان و کیفیت تولید، تعویض توری آن است. معمولاً در استفاده از آسیاب با ست چکش‌های سخت، قبل از تعویض چکش، توری باید عوض شود.

موادی که از توری عبور نکردن به دلیل سرعت بالای چرخش چکش‌ها، در سطح توری نشست می‌کنند. وجود این مواد در پشت توری و فشردگی آنها موجب ساییدگی این قسمت شده و از طرفی انرژی به شکل حرارت از دست می‌رود؛ بنابراین موجب افت راندمان اقتصادی خواهند شد. در بعضی آسیاب‌ها توری‌های دو قسمتی طراحی شده است. در استفاده از مواد بزرگ‌تر، برای کم‌شدن فشار مواد بر سطح توری، انحنای فوقانی چکش باید بیشتر شود.

عوامل مؤثر بر فضای باز توری شامل اندازه منافذ، تناوب منافذ، زاویه و اندازه سطوح هستند.



گونه‌ای که چکش‌ها در حین چرخش، فاصله کمی تا غربال دارند. مواد ورودی با برخورد به چکش‌ها خرد شده، به سمت غربال حرکت می‌کنند. این مواد، چنانچه به اندازه کافی خرد شده باشند، از غربال

چکش‌ها، حول محور دوار به صورت مفصلی نصب شده‌اند. با چرخش محور دوار، چکش‌ها با سرعت چرخیده، در راستای شعاع محور قرار می‌گیرند. غربال و دریچه خروجی، در زیر چکش‌ها قرار گرفته‌اند به

و دریچه خروجی عبور می‌کنند. در غیراین صورت از غربال عبور نکرده، با برخورد دواره به چکش‌ها کوچک‌تر می‌شوند تا از غربال عبور کنند. چکش‌ها، ورقه‌های فولادی و دو طرفه هستند و در صورت شکستگی یا فرسودگی بیش از حد ساییدگی یک طرف، می‌توان آنها را پشت و رو کرد. اطمینان از خالی بودن محفظه آسیاب از مواد، قبل از روشن کردن موتور بعد از کنترل موارد فوق، ابتدا آسیاب را روشن کرده و صبر کنید تا چکش‌ها به سرعت مناسب برستند سپس مواد را از دریچه ورودی آسیاب وارد کنید. در هنگام کار با آسیاب چکشی باید به نکات زیر توجه کرد:

فعالیت کارگاهی

شناسایی قسمت‌های مختلف آسیاب چکشی


- ۱ لباس کار بپوشید.
- ۲ درهای ورودی و خروجی را باز و بسته کنید.
- ۳ قسمت‌های مختلف آسیاب چکشی را مشاهده کنید.
- ۴ چکش‌ها را بررسی کنید.

انواع مخلوطکن‌ها^۱

مواد خوراکی پس از خرد شدن، چگونه مخلوط می‌گردند؟ به چه نسبتی ماده خوراکی را باید مخلوط کرد؟ آیا ترتیب مخلوط کردن مواد با یکدیگر مهم است یا نه؟ اولین اقدام شما در تهیه یک جیره کاملاً مخلوط خرید یک مخلوطکن است. چندین نوع مخلوطکن در بازار موجود است که از آن جمله می‌توان به مدل‌های افقی، عمودی، غلتکی، طبلکی یا زنجیره‌ای و پارویی اشاره کرد.

مخلوطکن افقی


این مخلوطکن‌ها می‌توانند برای مخلوط کردن خوراک ۱ تا ۴ مارپیچ افقی داشته باشند. در مخلوطکن‌های افقی چندتیغه‌ای، مخلوط شدن زمانی اتفاق می‌افتد که یکی یا دو تا از مارپیچ‌ها برخلاف مارپیچ دیگر خوراک را حرکت دهند. این مخلوطکن از محفظه اختلاط، الکتروموتور، دریچه ورودی، دریچه خروجی و دو مارپیچ نواری که روی یک محور قرار گرفته‌اند، تشکیل می‌شود. مواد، ابتدا از بالا وارد محفظه می‌شوند و پس از پر شدن، مارپیچ‌ها حدود ۵ دقیقه مواد را هم می‌زنند. حرکت چرخشی مارپیچ‌ها از الکتروموتور تأمین می‌شود و سپس مواد مخلوط شده از دریچه خروجی تخلیه می‌شود.



چکشی ترکیب می‌شود. در اینجا خروجی آسیاب به یک نقاله مارپیچی متصل است. مواد ابتدا وارد آسیاب می‌شوند و پس از خرد شدن، به وسیله نقاله به مخلوط‌کن منتقل و درنهایت مخلوط مواد از خروجی تخلیه می‌شوند.

طرح کلی مخلوط‌کن افقی: در این مخلوط‌کن، زمان اختلاط و پر و خالی شدن محفظه، نسبت به مخلوط‌کن عمودی کمتر است، به همین دلیل بازده دستگاه بیشتر است.

در برخی از دستگاه‌ها، مخلوط‌کن افقی با آسیاب



دستگاه مخلوط‌کن افقی


مخلوط‌کن‌های عمودی

مخلوط‌کن عمودی^۱، رایج‌ترین مخلوط‌کن در ایران است و از محفظه اختلاط، دریچه ورودی، دریچه خروجی، الکتروموتور و مارپیچ تشکیل شده است. نیروی مارپیچ مرکزی توسط گیربکس تأمین می‌شود. مواد خوراکی

از دریچه ورودی وارد محفظه می‌شود. در ابتدای کار دریچه خروجی را بسته و مواد ورودی به وسیله مارپیچ بالا می‌روند و به تدریج داخل محفظه کاملاً از مواد آسیاب شده پر می‌گردند. در کمتر از ۳۰ دقیقه مواد کاملاً مخلوط می‌شوند. در این مرحله دریچه خروجی باز می‌شود و مواد از دستگاه خارج می‌گردند.

توجه

افزایش مدت زمان مخلوط کردن باعث جدا شدن مواد خوراکی می‌شود که به میزان کم در جیره غذایی استفاده شده است. بنابراین بهترین زمان برای اختلاط مواد خوراکی در مخلوط کن عمودی ۱۵-۲۰ دقیقه می‌باشد.



فعالیت کارگاهی



دستگاه آسیاب و مخلوط کن عمودی

شناسایی قسمت‌های مختلف مخلوط کن‌ها

- ۱ لباس مناسب بپوشید.
- ۲ قسمت محفظه دریچه خروجی دان را مشاهده کنید.
- ۳ قسمت‌های محفظه اختلاط و الکتروموتور را مشاهده کنید.

در برخی از انواع، مخلوط کن عمودی با یک آسیاب چکشی ترکیب می‌شود. خروجی آسیاب به ورودی مخلوط کن راه دارد. مواد ابتدا وارد آسیاب شده، پس از خردشدن وارد مخلوط کن می‌گردند و درنهایت، مخلوط مواد از خروجی مخلوط کن خارج می‌شود.

فعالیت کارگاهی

کار با آسیاب و مخلوط کن (میکسر)

- ۱ همراه هنرآموز خود به یک کارخانه خوراک یا انبار مرغداری محل تحصیل خود مراجعه کنید.
- ۲ یک نمونه جیره با هنرآموز خود تهیه و تنظیم کنید.
- ۳ لباس کار بپوشید.
- ۴ مواد خوراکی مورد نیاز جیره را توزین کنید.
- ۵ از نبودن جسم خارجی داخل دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۶ کلید پیچ‌ها و کشش تسمه‌ها را بررسی کنید.
- ۷ با توجه به نوع و اندازه مورد نیاز دان، الک مناسب را انتخاب کنید.
- ۸ خروجی دستگاه بالابر را با ظرفیت آسیاب تنظیم کنید.
- ۹ قبل از روشن کردن، دستگاه را کاملاً تمیز کنید.
- ۱۰ ابتدا آسیاب را روشن کرده و بعد از رسیدن موتور به دور مناسب، بالابر را روشن کنید.
- ۱۱ مواد خوراکی را که نیاز به خرد شدن دارند، داخل آسیاب بریزید دقیق داشته باشید که اندازه توری مناسب باشد.
- ۱۲ با تعویض الکهای آسیاب، مواد غذایی را در اندازه‌های مختلف آسیاب کنید.
- ۱۳ مواد خوراکی آسیاب شده را داخل مخلوط کن بریزید تا کاملاً مخلوط شوند.
- ۱۴ برای مخلوط کردن مکمل‌ها و مواد کم‌صرف، پس از توزین، آنها را با مقداری دان آسیاب شده مخلوط کنید و سپس داخل مخلوط کن بریزید.
- ۱۵ روغن مایع را نیز با کمی دان خردشده مخلوط کرده و داخل مخلوط کن بریزید تا به صورت یکنواخت با مواد خوراکی دیگر مخلوط شود.
- ۱۶ اگر در حین کار برق قطع شود یا به هر دلیل آسیاب خاموش شود، بار داخل دستگاه را تخلیه کنید تا تیغه‌های آن به راحتی بچرخد.
- ۱۷ سپس دان آماده را در کیسه‌هایی بزرگ ریخته و استفاده کنید.

فعالیت کارگاهی

توزین دان

- دهید.
- ۱ لباس کار بپوشید.
 - ۲ اجزای دان مورد نیاز جیره را با دقیق وزن کنید.
اجزای سنگین جیره مانند ذرت، گندم و کنجاله سویا را با استفاده از ترازوی بزرگ و اجزای کم وزن جیره مانند نمک، مکمل‌های معدنی و ویتامینه را با استفاده از ترازوی دیجیتالی گرمی وزن کنید (با تهیه و تنظیم جیره را با کمک هنرآموز خود انجام

استفاده از ترازوی دقیق). مکمل‌های معدنی و ویتامینه) را به طور مستقیم در ۴ اجزای دان را که نیاز به خرد شدن ندارند (نمک، چاله مخلوط کن بروزید.

وزن کردن مواد خوراکی طبق فرمول جیره باید با دقت فراوان انجام شود تا جیره متعادلی داشته باشیم.

توجه



فعالیت کارگاهی

سپس داخل مخلوط کن بروزید.

آماده کردن خوراک

۷ روغن مایع را نیز با کمی دان خردشده مخلوط کرده و داخل مخلوط کن بروزید تا به صورت یکنواخت با مواد خوراکی دیگر مخلوط شود.

۸ مواد خوراکی آسیاب شده را داخل مخلوط کن بروزید و در حدود ۲۰ دقیقه زمان بدھید تا کاملاً مخلوط شوند.

ابزار و وسائل مورد نیاز

۹ سپس دان آماده را در کیسه‌هایی بزرگ ریخته و استفاده کنید.

لباس کار

۱۰ مواد خوراکی جیره ترازو آسیاب، میکسر و بالابر کیسه

مراحل انجام کار

۱۱ تهیه و تنظیم جیره را با راهنمایی هنرآموز خود انجام دهید.

۱۲ لباس کار بپوشید.

۱۳ اجزای دان مورد نیاز جیره را با دقت وزن کنید (با استفاده از ترازوی دقیق).

۱۴ با توجه به نوع و اندازه مورد نیاز دان، الک مناسب را انتخاب کنید.

۱۵ اجزای دان را که نیاز به خردشدن دارند (ذرت، کنجاله سویا) آسیاب کنید.

۱۶ برای مخلوط کردن مکمل‌ها و مواد کم مصرف (نمک، مکمل‌های معدنی و ویتامینه)، پس از توزین، آنها را با مقداری دان آسیاب شده مخلوط کنید و

در تهیه خوراک دام و طیور، دقیقاً فرمول علمی آن رعایت شود تا بهترین بازدهی کمی و کیفی حاصل شود.

اخلاق
حرفه‌ای



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، موا، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
مرغ	آماده سازی خوراک	آسیاب - میکسر - ترازو - بیل - بالابر	۱- آماده سازی خوراک دقیقاً طبق فرمول جیره ۲- آماده سازی خوراک تقریباً طبق جیره غذایی ۳- آماده سازی خوراک برخلاف فرمول جیره غذایی	توزین دقیق و مخلوط شدن صحیح اقلام خوراک	۳
۱				توزین نسبتاً دقیق و مخلوط شدن نسبتاً صحیح اقلام خوراک	۲
				توزین دقیق و مخلوط شدن نادرست اقلام خوراک	۱

روش‌های توزیع دان

توزیع دان به صورت دستی یا مکانیزه انجام می‌شود که هریک دارای تجهیزات خاص خود هستند. این تجهیزات در روش پرورش قفس و بستر، مشابه هم هستند و تنها چگونگی نصب آنها متفاوت است. در پرورش داخل قفس، تجهیزات روی قفس و در پرورش در بستر سالن، روی سالن پرورش نصب می‌شوند.

(۱) توزیع دان دستی

الف) ناودانی: اندازه و ابعاد آن بسته به سن مرغ متغیر است. جنس این نوع دانه‌خوری‌ها از ورق گالوانیزه است. در روش پرورش قفس، دان‌خوری ناودانی در سرتاسر جلوی قفس‌ها به نحوی قرار دارند که دان مستقیماً در دسترس مرغ باشد.


ب) بشقابی یا استوانه‌ای: دارای یک مخزن استوانه‌ای به قطر ۴۰-۵۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر و در زیر این استوانه یک کفه قرار دارد که ارتفاع دان داخل کفه قابل تنظیم است. این دانه‌خوری‌ها از سقف آویزان هستند و ارتفاع آنها قابل تنظیم می‌باشد. ارتفاع دان نباید بیش از یک سوم داخل کفه باشد؛ زیرا باعث پرت دان خواهد شد.



دان خوری استوانه‌ای دستی



دان خوری اولیه



دان خوری بشقابی دستی



دان خوری ناودانی دستی



انواع دان خوری دستی

افزایش ارتفاع دان خوری‌های دستی هر چند وقت یکبار صورت می‌پذیرد؟ چرا؟

تحقیق
کنید



۲) توزیع دان به صورت خودکار

با دانه‌خوری‌های خودکار توزیع دان به صورت خودکار انجام می‌شود و کارگران کار دستگاه را کنترل می‌کنند. طرز کار اغلب دانه‌خوری‌های خودکار شبیه هم است و فقط از نظر نقاله یا دان خوری با یکدیگر تفاوت دارند. این دان خوری‌ها بر دو نوع اند:

الف) دان خوری خودکار زنجیری: در این نوع دانه‌خوری، دان از طریق زنجیر از مخزن یا هاپر به سرتاسر سالن فرستاده می‌شود. در این روش مشکلاتی نیز وجود دارد مانند گیر کردن پای پرنده‌گان در زنجیر، آلوده کردن دان با فضولات، که البته این مشکل را می‌توان با نصب توری سیمی و ... حل کرد.




دان خوری خودکار زنجیری




دان خوری زنجیری در سامانه قفس

ب) اتوماتیک بشقابی: در این نوع دانه‌خوری، دان توسط زنجیر یا مارپیچ از درون ناوдан به لوله در سرتاسر سالن فرستاده می‌شود. در طول لوله و در فواصل مساوی بشقاب‌هایی نصب شده‌اند که در بالای آنها سوراخی تعییه شده است. هنگامی که دان از لوله به هر بشقاب می‌رسد از سوراخ رد شده و به داخل بشقاب ریخته می‌شود.




دان خوری خودکار مارپیچی یا بشقابی



شمای دان خوری بشقابی خودکار در سالن



دان خوری مارپیچی خطی



دان خوری مارپیچی غیرخطی

ج) دان خوری‌های واگنی: واگن دان روی ریل حرکت می‌کند این سیستم برای داخل قفس معمول است.
دان خوری ناودانی: این دان خوری در سرتاسر جلوی قفس‌ها به نحوی قرار دارند که دان مستقیماً در دسترس مرغ باشد.

فعالیت کارگاهی



دان خوری خودکار

بازدید از سالن مرغداری هنرستان

- ۱ با هنرآموز خود از واحد مرغداری هنرستان خود بازدید کنید.
- ۲ از روش و زمان توزیع دان در واحد مرغداری اطلاعات کسب کنید.
- ۳ تعداد دان خوری موجود در واحد مرغداری را با مقدار دان خوری مورد نیاز مقایسه کنید.
- ۴ از واحد مرغداری عکس و فیلم تهیه کنید.
- ۵ گزارش خود را به هنرآموز تحويل دهید.

خوارکدهی دستی

- ۱ لباس کار مناسب بپوشید (ماسک فراموش نشود).
- ۲ خوارک را براساس جیره تنظیم شده تهیه کنید.
- ۳ خوارک آماده را به وسیله حمل دان با احتیاط وارد سالن کنید.
- ۴ دان خوری‌ها را به میزان یک سوم از دان پر کنید.
- ۵ وسیله حمل دان و سرتاس را از سالن خارج کنید.

خوارکدهی خودکار


- ۱ لباس کار بپوشید.
- ۲ خوارک آماده را به میزان مورد نیاز در مخزن دان بریزید.
- ۳ کلید الکتروموتور را روشن کنید.
- ۴ همراه با چرخش زنجیرهای حمل دان، در سالن حرکت کنید.
- ۵ صافی‌ها را بازدید کنید.
- ۶ بعد از گذشت مدت زمان مشخص دستگاه الکتروموتور را خاموش کنید.

آیا می‌دانید مقدار خوارک مصرفی مرغ، تحت تأثیر چه عواملی هست؟ آیا تا به حال فکر کرده‌اید که مصرف غذای جوجه‌های گوشتی در شبانه روز چقدر است یا آنها در شبانه روز چند وعده غذا می‌خورند؟ چه عواملی بر اشتها مرغ تأثیرگذار است؟ جوجه‌های گوشتی و تخم‌گذار چه وقت احساس گرسنگی می‌کنند؟ نشانه‌های گرسنگی در مرغ چیست؟ آیا میزان مصرف خوارک در جوجه‌های گوشتی با مرغ‌های تخم‌گذار تفاوت دارد؟

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، موارد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۲	توزيع خوراک مرغ در سالن پرورش	برنامه خوراک دهی	توزیع صحیح خوراک توزیع نسبتاً صحیح خوراک	اجرای درست برنامه خوراک‌دهی	۳
				اجرای نسبتاً درست برنامه خوراک‌دهی	۲
				اجرای نادرست برنامه خوراک‌دهی	۱

خوراک مصرفی مرغ



از بین موارد ذکر شده بالا، اثر کدام مورد بر خوراک مصرفی مرغ از همه بیشتر است؟ با دلیل بحث کنید.

گفت و گو
کنید



برنامه تغذیه

دو نوع برنامه تغذیه داریم:

- ۱ برنامه تغذیه به روش نامحدود
- ۲ برنامه تغذیه به روش محدود

در برنامه تغذیه به روش نامحدود در صورتی که سیستم دان خوری دستی و غیرخودکار باشد باید همیشه پیش از اتمام دان روزانه ۲ یا ۳ بار دان را در تراف‌های دان خوری بریزید، به‌طوری که سطح کمی از دان همواره در دان خوری موجود باشد. وقتی از دان خوری خودکار استفاده می‌شود باید دستگاه دان خوری را به‌طور متناوب به کار بیندازید (۲۰ دقیقه روشن ۲۰ دقیقه خاموش) زمان روشن و خاموش‌شدن دستگاه را با توجه به طول سالن و مقدار دان باقیمانده در تراف و دان خوری‌ها تعیین می‌شود. مثل جوجه‌های گوشتی که به صورت نامحدود خوراک مصرف می‌کنند.

ولی در برنامه تغذیه محدود مانند تغذیه پولت، مرغ تخم‌گذار، مرغ مادر گوشتی و تخم‌گذار به مرغ‌ها مقدار مشخصی خوراک در روز داده می‌شود. برای مثال اگر گله مرغ تخم‌گذار روزی ۱۰۰ گرم دان مصرف کند برای ۱۰۰ قطعه مرغ ۱۰۰ کیلو دان روزانه در اختیار آنها قرار می‌دهند. در یک روش دیگر محدودیت غذایی می‌توان تغذیه یک روز در میان صورت پذیرد، در این روش مقدار محدودی دان در یک روز داده می‌شود و روز بعد از آن جیره‌ای نخواهد داشت.

فعالیت کارگاهی

تهیه فرم‌های مورد نیاز

جمع‌آوری و حفظ آمار به عنوان بخشی از برنامه مدیریت پرورش مرغ ضرورت دارد. بدون آمار دقیق ارزیابی اقتصادی گله‌های مرغ مشکل به نظر می‌رسد. برای این منظور باید آمارهایی در دسترس باشد (خلاصه آمار دوران رشد، خلاصه آمار تولید مرغ) که بتوان با مقایسه آنها نسبت به استاندارد، وضعیت گله را مشخص کرد.

فرم دوران رشد در جوجه‌های گوشتی

تعداد اولیه:		تاریخ تحويل جوجه:							مرغداری:	
توضیحات	ضریب تبدیل غذایی	ضریب تبدیل غذایی	مقدار آب مصرفی	وزن بدن (گرم)	صرف دان (کیلوگرم)	حذف	تلفات	تعداد جوجه‌های موجود	سن (روز یا هفته)	تاریخ

فرم ثبت میزان مصرف خوراک در مرغ‌های تخم‌گذار

توضیحات	تعداد اولیه:	تاریخ تحويل جوجه:	مرغداری:	نام کسی که فرم را پر می‌کند:								
				مقدار آب مصرفی	وزن بدن (گرم)	درصد تولید براساس تعداد مرغ‌های موجود	تولید تخم (گرم)	تولید تخم (تعداد)	محاسبه دان (کیلوگرم)	حذف تلفات	تعداد مرغ	سن (هفتاه)

فعالیت‌کارگاهی

۱ اطلاعات جمع‌آوری شده را در فرم‌های مربوطه

- ۱ کلیه کارهای زیر را در طی دوره پرورش ثبت کنید.
۲ ضریب تبدیل غذایی را محاسبه نمایید.
۳ گزارش‌های لازم را تهیه کنید و یک نسخه از آن را جهت برنامه‌ریزی‌های بعدی به مدیر مرغداری تحويل دهید.
۴ آمار تعداد جوجه‌های سالم، تلفات و حذفی موجود فرم‌ها و مدارک را بایگانی کنید.
۵ در سالن به صورت روزانه

ثبت اطلاعات

۶ کلیه کارهای زیر را در طی دوره پرورش ثبت کنید.

زمان تحويل جوجه خردباری شده.

وزن جوجه‌ها به صورت روزانه یا هفتگی.

وزن دان مصرفی به صورت روزانه یا هفتگی.

میزان آب مصرفی جوجه‌ها.

آمار تعداد جوجه‌های سالم، تلفات و حذفی موجود

در سالن به صورت روزانه

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۳	مستندسازی خوراک مصرفی	فرم آماری مخصوص مصرف خوراک و افزایش وزن و تولید تخم مرغ	مستندسازی به طور صحیح	ثبت دقیق اطلاعات و آمار خوراک مصرفی	۳
			مستندسازی به طور نسبتاً صحیح	ثبت نسبتاً دقیق اطلاعات و آمار خوراک مصرفی	۲
			مستندسازی به طور نادرست	ثبت نادرست اطلاعات و آمار خوراک مصرفی	۱

ارزشیابی شایستگی خوراک دهی مرغ

شرح کار:

- ۱- راه اندازی آسیاب، مخلوط کن (میکسر) و بالابر
- ۲- توزیع خوراک در سالن پرورش
- ۳- آسیاب و مخلوط کردن مواد خوراکی
- ۴- مستندسازی

استاندارد عملکرد:

خوراک دهی روزانه با حداقل دور ریز و اتلاف

شاخص ها:

- ۱- کار با دستگاه آسیاب، میکسر و بالابر
- ۲- توزین مواد خوراکی و اجرای برنامه خوراک دهی
- ۳- مخلوط کردن مواد طبق دستورالعمل در مدت زمان معین
- ۴- ثبت اطلاعات در نمون برگ های مربوطه

شرایط انجام کار:

لوازم و ابزار ساخت خوراک شامل آسیاب، میکسر، بالابر و ترازو
ابزار جابه جایی خوراک به سالن (دستی - مکانیزه)
فرم های آماری و شاخص های استاندارد

ابزار و تجهیزات:

ترازو - آسیاب - میکسر - بالابر - بیل - فرم های ثبت اطلاعات

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی خوراک مرغ	۱	
۲	توزیع خوراک مرغ در سالن پرورش	۲	
۳	مستندسازی خوراک مصرفی	۲	
شاخص های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: محاسبه و ریاضی، حفظ اینمنی فردی در زمان کار با آسیاب، میکسر و بالابر، استفاده از لباس کار، ماسک و دستکش، جلوگیری از اتلاف مواد خوراکی، دقت در کار، امنیت ابزار و وسایل کار			*
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری: ۱۱

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی



پودمان ۵

امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ



همیشه پیشگیری مقدم بر درمان است. با رعایت اصول بهداشتی و تغذیه سالم و رعایت رطوبت، دما و نور مناسب و کنترل ورود و خروج، از بیماری‌ها جلوگیری کنید تا هم در مصرف دارو، موادشیمیایی و هم در وقت و سرمایه صرفه‌جویی شود.

واحد یادگیری ۱۲

کنترل شرایط محیطی در سالن پرورش

آیاتا به حال پی برد؟


- ۱ نحوه تنظیم دما، رطوبت، تهویه و نور در سالن مرغداری به چه صورت انجام می‌شود؟
- ۲ اجرای برنامه نوری در سالن‌های پرورش مرغ، دارای چه مراحلی است؟
- ۳ میزان هوای مورد نیاز برای سالن مرغداری چگونه محاسبه می‌شود؟
- ۴ در فرم‌های مربوط به کنترل شرایط محیطی چه شاخص‌هایی را باید ثبت کرد؟

هدف از این بخش بررسی انواع دستگاه‌های کنترل کننده شرایط محیطی در سالن مرغداری، تنظیم و ثبت اطلاعات آنها است. ایجاد شرایط محیطی مناسب در سالن‌های پرورش طیور باعث افزایش تولید می‌شود. تجربه نشان داده است که هیچ وقت تولید و بهره کافی بدون جایگاه مناسب برای پرورش طیور امکان‌پذیر نیست. البته منظور از جایگاه مناسب، زیبایی و پرهزینه بودن آن نیست؛ سالنی مناسب است که شرایط ایده‌آل را برای رشد بهتر طیور، کاهش استرس، افزایش تولید تخم مرغ، نطفه‌داری تخم مرغ‌های جوجه‌کشی و تولید اقتصادی ایجاد کند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که کنترل دقیق شرایط محیطی یک سالن مرغداری به ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه را طبق دستورالعمل انجام دهند.

دما




درجه حرارت یکی از عوامل محیطی اصلی در پرورش طیور است. به طور کلی برای تنظیم درجه حرارت سالن‌های پرورش باید به سن، نژاد و نوع سالن توجه کنید و دمای سالن را در ابتدای دوره پرورش، مناطق سردسیر و فصل زمستان با دقت بیشتری کنترل کنید.


در هفتۀ اول دمای مناسب حدود ۳۲-۳۴ درجه است و پس از آن معمولاً هر هفته دما ۲ درجه کاهش می‌یابد تا به ۱۷-۲۱ درجه سانتی‌گراد برسد و پس از آن ثابت می‌ماند.

فعالیت کارگاهی


به تصاویر زیر نگاه کنید و علت پراکندگی جوجه‌ها در سالن پرورش را بررسی کنید.



شكل ج



شكل ب



شكل الف

درجه حرارت توصیه شده برای جوجه‌ها

دما در سیستم بسته (درجه سانتی گراد)	دما در سیستم قفس (درجه سانتی گراد)	سن به روز
۳۵	۳۳-۳۴	۱-۳
۳۳	۳۲-۳۴	۴-۷
۳۱	۲۹-۳۱	۸-۱۴
۲۹	۲۶-۲۹	۱۵-۲۱
۲۶	۲۴-۲۶	۲۲-۲۸
۲۳	۲۱-۲۳	۲۹-۳۵
۲۱	۲۱	۳۶ روزگی به بالا

گفت و گو
کنید

- ۱ گرما چگونه از سالن خارج می‌شود؟
۲ پاسخ پرندگان به افزایش دما چگونه است؟



رطوبت

رطوبت سالن مرغداری باید کنترل شود. اگر رطوبت پایین باشد پیامدهای زیر را خواهیم داشت:



افزایش گرد و خاک سالن




عارضه چسبندگی مقعد



دهیدراته شدن جوجه‌ها

اگر رطوبت سالن بیش از حد باشد موجب کاهش رطوبت در سالن شامل رطوبت مدفوع، بخارات توانایی دفع حرارت توسط پرنده، افزایش رطوبت تنفسی و آب خوری‌ها هستند. بستر و کاهش ظرفیت تنفسی پرنده می‌شود. منابع باید بدانیم که شاید دفع رطوبت در تابستان مشکل

رباباشد؛ زیرا با افزایش ظرفیت سیستم تهویه می‌توان رطوبت را از سالن خارج کرد؛ ولی در زمستان به دلیل پایین بودن قدرت نگهداری رطوبت هوای سرد سالن است؛ زیرا با افزایش دمای هوای قدرت جذب و مشکل بودن افزایش سرعت تهویه ممکن است رطوبت هوای افزایش می‌یابد.



تأمین رطوبت سالن توسط نازل‌های تحت فشار

در بستر و قفس رطوبت نسبی ۴۰-۵۰ درصد توصیه شده است. رطوبت مناسب بستر برای جوجه‌های در حال رشد ۲۰-۴۰ درصد و برای پرندگان بالغ ۱۰-۳۰ درصد است. برای جوجه‌های تخم‌گذار حدود ۶۰-۷۰ درصد باشد چنانچه رطوبت به زیر ۵۰ درصد بر سد جوجه‌ها دهیدراته می‌شوند و پس از آن رطوبت مناسب هوای سالن بسته به دمای هوای شرایط پرندگان در حدود ۶۰ درصد است. برای جوجه‌های تخم‌گذار



رطوبت سنج عقربه‌ای


رطوبت سنج و دماسنجدیجیتال

رطوبت + درجه حرارت = ۸۰

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{قانون ۱۰۱} \\ \text{رطوبت + درجه حرارت} > 101 \end{array}}$$

توجه کنید

قانون مهم



وضعیت رفتاری مرغ در حالت استرس گرمایی

تهویه

- ۱ تأمین اکسیژن کافی
- ۲ خروج گازهای سمی تهییه می‌گویند. سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مکمل‌های سیستم‌های تهییه هستند.
- ۳ خروج رطوبت اضافی از سالن تنظیم رطوبت بستر
- ۴ اهداف تهییه مناسب در سالن تنظیم حرارت سالن
- ۵ دفع آمونیاک

نرخ تهويه: مقدار مبادله هوا در يك زمان معين را نرخ تهويه گويند. در تهويه باید ۴ عامل مهم اکسيژن، سرعت جريان هوا، دما و رطوبت نسبی به طور روزانه مورد توجه قرار گيرند. بدین منظور می‌توان از وسایلی مانند رطوبت سنج، دماسنج، بادسنج و ... استفاده کرد.



دستگاه سنجش
دی اکسیدکربن



دستگاه سنجش آمونیاک



رطوبت سنج




بادسنج


شريطي که همواره در سالن باید شاهد آن باشيد اين است که برخي از پرندهها در حال خوردن دان، برخي در حال نوشیدن آب، برخي در حال استراحت کردن، برخي در حال بازي کردن و برخي در حال جيک جيک کردن باشند.



وضعيت رفتاري جوجهها



ساختار مولکولي آمونياک



میزان گاز دی اکسیدکربن در هوایی که ما تنفس می‌کنیم در حدود ۴۰۰ قسمت در میليون است. با افرايش میزان دی اکسیدکربن، میزان اکسيژن هوا کاهش می‌يابد.

گاز سمی آمونياک به طور مداوم از تجزيه اسيداوريک موجود در كود مرغ توسط باكتريها توليد می‌شود و

افزایش غلظت آمونیاک در هوا سبب بروز بیماری‌های تنفسی و یا افزایش حساسیت به بیماری‌های تنفسی و کاهش رشد می‌شود.

در غلظت ۲۰ قسمت در میلیون یا بالاتر در هوا با بوکردن قابل تشخیص است؛ اما بسیاری از مرغداران به بُوی آن عادت کرده‌اند و متوجه نمی‌شوند و



میزان آمونیاک هوا باید کمتر از ۱۰ قسمت در میلیون باشد



مسومیت با آمونیاک

تحقیق
کنید

نرخ تهویه تابع چه عواملی است؟





أنواع تهويه

به طور کلی دو نوع تهويه وجود دارد:

۱. تهويه طبيعى




۲ تهویه مکانیکی



مکش هوا از سالن توسط فن ها

تهویه ممکن است به صورت های زیر باشد:

الف) تهویه فشار منفی: در این نوع تهویه هوا از یک طرف توسط هواکش ها خارج شده و به دلیل ایجاد خلا از طرف دیگر هوا وارد سالن می شود. همچنین میزان هوا خروجی بیشتر از هوا ورودی است.



هوای منافذ سالن خالی می شود
هوای توسط نیروی مکانیکی به سالن دمیده می شود.


ب) تهویه فشار مثبت: در این سیستم هوا تمیز توسط فن وارد سالن شده و از طرف دیگر هوای آلوده خارج می شود.

ج) تهویه با فشار مساوی: در این نوع تهویه میزان هوای ورودی و خروجی برابر است.




امروزه معمولاً از کدام شکل تهویه در سالن‌های مرغداری استفاده می‌شود؟ چرا؟

در تقسیم‌بندی دیگر ممکن است تهویه به صورت پدهای خنک‌سازی تبخیری، مه‌پاش‌ها و ترکیبی عرضی، تونلی (طولی)، سقفی، تونلی-سقفی، انتقالی، باشد.




در تهویه تونلی اگر طول سالن بیش از ۶۰ متر باشد و می‌توان ورودی هوا را در مرکز سالن و هوکش‌ها را سرعت جریان هوا بیش از میزان نیاز تأمین شود در دو انتهای یا برعکس، نصب کرد.




تهویه تونلی

تفسیر خود را از شکل‌های صفحه بعد بیان کنید.






برای مناطق بسیار گرم و یا سالن‌های با عرض بیش از ۱۲ متر و همچنین برای مناطق سردسیر می‌توان از تهویه سقفی استفاده کرد.



در حالت معمول توصیه می‌شود که هوکش‌ها در ارتفاع ۶۰-۷۰ سانتی‌متری و هواده‌ها در ارتفاع ۱۲۰ سانتی‌متری از کف نصب شوند.

نکته






تهویه انتقالی (تهویه زمستانه)



استفاده از سیستم مه پاش



- ۱ آیا میزان تراکم در گله پولت با گوشتی تفاوت دارد؟
 ۲ در شرایط آب و هوایی گرم تراکم گله در واحد سطح به چه عواملی بستگی دارد؟

تحقیق
کنید



سیستم‌های گرمایشی

که معمولاً در وسط سالن چنین شرایطی حکم فرما است. این هیترها باید در ارتفاع $1/4\text{--}1/5$ متر از کف نصب شوند تا هیچ گرد و خاکی در سطح جوجه‌ها ایجاد نکنند.

۱ هیترهایی که هوا را با فشار بیرون می‌دهند: لازم است که این هیترها را در بخشی از سالن نصب کنید که جایه‌جایی هوا کم و در حدی باشد که امکان گرم کردن هوا را در حد مطلوب ایجاد کند،

هیترهای فشار قوی را هرگز نباید در محل دریچه ورودی نصب کرد، چرا؟

گفت و گو
کنید




هیتر صنعتی



هیتر گازی



هیتر برقی



گرمایش تابشی



جت هیتر

۲ مادرهای مصنوعی یا گرمایشی: سیستم‌های گرمایشی به جوچه اجازه می‌دهد تا گرمایهای تشعشعی به منظور گرم کردن بستر در محلی را که در آن احساس راحتی می‌کند، پیدا سالن‌های مرغداری به کار می‌روند. استفاده از این کند.



مادر مصنوعی

۳ گرمایهای زیرزمینی: در این سیستم گرمایش، سن گله، پرنده‌ها قادر خواهند بود که حرارت داخلی آب داغ در لوله‌هایی که زیر کف سالن تعییه می‌شود بدن خود را تنظیم کنند. در سن ۴۱ روزگی، می‌توان جریان یافته و گرما بین کف گرم سالن، بستر و فضای از هیترهای فشاری به عنوان منبع اصلی گرمایش استفاده کرد. گرمادههای تشعشعی معمولاً در سالن مبادله می‌شود.

توصیه‌ها: استفاده توانم از حرارت‌زاهم تشعشعی و سالن‌های با عایق‌بندی نامناسب به عنوان منبع اصلی هیترهای متداول پیشنهاد شده است. گرماده تشعشعی گرمایا بکار می‌روند؛ در حالی که هیترهای فشاری را در سالن‌های با عایق‌بندی صحیح و درزگیری شده در سالن منبع اولیه گرمایا در ۴۱ روز ابتدایی پرورش کاربرد دارد. این هیترها حرارت مازاد و کمکی را در شرایط آب و هوایی سرد فراهم می‌کند. با افزایش

سیر تکامل گرمایش در مرغداری



جت هیتر




هیتر



بخاری

با توجه به اینکه ۸۰ درصد سطح تبادل حرارتی با محیط خارج را سقف سالن تشکیل می‌دهد، طراحی سقف دو پوسته‌ای، عایق‌بندی و درز دوزی حرارتی کامل آن امری ضروری است.



Roberto سالن را می‌توان از روش‌های زیر تأمین کرد:



۲ تأمین رطوبت سالن از طریق نازل‌های تحت فشار



۱ آب پاشی قسمتی از سالن به منظور تأمین رطوبت



۴ کanal هوای گرم و مرطوب در بالای سر جوجه‌ها



۳ کanal پلاستیکی هوای گرم در روی زمین

راهکارهای کاهش رطوبت سالن

۱ کنترل تهویه سالن

۲ افزایش قدرت گرم‌کننده‌ها (۵/۰ درجه افزایش دما موجب افزایش ۵ درصدی قدرت جذب هوا می‌شود).

۳ زیر و رو کردن پوشال (هفت‌های یک‌مرتبه در ساعت گرم روز) و ریختن پوشال تازه

۴ جلوگیری از اسهال و مصرف زیاد آب



اسهال یا مدفوع آبکی



رطوبت محیط و سطوح



بستر کیکی

میزان دی‌اکسیدکربن در هوای تنفسی پایین‌تر از ۳۰۰۰ قسمت در میلیون نگه داشته شود.

نکته مهم



مناسب است که سیستم تهویه حداقلی از روز اول ایجاد شود؛ چون سبب تأمین هوا تازه در فواصل زمانی مکرر و منظم می‌شود. اگر ناچار به انتخاب هستید، حفظ دما باید مقدم بر حفظ تهویه باشد.

تحقیق
کنید

۱ انواع گازهای زیان‌آور در سالن پرورش را نام ببرید؟

۲ افزایش گازهای مضر در هوای تنفسی پرندگان چه اثرات منفی را در بر خواهد داشت؟




تهویه عرضی

تهویه عرضی متدائل ترین نوع تهویه حداقلی است. در این نوع تهویه از تعداد زیادی ورودی هوا که به طور یکنواخت در دو دیوار جانبی قرار داده شده‌اند استفاده می‌شود.

نکته

فن‌های تهویه حداقلی اغلب در دیوارهای جانبی نصب می‌شوند، در غیر این صورت از یک یا چند فن تونلی انتهای سالن استفاده می‌گردد. این فن‌ها توسط تایمیر کار می‌کنند.



محاسبه هوای مورد نیاز: در روز اول سرعت حرکت هوا باید حداقل $1/10$ متر در ثانیه باشد. اگر سرعت حرکت هوا در سطح جوجه از $1/10$ متر بر ثانیه افزایش یابد، دمای بدن 2 درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت. با پر در آوردن جوجه از تأثیر این عامل کاسته می‌شود. در 4 هفتگی افزایش $5/5$ متر بر ثانیه در سرعت هوا باعث کاهش دمای بدن جوجه به میزان 1 درجه سانتی‌گراد می‌شود.

جهت محاسبه میزان سطح ورودی هوا و میزان هوای تخلیه شده در سیستم تونلی دو روش وجود دارد:
(الف) به طور متوسط برای هر کیلو وزن زنده موجود در سالن به $5-12$ متر مکعب هوا در ساعت نیاز داریم و برای هر 1000 متر مکعب هوا باید 30 متر مربع ورودی هوا تعییه شود.

ب) استفاده از فرمول زیر

$$3600 \times \text{سطح مقطع سالن} (\text{متر مربع}) \times \text{سرعت هوا (متر در ثانیه)} = \text{خروج هوا (متر مکعب در ثانیه)}$$

نکته

تنظیم تایمیر فن برای حداقل نرخ تهویه مناسب با توجه به سن پرنده ضروری است.



میزان هوای مورد نیاز در ساعت برای یک سالن مرغداری گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه با وزن پایانی $2/5$ کیلوگرم چقدر است؟

پرسش



محاسبه تعداد هواکش مورد نیاز

برای این منظور هوای مورد نیاز محاسبه شده را تقسیم بر قدرت یا ظرفیت هواکش می کنیم.

گفت و گو
کنید



۱ در مناطق گرمسیر بهتر است میزان هوای مورد نیاز بر اساس سرعت جریان هوای محاسبه شود. چرا؟

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری/نمره‌دهی)	نمره
۱	درباره و بررسی دستورالعمل‌های مربوط به شرایط محیطی	بروشورهای پرورش سویه‌های مختلف	۱- تعیین دما و رطوبت نسبی مناسب برای هر سن	تطابق شرایط محیطی تعیین شده با دستورالعمل	۳
			۲- عدم تعیین دما و رطوبت نسبی مناسب برای هر سن	تطابق نسی شرایط محیطی تعیین شده با دستورالعمل	۲
				عدم تطابق شرایط محیطی تعیین شده با دستورالعمل	۱

فعالیت کارگاهی

۱ امکانات و تجهیزات مورد نظر را به منظور تأمین

گرما و رطوبت با دقت کامل نصب و تنظیم کنید.

۲ دما و رطوبت سالن را طبق مقادیر توصیه شده در

جدول استاندارد هر سویه (بر اساس سن، وزن و ...) در طول دوره تنظیم کنید.

۳ به منظور کنترل دما و رطوبت نصب تعداد کافی دماسنج و رطوبت‌سنج در محل و ارتفاع مناسب ضروری است.

۴ هر ساعت دما و رطوبت را با دماسنج و رطوبت‌سنج اندازه گرفته و در فرم مربوطه ثبت کنید.

۵ هنرجویان قرنطینه و بهداشت را رعایت کرده لباس‌های مرتب و چکمه تمیز و عاری از آلودگی و رطوبت سالن را بررسی کنید. وضعیت پرندگان بهترین معیار برای بررسی دمای سالن است.

تنظیم دما و رطوبت سالن

ابزار و وسائل مورد نیاز

لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی (دستکش، ماسک)

وسایل گرم‌کننده مانند هیتر، مادر مصنوعی و ...

آب و مه پاش برای تأمین رطوبت

دماسنج

رطوبت‌سنج

۶ تایмер

مراحل انجام کار

۱ هنرجویان قرنطینه و بهداشت را رعایت کرده لباس‌های مرتب و چکمه تمیز و عاری از آلودگی و پرندگان را بررسی کنید. وضعیت پرندگان بپوشند.

۷ در روزهای ابتدایی هیترها طوری تنظیم شوند که با کاهش اندازه دمای هوا از دمای مورد نظر خاموش شوند. کاهش ۵/۰ درجه هیترها روشن شوند و همچنین

چنانچه رطوبت سالن پایین تر از مقادیر مذکور در جدول استاندارد هر سویه باشد، درجه حرارت را به میزان 1°C - 5°C افزایش و نیز اگر رطوبت از مقادیر ذکر شده در جدول بالاتر باشد، درجه حرارت را 5°C - 1°C کاهش دهید.

توجه



۱. ارتفاع مناسب برای نصب دماسنجد چقدر است؟
۲. بهترین محل نصب دماسنجد و رطوبت‌سنج در سالن با بستر پوشال و قفس کجاست؟

گفت و گو
کنید

تنظیم تهویه
ورودی‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند باید به میزان بازبودن دریچه‌های ورودی‌ها نباید از ۵ فواصل یکسان در طول سالن پخش شده و همه‌شان به سانتی‌متر کمتر باشد. در غیر این صورت ورودی‌ها یک اندازه باز شوند. میزان باز بودن ورودی‌ها با کمک موتور نصب شده در دیوار جانبی سالن تنظیم می‌شود.




دریچه‌های ورودی هوا (اینلت)

ورودی‌های هوا هرچه به سقف نزدیک‌تر باشند بهتر است. باید هیچ‌گونه مانعی در سطح داخلی سقف باشند که هوا نتواند از طرفین یا پایین دریچه‌شان وجود نداشته باشد تا هوا بتواند از ورودی‌ها به طرف وارد شود.

تهویه تونلی

این نوع تهویه در زمانی که هوا گرم شده و معمولاً هنگامی که پرندگان بزرگ‌تر شده‌اند استفاده تهویه انتقالی قادر به حفظ راحتی پرندگان نباید. می‌شود.



جهت حرکت جریان هوای سالن در روش تهویه تونلی


در طول تهویه تونلی مقدار زیادی هوا در طول سالن شوند باید تا حد ممکن به صورت قرینه نصب شوند. حرکت کرده و هوای سالن در کمتر از یک دقیقه ورودی‌های هوا باید در انتهای مخالف سالن نسبت به فن‌ها نصب شوند و اندازه‌شان در دو دیوار جانبی تعویض می‌شود. فن‌ها می‌توانند در دیوار انتهایی، انتهای دیوارهای جانبی و یا هر دو محل نصب شوند. هرجا که نصب یکسان باشد.



هنگام تصمیم‌گیری در مورد تنظیمات تهویه تونلی به رفتار مرغ‌ها در سالن توجه کنید.


گفت و گو
کنید

به شکل های زیر که تهویه تونلی در سالن را نشان می دهد با نهایت دقیق نگاه کنید و علت وجود نقاط کور در سالن را پیدا کنید؟




پدهای خنک کننده تبخیری

پدهای خنک کننده تبخیری باید در طرف مخالف سالن نصب به فن های تونلی نصب شوند و در هر دیواره جانبی نصف مساحت پدها قرار گیرد.



میزان سردکنندگی پدهای خنک کننده تبخیری بستگی به میزان رطوبت نسبی محیط دارد.



پد خنک کننده تبخیری

سیستم فازل مهپاش



- ۱ در این سیستم سرعت هوا نباید بالای $2/5$ متر بر ثانیه باشد تا فرصت خنک کنندگی بیشتر برای ذرات تبخیری در کار نخواهد بود.
- ۲ آب باید در ارتفاع $1/5$ متری تبخیر شود و به سطح پرندهها نرسد تا آنها را خیس نکند.
- ۳ در دمای زیر 28 درجه استفاده نشود؛ چرا که آب فراهم گردد.

ذرات آب پاشیده شده توسط نازل‌ها نباید به هم تصادم کنند و باعث ایجاد قطره‌های درشت‌تر شوند؛
چرا که منجر به تبخیر نامناسب و رطوبت بستر خواهد شد.

توجه



میزان خنک‌کنندگی پدهای تبخیری بیشتر است یا مه‌پاش؟

تحقیق
کنید



نور و روشنایی



نور طبیعی به وسیله خورشید تولید می‌شود و مقدار آن به طول روز، مقدار آب وجود گرد و غبار بستگی دارد.
سالن‌های باز پرورش طیور به نور خورشید وابسته‌اند.
در مقابل سالن‌های بسته فقط از نور مصنوعی استفاده می‌کنند. برنامه‌های نوری باید به سهولت قابل اجرا باشند. برنامه‌های نوری

پیچیده رسیدن به موفقیت را مشکل می‌سازند.
شدت روشنایی با واحد لوکس سنجیده می‌شود. ۱۰
لوکس حدود ۱ فوت کندل است.

در هنگام جمع آوری و گرفتن مرغ جهت کشتار بهتر است از یک یا چند لامپ آبی رنگ استفاده شود.
برای جلوگیری از بروز و یا شیوع کانیبالیسم بهتر است از نور قرمز استفاده شود.
اندازه گیری شدت روشنایی با دستگاهی به نام نورسنج یا لوکس متر انجام می‌شود.

ویژگی‌های یک برنامه نوردهی ایده‌آل

۱ جوجه‌ها را در چند روز اول جوجه‌ریزی به شدت به آب و دان خوردن تحریک و تشویق کنید.

۲ فعالیت و وقوع رفتارهای تهاجمی در طی دوره پرورش را کنترل کنید.

۳ موجب افزایش سطح فعالیت پرنده جهت اطمینان از سلامت و استحکام اسکلتی شود.

۴ تنظیم رشد و تکامل سیستم تولید مثلی گله را انجام دهد.



لوکس متر

توجه



- ۵ با تحریک نوری باعث تحریک و توسعه سیستم تولیدمثلی مرغ های گله بشوید.
 ۶ ایجاد شرایطی برای تخم گذاری با توالی طولانی (درصد تولید و ماندگاری بالا در زمان حداکثر تولید).
 ۷ تأمین و فراهم کردن شرایط برای عدم تمایل مرغ به تخم گذاری روی بستر و نرده ها.

در زمان تاریکی باید شدت نور کمتر از $4/0$ لوکس باشد. باید مواظب باشید که نور از ورودی های هوای فن ها و چارچوب درها به داخل سالن نشود.

منبع نوری مورد استفاده برای مرغ



تنگستن



فلورسنت



گفت و گو
کنید

در باره مزايا و معایب استفاده از هر کدام از منابع نوری در سالن مرغداری گفت و گو کنيد.



برنامه نوری



لامپ های LED

برنامه نوری جوجه های گوشتی


برنامه نوری جوجه های گوشتی به ۲ بخش برنامه روز کوتاه و برنامه نوری متناوب دسته بندی می شوند.

در جوجه های گوشتی ۴۸ ساعت اول شدت نور، حداقل 20 لوکس در مدت 24 ساعت است.

تا 21 روزگی کاهش تدریجی شدت نور به $10-20$ لوکس، 23 ساعت روشنایی و 1 ساعت خاموشی است.

از 21 روزگی تا کشتار 10 لوکس، 23 ساعت روشنایی و 1 ساعت خاموشی.

در روزهای اول شدت بالا برای یافتن دان و آب توسط جوجه ها و کاهش شدت بعد از آن جهت کاهش تحرک و افزایش رشد و بازده خوراک، لازم است.



ساعت خاموشی و روشنایی در برنامه نوری

برنامه نوری متناوب در جوجه‌های گوشتی

توزیع دوره‌های نوری و خاموشی می‌تواند تعديل شود که به آن برنامه نوری متناوب می‌گویند.

برنامه نوری متناوب شامل بلوک‌های زمانی هم برای دوره تاریکی و هم برای دوره روشنایی است که در سرتاسر ۲۴ ساعت تکرار می‌شوند؛ مثلاً ۲ ساعت روشنایی و ۴ ساعت تاریکی که روزانه ۴ بار تکرار می‌گردد.

مزایا و معایب برنامه نوری روزکوتاه و متناوب را بیان کنید.

تحقيق
کنید



برنامه نوری گله‌های تخم‌گذار تجاری

۱ ۴۸ ساعت اول ۱۰ لوكس به صورت مداوم.

۲ از روز سوم تا هفته سوم شدت ۵ لوكس به مدت ۱۵ ساعت.

۳ تا ۱۸ هفتگی شدت ۵ لوكس به مدت ۱۲-۱۵ ساعت.

۴ در ۱۸ هفتگی در صورت رسیدن وزن به $1/27$ کيلوگرم، زمان نور را ۱ ساعت افزایش دهید، پس از آن هر هفته ۳۰ دقیقه مدت نور را افزایش دهید تا به ۱۶-۱۷ ساعت برسانید. شدت نور (۱۰-۲۰ لوكس) بهتر است تا زمان حداکثر تولید تخم مرغ برنامه نوری کامل شود.

توجه

در زمان تولید هیچ‌گاه شدت یا مدت نور را کاهش ندهید.

برای سالن‌های پرورش بسته و یا باز به راهنمای پرورش مرغ تخم‌گذار مراجعه کنید.



فعالیت کارگاهی

- ۱ با راهنمایی هنرآموز واحد آموزشی از واحد مرغداری منطقه خود بازدید کنید.
- ۲ از تجهیزات گرم‌کننده سالن‌های مرغداری عکس و گزارش تهیه کنید.
- ۳ از تجهیزات خنک‌کننده سالن‌های مرغداری عکس و گزارش تهیه کنید.
- ۴ از سیستم تهویه هوا در مرغداری گزارش تهیه کنید.
- ۵ سیستم کنترل نور را در سالن مرغداری منطقه، با تهیه عکس و گزارش توصیف کنید.
- ۶ درباره نتایج به دست آمده در کلاس درس بحث کنید.

پژوهش
کنید



عملکرد سویه مورد نظر را با استانداردهای داده شده در دفترچه راهنمای پرورش مقایسه کنید و در صورت عدم مغایرت با استانداردها، علت را بررسی کنید.

فعالیت کارگاهی

تنظیم نور سالن مرغداری

- ۱ لباس کار مناسب بپوشید.
 ۲ لامپ‌ها را در ارتفاع مناسب ۲/۴-۲/۱ متر نصب کنید.
 ۳ لامپ‌ها را در ۳ یا ۴ ردیف و به صورت زیگزاگ مناسب به تعداد کافی در سالن نصب کنید.
 ۴ فاصله لامپ از دیوار حدود نصف فاصله لامپ‌ها از یکدیگر باشد.

ابزار و وسائل مورد نیاز

- لباس کار چکمه ماسک نورسنج لامپ در سالن نصب کنید.
 ۵ فاصله بین لامپ‌ها ۱/۵ برابر ارتفاع دیوار باشد.
 ۶ ابتدا تعداد لامپ‌های مورد نیاز در سالن را محاسبه کنید.

مراحل انجام کار

انعکاس دهنده نور (به قطر ۳۰-۲۵ سانتی متر) می‌تواند شدت نور را تا ۵۰ درصد افزایش دهد.

توجه



- ۷ برنامه نوری مورد نظر را بر اساس پیشنهاد دفترچه لامپ‌ها را هر هفته یا دو هفته یکبار تمیز کنید. پرورش اعمال کنید.

نکته



تنظیم شدت نور توسط دیمر صورت می‌گیرد. شدت نور را می‌توان توسط دستگاه نور سنج (لوکس‌متر) سنجید.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/ نمره‌دهی)	نمره
۲	۲	برروشورهای دستگاه‌ها، هیتر دستگاه‌های خنک‌کننده مه‌پاش، هوایش کنترل شرایط محیطی	۱- تنظیم دما و رطوبت نسبی مناسب برای هر سن ۲- عدم تنظیم دما و رطوبت نسبی مناسب برای هر سن	پراکندگی یکنواخت جوجه‌ها در سالن	۳
				پراکندگی نسبتاً یکنواخت جوجه‌ها در سالن	۲
				پراکندگی غیریکنواخت جوجه‌ها در سالن	۱

فعالیت کارگاهی

ثبت اطلاعات شرایط محیطی



ابزار و وسائل مورد نیاز

- لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی (دستکش و ماسک)
- فرم مخصوص
- خودکار ساعت
- رطوبت سنج
- دماسنج
- لوکس متر
- بادسنجد

مراحل انجام کار

- ۱ هنرجویان لباس‌های مرتب و چکمه تمیز و عاری از آلودگی بپوشند.
- ۲ دما، رطوبت، میزان تهویه و شدت نور را در هر ساعت کنترل کنند.
- ۳ میزان دما، رطوبت، میزان تهویه و شدت نور را با هر مراجعه در فرم مربوطه یادداشت کنند.
- ۴ دما، رطوبت، میزان تهویه و شدت نور ثبت شده را با اعداد و ارقام توصیه شده در دفترچه راهنمای سویه مقایسه کنند.

نمونه فرم اطلاعات شرایط محیطی مرغداری

سالن شماره:

نام مرغ مادر:

تاریخ ورود جوجه:

نام جوجه کشی:

تعداد کل جوجه:

نژاد:

تاریخ سن (روز)	ساعت	تلفات	حذف (سانانی گراد)	حداقل دما (سانانی گراد)	حداکثر دما (سانانی گراد)	رطوبت (درصد)	شدت نور (لوکس)	تهویه	ملاحظات

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۳	بررسی حس‌گرهای کنترل شرایط محیطی	دماسنچ، رطوبت‌سنج، ترموستات، تایмер	۱- کنترل دقیق و مرتب حس‌گرها ۲- عدم کنترل دقیق و مرتب حس‌گرها	حفظ شرایط محیطی مطلوب (دما، رطوبت‌نسبی و تهویه، نور)	۱
				حفظ شرایط محیطی نسبتاً مطلوب (دما، رطوبت نسبی، تهویه و نور)	۲
				ایجاد شرایط محیطی نامطلوب (دما، رطوبت‌نسبی و تهویه)	۱
۴	ثبت اطلاعات حس‌گرها	فرم‌های مربوط به ثبت اطلاعات	۱- اطلاع دقیق از شرایط محیطی سالن جهت مدیریت ۲- اطلاع نسبی از شرایط محیطی سالن جهت مدیریت ۳- عدم اطلاع از شرایط محیطی سالن	ثبت روزانه شرایط محیطی (دما، رطوبت نسبی و ...)	۳
			ثبت نامنظم شرایط محیطی (دما، رطوبت نسبی و ...)	۲	
			عدم ثبت روزانه شرایط محیطی (دما، رطوبت نسبی و ...)	۱	

ارزشیابی شایستگی کنترل شرایط محیطی در سالن پرورش

شرح کار:

- ۱- دریافت و بررسی دستورالعمل های مربوط به شرایط محیطی
- ۲- تنظیم دستگاه های کنترل شرایط محیطی
- ۳- بررسی حسگرهای
- ۴- مستند سازی

استاندارد عملکرد:

کنترل دقیق شرایط محیطی سالن ۵۰۰۰ قطعه ای طبق دستورالعمل

شاخص ها:

- ۱- تعیین دما، رطوبت نسبی و میزان تهویه متناسب با نوع و سن پرنده
- ۲- تطبیق دما، رطوبت نسبی و میزان تهویه متناسب با دستورالعمل پرورش
- ۳- کنترل شرایط محیطی
- ۴- ثبت اطلاعات

شرایط انجام کار:

تهیه دستورالعمل های مربوط به بررسی و تعیین دما، رطوبت نسبی، تهویه و ... با توجه به نوع و سن پرنده
دستگاه های کنترل کننده شرایط محیطی سالن

ابزار و تجهیزات:

وسایل سرمایشی و گرمایشی - دماسنج - رطوبت سنج - نمونبرگ های مربوط به ثبت شرایط محیطی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	دریافت و بررسی دستورالعمل های مربوط به شرایط محیطی	حذاقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	دستگاه های کنترل کننده شرایط محیطی	۲		
۲	بررسی حسگرهای کنترل شرایط محیطی	۲		
۳	ثبت اطلاعات حسگرها	۱		
۴	شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: استفاده از تجهیزات کم مصرف و استاندارد جهت کاهش آلودگی هوا، دقت در کار، امنیت ابزار و وسایل کار محاسبه و ریاضی، حفظ ایمنی فردی، استفاده از لباس کار، ماسک و دستکش	۲	*	
میانگین نمرات				

* حذاقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری: ۱۲

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

واحد یادگیری ۱۳

تولکبری اجباری

آیا قابه حال پی بوده‌اید؟

- ۱ در چه زمانی باید اقدام به اجرای برنامه تولکبری در گله تخم‌گذار کرد؟
- ۲ برای اجرای برنامه تولکبری چه روش‌هایی به کار می‌رود؟
- ۳ نوردهی بر روند تولید تخم مرغ چه اثری دارد؟
- ۴ چه جیره‌هایی در برنامه تولکبری برای مرغ‌های تخم‌گذار استفاده می‌شود؟
- ۵ تغییرات نوری و دما بعد از تولکبری چگونه خواهد بود؟

هدف از این بخش بررسی علل اجرای برنامه تولکبری در مرغ‌های تخم‌گذار، انواع روش‌ها و نحوه اجرای برنامه تولکبری است. تولکبری در واقع روشی برای استراحت کوتاه‌مدت پرندگان بعد از یک دوره طولانی تولید است که بعد از آن می‌توانند به تولید خود برای یک دوره دیگر ادامه دهند. تولکبری اجباری به عنوان یک عمل بی‌خطر و اقتصادی در گله‌های تخم‌گذار تجاری و مادرگوشتشی مورد توجه قرار گرفته است. استراحت دادن به گله بسته به نوع مدیریت و محرومیت غذایی حداقل یک و حداقل ۶-۸ هفته به طول می‌انجامد. استراحت کوتاه‌مدت با کاهش میزان تولید و کیفیت پوسته تخم مرغ و استراحت بلند‌مدت با افزایش میزان تولید و بالا بردن کیفیت پوسته تخم مرغ همراه است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که زمان و روش مناسب تولکبری را برای یک مرغداری تخم‌گذار به ظرفیت ۲۰۰۰ قطعه اجرا کنند.

زمان تولکبری

(Three cycle) و به سه دوره‌ای (Two cycle) می‌گویند.

تولید یک دوره‌ای معمولاً تا سن ۸۰ هفتگی، تولید دو دوره‌ای تا سن ۱۱۰ هفتگی و تولید سه دوره‌ای حدوداً تا ۱۴۰ هفتگی طول می‌کشد (تولید از حدود ۲۰ هفتگی آغاز می‌شود).

سن مناسب تولکبری ۶۵-۷۰ هفتگی است و میزان تولید در دوره پس از تولک بری حدود ۹۲-۹۴ درصد تولید دوره اول خواهد بود. به عبارت دیگر حداقل تولید دوره دوم ۷-۱۰ درصد کمتر از دوره اول خواهد بود یا تولید، تلفات و کیفیت پوسته پس از تولک بردن مشابه سن ۴۰-۴۵ هفتگی خواهد بود.

بهترین سن برای تولکبری معمولاً هفته ۶۵ است.

تصمیم برای اجرای تولک اجباری در یک گله، باید بر اساس اصول مدیریتی و از طریق تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی مرغدار باشد. مرغدار می‌تواند زمان تولکبری را طوری تنظیم کند تا بیشترین تولید تخم، زمانی باشد که قیمت تخم مرغ بالا است. اگر قیمت تخم مرغ بالا باشد و کیفیت آنها خوب باشد، بیشتر تولید کنندگان زمان برنامه تولکبری را به تأخیر می‌اندازند و اگر کیفیت پوسته و قیمت تخم مرغ پایین باشد، برنامه تولکبری زود هنگام به کار برده می‌شود.

تولکبری در حقیقت دادن استراحت به گله است: دوره‌های تولید در مرغ‌های تخم‌گذار ممکن است یک یا چند دوره باشد که به تولید یک دوره‌ای (Single-cycle) و تولید دو دوره‌ای

نکته

باید گله‌های سالم و با تولید خوب را تولک برد مگر اینکه تولید گله به خاطر مشکلات مدیریتی (و نه به خاطر مشکلات فیزیولوژیکی پایین باشد) که در این صورت ممکن است تولید گله پس از تولکبری بهبود پیدا کند.



در تصویر تفاوت اندازه و کیفیت تخم‌مرغ‌ها را در صورت اجرا یا عدم اجرای برنامه تولک مشاهده می‌کنید

شرایط تولک بردن اجباری

در صد تخم‌گذاری، کیفیت پوسته و کیفیت مواد درون تخم مرغ بهتر خواهد بود با وجود این، انداره تخم مرغ جدا از این موارد بوده و پس از برگشت تولید افزایش خواهد داشت با میزان جیره غذایی می‌توان طول دوره استراحت را تنظیم کرد. این برنامه با استفاده از جیره‌های با پروتئین و کلسیم پایین انجام می‌شود. جیره غذایی در این مدت می‌تواند غلات همراه با مکملهای معدنی و ویتامینی در حد پرورش باشد.

۱ برگرداندن گله به تولید: برای بازگرداندن مجدد گله به دوره تولید باید از جیره تولید همراه با اجرای برنامه نور مناسب استفاده شود. میزان تولید باید در مدت ۲-۳ هفته به ۵۰ درصد برسد و به دنبال آن گله تخم‌گذار بتواند پس از گذشت ۲-۴ هفته بعد به حداکثر تولید برسد.

برای پروری اجباری، برنامه‌هایی موفق ترند که باعث حداقل استرس به گله شوند و پس از گذراندن دوره تولک، تولید دوباره تخم مرغ به سرعت آغاز گردد. برای انجام این برنامه می‌توان از سه عامل اصلی زیر نام برد:

۱ آغاز تولک بری: در تمام برنامه‌های تولک بری لازم است که میزان تولید تخم مرغ به صفر کاهش یابد. این عمل با حذف دان و یا محدودیت مواد مغذی اصلی مثل پروتئین یا کلسیم یا سدیم یا آب صورت می‌گیرد، نور در این مرحله باید حداکثر ۸ ساعت باشد.

۲ استراحت گله: ممکن است بین ۱ تا ۵ هفته به گله استراحت داده شود؛ هر قدر زمان استراحت کمتر باشد به همان اندازه برگشت به حداکثر تولید سریع تر صورت می‌گیرد. هرچند که در استراحت بلندمدت حداکثر تولید برسد.

در سال‌های اخیر چرا برنامه تولک بری از سوی سازمان دامپژوهشی ممنوع گردیده است.

تحقیق
کنید



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	آمده کردن گله برای تولک بری	دیمیر - تایمر فرم‌های استاندارد مربوطه شرایط بازار	۱- آمده شدن مناسب مرغ‌ها جهت تولک بری ۲- آمده شدن نسبتاً مناسب مرغ‌ها جهت تولک بری ۳- عدم ایجاد آمادگی لازم برای تولک بری مرغ	افزایش مناسب نور طی ۴ هفته	۳
				افزایش نسبتاً مناسب نور طی ۴ هفته	۲
				افزایش نامناسب نور طی ۴ هفته	۱

دلایل اجرای برنامه تولکبری در مرغ‌های تخم‌گذار

کاهش وزن باید به دقت در مرحله گرسنگی مشخص گردد و با وزن هدف در مرحله پیش از تولکبری مقایسه شود.

مدت زمان گرسنگی

بیشتر برنامه‌های تولکبری مستلزم استفاده از گرسنگی برای توقف تخم‌گذاری است. مطالعات زیادی در مورد مدت زمان گرسنگی انجام شده است. برخی از محققین به این نتیجه رسیده‌اند که طول مدت گرسنگی باید تا زمان رسیدن به کاهش وزن مورد نظر ادامه یابد که حداقل ۱۰ روز و یا بیشتر است. در سایر برنامه‌ها، از مدت زمان گرسنگی کوتاه‌تر (۴ تا ۵ روز) استفاده شده و نتایج آن با برنامه گرسنگی‌های طولانی مدت قابل مقایسه است.

مقدار کاهش وزن

کاهش وزن برای تحلیل کامل دستگاه تولید مثل مرغ‌ها نسبت به وزن پیش از تولک امری ضروری است.

روش‌های تولکبری

امروزه چندین روش برای اجرای برنامه تولکبری اجباری در صنعت تولید تخم مرغ به کار می‌رود که به سه گروه عمدۀ تقسیم می‌شوند:

۱ حذف یا محدود کردن خوراک

۲ استفاده از جیره‌هایی با مواد مغذی پایین

۳ استفاده از افزودنی به خوراک مرغ‌های تخم‌گذار

یک برنامه تولکبری اجباری از طریق اعمال گرسنگی شامل سه مرحله است:

۱ دوره پیش از تولید

۲ دوره اعمال گرسنگی و کاهش وزن

۳ بازگشت به تولید پس از گرسنگی

وزن‌کشی

موفقیت یک برنامه تولکبری به وزن‌کشی دقیق مرغ‌ها وابسته است. وزن بدن مرغ‌ها قبل از تولکبری یکی از شاخص‌های مهم در طول برنامه است.

قدرت زنده‌مانی در مرحله قطع خوراک باید بیش از ۹۸ درصد باشد.

توجه



سیکل اول تولید تحت تأثیر قرار می‌دهد) را تجربه کرده باشد، قدرت زنده‌مانی در مرحله گرسنگی ممکن است به کمتر از ۹۸ درصد کاهش یابد.

اگر گله، انواعی از چالش‌ها از قبیل بیماری، وجود مایکوتوكسین در خوراک یا تنفس‌های محیطی (که تولید تخم مرغ و زنده‌مانی را به طور معنی‌داری در

أنواع برنامه‌های تولکبری

برنامه‌های تولکبری معمولی

کلیات مطالب برنامه در جدول صفحه بعد آورده شده است. در اینجا به ذکر اطلاعات مفید دیگر می‌پردازیم:

- ۱ از شروع تولکبری تا دو هفته پس از تولید مجدد تخم مرغ، صدف را به طور مجزا در اختیار گله قرار داده، سپس به میزان محدود قبلی بر می‌گردانند.

برنامه‌های تولکبری دو سیکلی

- ۱ روش معمولی
- ۲ روش کالیفرنیایی (برنامه بدون جیره‌بندی آب) و بیژه مناطق گرم‌سیری
- ۳ روش کارولینای شمالی: در این برنامه بیشترین تأکید بر کاهش وزن است.

- ۱** بین ۱-۲ هفته دیرتر از مرغ‌های گله تخم‌گذار تجاری تمام گله بتواند در یک زمان دان مصرف کند.
- ۲** دانه خوری به اندازه کافی تأمین گردد به نحوی که طوری برنامه‌ریزی شود که مرغ‌های گله‌های مادر

برنامه‌های تولک‌بُری معمولی

نور	آب	دان	روز
۸ ساعت	هیچ		۱-۲
	آب	طیور مادر نژاد تخم‌گذار ۴/۵ کیلوگرم به ازاء ۱۰۰ قطعه مرغ طیور مادر نژاد گوشتی ۶/۸ کیلوگرم به ازاء ۱۰۰ قطعه مرغ	۳
	هیچ		۴
	آب	مثل روز سوم	۵
	هیچ		۶
	آب	مثل روز سوم	۷
	هیچ		۸
	آب	مثل روز سوم	۹
	آب	به برنامه قبل از محدودیت غذایی برگشت داده شده و حدود ۷۵ درصد دان در اختیار آنها قرار گیرد.	۱۰ الی ۵۵-۶۰
۱۴-۱۶ ساعت		صرف دان تمام وقت مرغ‌های نژاد تخم‌گذار صرف دان تمام وقت مرغ‌های نژاد گوشتی	۶۱

جایگزین آن شود.

برنامه تولک‌بُری کالیفرنیایی

در این روش مصرف دان کامل در یک دوره طولانی معمولاً در این برنامه در پنجمین یا ششمین روز در صد تولید به حد صفر می‌رسد. بعد از ۱۰ روز محرومیت از دان وزن مرغ‌ها ۲۵ درصد کاهش می‌یابد که این کاهش وزن طی ۷ هفته پس از تغذیه با دان کامل این برنامه، جیره‌بندی آب اجرا نمی‌شود، در هواخیلی گرم پرندگان دهیدراته نشده و به همین علت جبران می‌شود. در صورتی که محدودیت غذایی تا ۱۴ روز به طول انجامد، نتایج به دست آمده برابر و یا بهتر که دان در اختیار گله قرار نگیرد باید پودر صدف از محرومیت ۵ روزه خواهد بود.

برنامه تولک بری کالیفرنیایی

نور	آب	دان	روز
۸ ساعت	آب	هیچ	۱-۱۰
		صرف غلات خرد شده به صورت تمام وقت	۱۱-۲۸
۱۶ ساعت		صرف دان آردی و دوران تولید به صورت تمام وقت	۲۹ به بالا

کاهش وزن تأمین شد، به مدت ۲ روز جیره روزانه ۴۵ گرم در اختیار گله قرار داده می‌شود. پس از آن مدت ۲۸ روز جیره تولک با پروتئین بالا ۱۵-۱۶ درصد و کلسمیم ۲ درصد مصرف می‌گردد و سپس به جیره معمولی دوران تولید برگردانده می‌شود. طی ۳ هفته اول، مدت ۱۲ ساعت از کل ساعت نور در اختیار گله قرار داده می‌شود، به طوری که در روز ۲۱ حداقل ۱۳ ساعت نور تأمین گردد. برنامه نور عادی در روز ۳۵ اعمال می‌شود.

برنامه تولک بردن کارولینای شمالی
سومین برنامه تولک بردن که بسیار معروف است شامل یک دوره پیش تولک هفت روزه می‌باشد که طی آن قبل از حذف دان، لامپ‌ها را در تمام مدت شب روشن نموده تا نور ۲۴ ساعته تأمین شود. این برنامه به مدیریت فارم اجازه می‌دهد تا بتواند میزان دان و نور مصرفی را به طور هم‌زمان کاهش دهد. روش کارولینای شمالی بیشترین تأکید را بر کاهش وزن دارد. برای رسیدن به چنین کاهش وزنی، حدود ۱۴ روز یا بیشتر وقت می‌خواهد. هنگامی که

استفاده از جیره‌هایی با مواد مغذی پایین یا تولک بری بدون حذف خوراک

در سال‌های اخیر از روش‌های دیگری به جز برنامه گرسنگی برای تولک بری مرغ‌ها استفاده می‌شود. این روش شامل تغذیه مقادیر کم مواد مغذی یا استفاده از افزودنی‌های غذایی به جیره است تا تولید تخم مرغ را متوقف کند. روش محدودیت مواد غذایی در کشورهایی که به آنها اجازه حذف خوراک را نمی‌دهند، استفاده می‌شود. این روش با مصرف مقادیر کم نمک، سدیم و کلسیم و یا با جیره‌ای حاوی الیاف بالا، همچنین با افزودن موادی از قبیل روی، آلومینیوم و یدید پتاسیم با موفقیت انجام شده است.

نخستین مرحله در برنامه‌های تولک بری بدون حذف خوراک، کاهش طول مدت روشنایی به ۸ ساعت است. برنامه ۸ ساعت روشنایی تا تحقق دو هدف تداوم خواهد داشت:

۱ کاهش ۲۰ درصدی وزن بدن

۲ توقف تولید تخم مرغ به مدت ۲ تا ۳ هفته.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ایزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۲	قطع کردن خوارک	فرم‌های مربوطه دستورالعمل‌های مربوط به جیره غذایی شروع تولک بری	۱- شروع مناسب تولک بری	اجرای کامل برنامه تغییر جیره غذایی	۳
			۲- شروع نسبتاً مناسب تولک بری	اجرای نسبتاً کامل برنامه تغییر جیره غذایی	۲
			۳- شروع نامناسب تولک بری	اجرای نامناسب برنامه تغییر جیره غذایی	۱

تولک بردن از طریق افزایش روح

در سال‌های اخیر تولک بری اجباری با تجویز مقادیر بالای روی در جیره بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تغذیه با مقدار بالای روی در جیره از راه اضافه کردن اکسید روی یا استات روی در مقابل مقدار نیاز روی ظرف مدت ۵ تا ۷ روز موجب قطع تولید تخم مرغ خواهد شد و سه تا چهار هفته پس از حذف روی اضافی از جیره تولید تخم مرغ آغاز خواهد شد. استفاده از روی به صورت اکسید روی قابل تحمل تر از استات روی و یا سولفات روی است.

در گله‌های مادر استفاده از روی به مقدار ۲۰۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم برای مدت ۵ روز سبب کاهش باروری و درصد جوجه درآوری به مدت ۱۴ تا ۲۸ روز در دوره تولید بعدی شده است.

زمان (روز)	دان	آب	نور
۱-۱۰	۲۰۰۰۰ میلی‌گرم اکسید روی در هر کیلوگرم دان تخم‌گذار	آزاد	۸
۱۱ به بعد	حذف روی و تغذیه کامل جیره مرغ تخم‌گذار	آزاد	۱۴-۱۶

تولک بردن به وسیله کاهش سدیم

در این برنامه، سدیم جیره تا ۵/۰ درصد کاهش یافته و روزانه ۸ ساعت نور در نظر گرفته می‌شود. حدود ۶ هفته بعد از تولک بری جیره مرغ‌های تخم‌گذار به حالت قبل برمی‌گردد. بهتر است برای جلوگیری از تولید مجدد زودهنگام، از دان با کلسیم و فسفر پایین نظیر دوران رشد پولت‌های معمولی استفاده شود. این برنامه در اروپا به طور وسیعی استفاده می‌شود.

تولک بردن با افزایش میزان ید در جیره

افزودن ید به مقدار بالا به شکل یدور پتانسیم منجر به قطع تولید تخم مرغ در مدت ۵ تا ۷ روز می‌شود و ۲ تا ۳ روز پس از حذف ید اضافی از جیره، تولید تخم مرغ آغاز می‌گردد. سطح پایین ید به مقدار ۲۵۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم یا کمتر در قطع تولید تخم مرغ کاملاً مؤثر نیست.

تولک بردن با استفاده از جیره‌های حاوی کلسیم پایین

طیوری که به مدت چهار روز بدون دان مانده بودند تنها با تغذیه بیکربنات کلسیم در این چهار روز به تولید تخم مرغ ادامه دادند؛ بنابراین چنین تصور می‌شود که مرغ‌هایی که با محدودیت غذایی تولک برده می‌شوند، کلسیم اولین ماده غذایی است که موجب محدودیت تخمک اندازی در زمان تولک می‌گردد.

ترکیب روش‌های مختلف

ثابت شده است ترکیب ۲ یا چند روش بالا مثل جیره حاوی کلسیم پایین و روی بالا یا جیره بدون نمک با روی به مقدار ۷۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم در مرغ‌های تخم‌گذار مؤثر است.

تولک بردن از طریق هورمون‌های تولیدمثلی

با مصرف ۲۰ میلی‌گرم پروژسترون چه به صورت تزریق و چه به صورت مخلوط در دان ظرف ۲ تا ۴ روز تولید تخم مرغ قطع می‌گردد و در عرض ۷ تا ۱۲ روز تولک رفتن مرغ‌ها شروع و پس از طی ۳ تا ۴ هفته از زمان حذف آن، تولید دوباره تخم مرغ آغاز می‌شود.

استفاده از محصولات دارویی

ترکیباتی مثل ان‌هپتین یا متالیبور، تاموکسیفن، نیکاربازین در تولک‌بری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به طور مثال ان‌هپتین به مقدار ۰/۱۵ تا ۰/۱ درصد به مدت ۷ تا ۱۰ روز موجب قطع تولید تخم مرغ شده و شروع دوباره تولید سه تا چهار هفته پس از حذف آن از جیره خواهد بود.

اخلاق
حرفه‌ای



فقها آب و غذا دادن به حیوانات را در موقع ضروری واجب و در غیر آن را مستحب شمرده‌اند. بنابراین در انتخاب روش تولک‌بری آن برنامه‌ای که کمترین صدمه و آسیب را بر پیکر مرغ وارد می‌کند برتری دارد.

تغذیه تدریجی در طول دوره تولک‌بری



ابزار و وسائل مورد نیاز

لباس کار ■ ماسک ■ دستکش ■ ترازو

مراحل انجام کار

۱ انواع روش‌های تولک‌بری را مطالعه کنید.

۲ با توجه به وضعیت سالن، مدیریت و ... بهترین روش برای تولک‌بردن گله را انتخاب کنید.

مرغداران در بیشتر نقاط ایران از برنامه‌های تولک‌بردن معمولی استفاده می‌کنند که ما در این قسمت از این برنامه تولک‌بری برای کار عملی استفاده کردی‌ایم.

۳ لباس کار مناسب به ویژه ماسک و دستکش بپوشید.

۴ در نقاط مختلف سالن چند قفس را به طور تصادفی انتخاب کرده و تمام پرنده‌گان موجود در آن قفس‌ها را توزین کنید. توزین را باید ۷ و ۹ روز قبل از قطع خوراک انجام داده و میانگین کاهش وزن روزانه را محاسبه کنید. از این طریق می‌توانید، روزی را که پرنده به وزن مورد نظر خواهد رسید تخمین بزنید.

توجه



هر دو روز پرنده‌های داخل قفس‌های علامت‌گذاری شده را وزن کنید.

- ۵** گرسنگی را بر اساس برنامه انتخاب شده اعمال کنید. روز اول و دوم خوراکی در اختیار پرنده قرار نگیرد. روز سوم به بعد براساس جدول توصیه شده در قسمت قبلی ادامه دهید.

نکته



مدت گرسنگی را تا زمان رسیدن به کاهش وزن مورد نظر ادامه دهید (۲۵-۳۰ درصد کاهش وزن).

- ۶** تا روز نهم یک روز در میان آب در اختیار پرنده قرار دهید.
۷ از روز اول تا پایان تولکبری روزانه هشت ساعت روشنایی اعمال کنید.
۸ پس از پایان مرحله تولکبری نور را به ۱۴-۱۶ ساعت افزایش دهید.
۹ از شروع تولکرفتن تا دو هفته پس از تولید مجدد تخم مرغ، صدف را به طور مجزا در اختیار گله قرار دهید سپس به میزان محدود قبلی برگردانید.

توجه



مرغ‌های گله مادر بین ۱-۲ هفته دیرتر از مرغ‌های گله تخم‌گذار تجاری شروع به تولید می‌کنند.

- ۱۰** پس از پایان مرحله تولکبری، برنامه قبل از محدودیت غذایی اعمال شود و حدود ۷۵ درصد دان در اختیار آنها قرار گیرد.
۱۱ بعد از طی چند روز، تغذیه کامل مرغ تخم‌گذار صورت پذیرد.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/ نمره‌دهی)	نمره
۳	تجزیه خوراک مخصوص دوران تولکبری	جیره مخصوص دوران تولکبری	۱- حفظ شرایط بدنی و سلامتی پرنده در سطح مطلوب ۲- عدم حفظ شرایط بدنی و سلامتی پرنده در سطح مطلوب	تجزیه پرنده با جیره غذایی مناسب	۳
			تجزیه پرنده با جیره غذایی نسبتاً مناسب	۲	
			تجزیه پرنده با جیره غذایی نامناسب	۱	

برنامه نوری

برنامه‌های نوری مختلفی وجود دارد که دو نوع آن **۱** روش اول: استفاده از ۸ ساعت نور به مدت ۲ هفته پیش از شروع برنامه تولک و ادامه آن در متداول‌تر است:

باز که در آنها امکان کاهش نور تا ۸ ساعت وجود ندارد، توصیه می‌شود. علاوه بر تغییر در مدت نور لازم است شدت آن نیز کاهش یابد. این امر علاوه بر ایجاد استرس کمتر، سبب جلوگیری از بروز کانی بالیسم نیز می‌شود. برای افزایش میزان نور نیز روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است. چنانچه بازگشت سریع هم‌زمان با شروع گرسنگی آن را به ۱۵ ساعت کاهش داد (این مدت در زیر آستانه تحريك هیبوفیز قرار دارد و بنابراین سبب تحريك تخم‌گذاری نمی‌شود). این برنامه سبب می‌شود دوره بازگشت به تولید طولانی‌تر شود. این روش بیشتر برای سالن‌های افزایش نور به تدریج و طی چند مرحله صورت پذیرد.

طی برنامه، علاوه بر اینکه استرس ایجاد شده را کم می‌کند، سبب توقف زودتر تولید تخم‌مرغ شده و میزان تولید در سیکل دوم را افزایش می‌دهد.

۲ روش دوم: می‌توان پیش از شروع برنامه تولک، نور را به مدت یک هفته به ۲۴ ساعت افزایش داده و هم‌زمان با شروع گرسنگی آن را به ۱۵ ساعت کاهش داد (این مدت در زیر آستانه تحريك هیبوفیز قرار دارد و بنابراین سبب تحريك تخم‌گذاری نمی‌شود). این برنامه سبب می‌شود دوره بازگشت به تولید طولانی‌تر شود. این روش بیشتر برای سالن‌های

فعالیت‌کارگاهی

برای اجرای برنامه تولک‌بری با توجه به سویه‌های مرغ تخم‌گذار پرورشی موجود در ایران نحوه تنظیم مطلوب نور را بررسی و در کلاس درس ارائه کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۴	کاهش مدت و شدت نور سالن پرورش	دیمیر - تایمر	۱- شروع مناسب تولک‌بری ۲- شروع نسبتاً مناسب تولک‌بری ۳- شروع نامناسب تولک‌بری	۳- تنظیم مناسب مدت و شدت روش‌نایابی	۳
				۲- تنظیم نسبتاً مناسب مدت و شدت روش‌نایابی	۲
				۱- تنظیم نامناسب مدت و شدت روش‌نایابی	۱

روشی که برای تولک‌بری استفاده می‌شود با محدودیت یا حذف آب برای مدت ۲ تا ۳ روز ممکن است باعث تولک‌رفتن شود؛ ولی باید در خصوص سلامتی گله، وضعیت تولید گله، ملاحظات اقتصادی و امکاناتی که مدیر در اختیار دارد در ارتباط است و وضعیت بدنی طیور دقت کرد؛ چرا که از دستدادن برای اجرای هر روش، برنامه نوری خاصی و قطع آب بیش از حد آب، موجب مرگ پرنده‌ها خواهد شد. اعمال می‌شود که در جداول قبلی اشاره شده است.

سویه‌های مختلف را از نظر مقاومت در برابر قطع آب با توجه به کاتالوگ‌های پرورشی بررسی کنید.

تحقیق
کنید



فعالیت کارگاهی

- ۱ زمان قطع آب را از کاتالوگ سویه‌های مختلف استخراج کرده و در اجرای برنامه تولک بری در نظر بگیرید.
- ۲ از کاتالوگ سویه‌های مختلف احتیاجات غذایی را استخراج کنید و براساس آن جیره مناسب جهت اجرای برنامه تولک تهیه کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
	قطع آب	قطع آب برای نژادهای سنگین و نیمه سنگین	۱- حفظ سلامتی پرنده‌ها ۲- حفظ نسبی سلامتی پرنده‌ها ۳- صدمه به سلامتی پرنده‌ها	اجرای برنامه قطع آب براساس نژادها با زمان‌بندی مناسب	۳
۵				اجرای نسبی برنامه قطع آب براساس نژادها با زمان‌بندی مناسب	۲
				عدم اجرای مناسب قطع آب و در نظر نگرفتن نژاد و زمان‌بندی نامناسب	۱

تغذیه در دوره جبرانی بعد از گرسنگی

مرغ‌های گرسنه قبل از برگشت به تولید تخم مرغ توصیه می‌شود. جیره تولکی ۱ باید از روزی که مرغ‌ها باید از جیره‌هایی تغذیه کنند که رشد پر، رشد و نمو به غذا خوردن بر می‌گردند شروع شود و تا ۵ درصد عضلات و وظایف دستگاه تولید مثل آنها را تسريع تولید ادامه یابد. سپس جیره تولکی ۲ را در اختیار کنند. برای تأمین این احتیاجات دو جیره احتصاصی مرغ‌ها گذاشته و تا ۵۰ درصد تولید ادامه می‌دهند.

تغذیه در طی دوره جبرانی بعد از گرسنگی

مواد غذایی	جیره شماره ۱	جیره شماره ۲
پروتئین خام	۱۶ درصد	۱۷/۵ درصد
انرژی متابولیسمی	۱/۲۷۵ Kcal	۱/۳۰۰ Kcal
کل اسیدآمینه گوگرددار	۰/۶۵ درصد	۰/۷۰ درصد
لیزین	۰/۸۰ درصد	۰/۹۵ درصد
کلسیم	۲ درصد	۳/۷۵ درصد
فسفر قابل دسترس	۰/۴ درصد	۰/۴ درصد

میزان خواراک دهی

خواراک نباید خواراک را به طور آزاد در اختیار مرغ‌ها گذاشت؛ بلکه ۲۰-۴۰ گرم به مدت دو روز و بعد خواراک به تدریج افزوده می‌شود.

معیار شروع خواراک دهی مجدد در برنامه تولک بری، افت وزن مرغ به میزان ۳-۲۵ درصد است که معمولاً حدود ۱۰-۶ روز طول می‌کشد. هنگام شروع مصرف

فعالیت کارگاهی

ب) بازگشت به تولید کوتاه مدت (دوره ترک تولید کوتاه): چنانچه بخواهیم گله پس از کاهش وزن لازم، سریعاً به تولید بازگردد، بهتر است تغذیه گله را با جیره مرغ‌های تخم‌گذار شروع کنیم. علاوه بر این، چنانچه گله مرغ کمی بیشتر تغذیه شود نیز شروع تولید زودتر صورت خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر کمیت و کیفیت غذای مصرفی در افزایش یا کاهش طول مدت استراحت نقش اساسی دارد. در دوره ترک تولید کوتاه، تولید سریع‌تر آغاز می‌شود؛ ولی عملکردها نسبت به حالت قبل کمی پایین‌تر خواهد بود.

برنامه بعد از تولک بری در مرغ‌های مادر گوشتی
مرغ‌های مادر گوشتی برای دستیابی به ۲۵ درصد کاهش وزن، لازم است ۱۰ تا ۱۴ روز گرسنه بمانند. پس از پایان مرحله گرسنگی به منظور سرعت بخشیدن به پر درآوری گله باید جیره حاوی ۲۷۵۰ کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در هر کیلو دان، ۱۶ درصد پروتئین و ۵/۹ درصد اسید آمینه‌های گوگرد دار در اختیار آنها گذاشته شود. برای جلوگیری از افزایش وزن بیش از اندازه پرنده‌گان پس از دوره تولک‌رفتن باید محدودیت غذایی اعمال شود.

تولید دوباره تخم مرغ در مرغ‌ها

ابزار و وسائل مورد نیاز
لباس کار ■ ترازو

مراحل انجام کار

- ۱ لباس کار مناسب بپوشید.
- ۲ مرغ‌ها را به طور مرتب وزن کنید.
- ۳ لازم است پس از ۳۰ درصد کاهش وزن، بار دیگر مرغ‌ها تغذیه شوند.
- ۴ ساعت نور به مرحله قبل از تولک بری برگردانده شود (۱۴-۱۶ ساعت). برای تغذیه دوباره مرغ‌ها و بازگشت به مرحله دوم سیکل تولید، دو روش مختلف وجود دارد:
 - الف) بازگشت به تولید بلند مدت (دوره ترک تولید طولانی): چنانچه پس از پایان گرسنگی، گله با غذایی تغذیه شود که فقط تأمین کننده نیازهای متابولیکی بدن و ترمیم ضایعات باشد و افزایش میزان دان نیز به تدریج باشد، طول مدت استراحت گله طولانی‌تر خواهد شد. افزایش طول مدت استراحت سبب بهبود عملکرد و کیفیت تخم مرغ در سیکل دوم تولید می‌گردد.

از کاتالوگ سویه‌های مختلف، برنامه‌های توصیه شده بعد از اعمال برنامه تولک را استخراج و اجرا کنید.

تحقیق
کنید



در زمان بازگشت مجدد به تولید، می‌توان از چند جیره مختلف استفاده کرد. در این جیره‌ها توجه به میزان اسیدهای آمینه گوگردار (به خاطر جایگزینی پرهای ریخته شده) و نیز درصد کلسیم بسیار حائز اهمیت است. وجود ۱۵ الی ۱۶ درصد پروتئین خام، ۲۵۰۰ کیلوکالری انرژی و ۰/۸ تا ۰/۷ درصد اسیدهای آمینه گوگردی را می‌توان از خصوصیات لازم جیره مصرفی در مرحله بازگشت به تولید دانست. لازم است پس از شروع نشانه‌گذاری در داخل سالن‌ها، مقدار کلسیم جیره افزایش یابد. بهترین حالت زمانی حاصل می‌شود که مرغ‌ها ۸ هفته پس از شروع برنامه گرسنگی به حد ۵ درصد تولید برسند و کاهش وزن متحمل شده را جبران کنند. تعیین روش بازگرداندن مرغ‌ها به تولید، بیش از هر چیز به عوامل اقتصادی و پس از آن به مدیریت سالن مرغداری بستگی دارد.

فعالیت کارگاهی

■ با توجه به کاتالوگ سویه‌های مختلف جیره‌ای مناسب جهت شروع دوره جدید تولید تهیه کنید و در کلاس درس در مورد آن بحث کنید.

فعالیت کارگاهی

■ با توجه به کاتالوگ سویه‌های مختلف برنامه نوری و دمایی مناسب جهت شروع دوره جدید تولید اعمال کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۶	پایان دادن به دوران تولک	جیره مخصوص پایان دوره تولکبری، دیمیر، تایمیر	۱- اتمام کامل دوران تولک پرنده‌ها	اجرای کامل برنامه اتمام دوران تولکبری	۳
			۲- اتمام نسبتاً کامل دوران تولک پرنده‌ها	اجرای نسبتاً کامل برنامه اتمام دوران تولکبری	۲
			۳- عدم اتمام دوران تولک پرنده‌ها	عدم اجرای کامل برنامه اتمام دوران تولکبری	۱

ارزشیابی شایستگی تولک بری اجباری

شرح کار:

- ۱- آماده کردن مرغ ها برای تولک بری
- ۲- قطع کردن خوراک
- ۳- کاهش مدت و شدت نور
- ۴- قطع آب
- ۵- تغذیه خوراک مخصوص دوران تولک
- ۶- پایان دادن به برنامه تولک بری

استاندارد عملکرد:

تشخیص زمان و روش مناسب تولک بری

شاخص ها:

- ۱- تعیین زمان تولک بری براساس پیشنهاد سویه پرورشی و شرایط بازار
- ۲- خوراک ندادن به مرغ ها
- ۳- تنظیم برنامه نوری براساس پیشنهاد سویه پرورشی
- ۴- وجود نداشتن آب در آب خوری ها
- ۵- دادن جیره تولک بری براساس پیشنهاد سویه پرورشی
- ۶- تنظیم جیره و برنامه نوری پس از پایان دوره تولک بری براساس پیشنهاد سویه پرورشی

شرایط انجام کار:

برنامه نوری مختص تولک بری
برنامه غذایی مختص تولک بری
مرغ تخم گذار، سالن پرورش

ازبار و تجهیزات:

تایمیر - دیمیر - خوراک - نمون برگ های ثبت اطلاعات دوره تولک بری

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده کردن مرغ ها برای تولک بری	۱	
۲	قطع کردن خوراک	۲	
۳	کاهش مدت و شدت نور سالن پرورش	۲	
۴	قطع آب	۲	
۵	تغذیه خوراک مخصوص دوران تولک بری	۱	
۶	پایان دادن به دوران تولک	۱	
شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مدیریت زمان، حفظ ایمنی پرنده در زمان تولک بری، استفاده از لباس کار، حفظ آسایش پرنده، دقت و صداقت در کار			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۱۴

پیشگیری از بیماری‌ها

آیا تابه حال پی برد هاید؟

- ۱ منظور از امنیت زیستی در سالن‌های مرغداری چیست؟
- ۲ از چه روش‌هایی برای ضدغوفونی و سایط نقلیه استفاده می‌شود؟
- ۳ روش‌های معدهوم کردن تلفات در سالن‌های پرورش مرغ کدام‌اند؟
- ۴ برای کالبدگشایی مرغ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
- ۵ جوجه‌های سالم از بیمار را چگونه باید تشخیص داد؟
- ۶ نحوه گزارش از وضعیت سلامتی سالن پرورش مرغ به چه صورتی است؟

هدف از این بخش بررسی روش‌های پیشگیری از بروز بیماری در واحدهای پرورش مرغ است. از مهم‌ترین عواملی که به طور دائم سالن‌های مرغداری را تهدید می‌کند و می‌تواند موجب بروز خسارات سنگین و غیرقابل جبران شود، بیماری‌های طیور است. هر یک از این بیماری‌ها توسط عواملی ایجاد می‌شوند که به طور کلی عوامل بیماری‌زا نامیده می‌شوند. عوامل بیماری‌زا موجودات ذره‌بینی و ریزی هستند که توسط چشم انسان قابل روئیت نیستند و به صورت گرد و غبار، افراد و وسایل را آلوده می‌کنند. این عوامل در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی به راحتی به داخل واحدهای پرورش طیور راه یافته و موجب بروز خسارات می‌شوند. بعد از بروز بیماری، درمان‌ها بیشتر جنبه حمایتی داشته و هزینه سنگینی را متوجه مرغداران خواهد کرد و در تعدادی از بیماری‌ها مجبور هستیم گله را به طور کامل معدهوم کنیم. مهم‌ترین و ضروری‌ترین حال عملی‌ترین راه جلوگیری از آلوده شدن مرغ‌ها، انجام پیشگیری‌های لازم و رعایت اصول بهداشتی است؛ بنابراین با شناخت راه‌های ورود عوامل بیماری‌زا و ایجاد سدهای ممانعت‌کننده می‌توان از نفوذ آنها به داخل فارم، جلوگیری و گله را در سلامت کامل پرورش داد.


استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که اقدامات بهداشتی دقیق را طبق دستورالعمل در سالن مرغداری به ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه انجام دهند.

امنیت زیستی

پرورش طیور به صورت متراکم و صنعتی اگرچه از نظر اقتصادی قابل توجیه است، اما همین تراکم سبب افزایش بروز بیماری‌ها نیز می‌شود. شیوع بیماری‌ها، زیان‌های مالی فراوانی را به صنعت دام و طیور وارد می‌کند. برای به حداقل رساندن این زیان‌ها، می‌توان از روش‌های پیشگیرانه‌ای چون کنترل عوامل بیماری‌زا و ناقلين آنها استفاده کرد. اقداماتی که در جهت کنترل بیماری‌ها و پیشگیری از آنها به کار می‌روند، تحت عنوان امنیت زیستی طبقه‌بندی می‌شوند.

بیوسکیوریتی یا امنیت زیستی چیزی جز جمع دو واژه خطر و احتمال بروز آن نیست.



سالن مرغداری



حمل و نقل مرغ



شست و شو و ضد عفونی

فعالیت کارگاهی

نحوه کار باید به گونه‌ای باشد که رفت و آمد افراد، خوراک، تجهیزات و حیوانات در مزرعه کنترل شده و از ورود و انتشار بیماری‌ها پیشگیری شود.

اصول طراحی منطقه آلوده و پاک: سدهای امنیت زیستی در عبور عوامل بیماری‌زا

منطقه پاک	پیش قرنطینه، دوش و رختکن	منطقه آلوده
-----------	--------------------------	-------------



□ به تصاویر بالا توجه کنید و سپس برداشت خود را در کلاس بیان کنید.


گفت و گو
کنید



■ در مرغداری اطراف شما، چگونه از ورود عوامل بیماری‌زا به مرغداری جلوگیری می‌کنند؟



گستاخیه عفونت طیور: چگونه؟



برنامه‌های اساسی کنترل بهداشتی و امنیت زیستی

تصویر بالا را در کلاس تحلیل کنید.

گفت و گو
کنید



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	اقدامات قرنطینه‌ای	چاله‌های ضدغونی، مواد ضدغونی، تجهیزات ضدغونی، کنترل رفت‌وآمد ابزار و ماشین‌آلات	۱- جلوگیری از ورودی آلودگی به مزرعه ۲- ورود نسبتاً کم آلودگی ۳- ورود آلودگی به مزرعه	کنترل تردد افراد و ماشین‌آلات و رعایت اصول ضدغونی	۳
				کنترل نسبی تردد افراد و ماشین‌آلات و رعایت نسبی اصول ضدغونی	۲
				عدم کنترل تردد افراد و ماشین‌آلات و عدم رعایت اصول ضدغونی	۱

ضدغونی کردن

تا وقتی که تمامی سالن تمیز نشده، تعمیرات صورت نگرفته و سالن خشک نباشد، نباید سالن ضدغونی را می‌توان توسط دستگاه اسپری پرفشار یا اسپری کوله‌پشتی استفاده کرد. ضدغونی‌کننده‌ها با وجود مواد کثیف و آلی بی‌اثر می‌شوند و در سطوح مرطوب از میزان تأثیر آنها



نحوه تهییه محلول ضدغونی کننده

ضدغونی‌کننده‌هایی که کف ایجاد می‌کنند سبب ماندگاری و تأثیر بیشتر ماده ضدغونی کننده می‌شوند. است که اسپورهای کوکسیدی از بین بروند می‌توان گرم کردن سالن تا دماهای بالا بعد از درزگیری از ترکیبات تولید کننده آمونیاک توسط افراد آموختن می‌تواند تأثیر ضدغونی کننده را بیشتر کند. بیشتر دیده استفاده کرد. ضدغونی کننده‌ها بر اووسیستهای اسپوردار بیماری



احداث چاله ضدغونی و نصب تابلو هشدار دهنده



در صورت نبودن حوضچه کوچک ضدغونی جلوی در ورودی از تشت ضدغونی استفاده کنید.

■ اجرای یک برنامه ضدغونی موفق به چه عواملی بستگی دارد؟

تحقيق
کنید



ضدغونی وسیله نقلیه

- ۱ تأمین محلول ضدغونی کننده در حوضچه‌های ضدغونی در ورودی در مرغداری و سالن‌ها پس از شستشو و ضدغونی سالن‌ها الزامی است.
- ۲ از ورود هر گونه کامیون و یا خودروهای متفرقه به داخل مرغداری جلوگیری شود.
- ۳ خودروها قبل از ورود به داخل مزرعه از چاله ضدغونی عبور کنند (به طوری که تمام چرخ‌های ماشین یک دور کامل داخل حوضچه بچرخد).
- ۴ قسمت ویژه‌ای برای شستشو و ضدغونی کامیون‌ها در نظر گرفته شود که در صورت نیاز کامیون‌ها پس از انجام شستشو و ضدغونی وارد مزرعه شوند. این
- ۵ در زمان ورود کامیون به داخل مزرعه، راننده و کمک راننده از کامیون پیاده نشوند.
- ۶ حوضچه‌های ضدغونی به صورت هفتگی تعویض شوند. روزانه نیز مقداری آب و ماده ضدغونی به حوضچه‌ها اضافه شود تا سطح آب و ماده ضدغونی در طول هفته ثابت بماند.
- ۷ سعی شود هرجا که در وجود دارد، جلوی آن تشت و یا حوضچه ضدغونی قرار گیرد.
- ۸ چاله‌های کوچک ضدغونی به صورت روزانه تعویض شوند.



از مصرف بیش از حد و کمتر مواد ضدعفونی کننده، جلوگیری شود.



ضد عفونی وسایل و وسایط نقلیه قبل از ورود به مرغداری

فعالیت کارگاهی

جمع آوری تلفات

ابزار و وسایل مورد نیاز

لباس و کفش مناسب کار پلاستیک ماده ضد عفونی کننده

موائل انجام کار

- ۱ آماده به کار شوید (پوشیدن لباس و کفش مناسب کار و دستکش و ...)
- ۲ تلفات در اسرع وقت از سالن خارج شود.
- ۳ در صورت مشاهده تلفات غیرعادی در هر زمان از شب و روز، مسئولین مربوطه در جریان امر قرار گیرند.
- ۴ در صورت بروز تلفات غیرعادی، برنامه نمونه‌گیری و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه انجام شود.
- ۵ در فاصله کمی دورتر از سالن‌ها، سکوی تلفات ساخته شود و بر روی سکو یک حفاظ قرار گیرد تا حیوانات دیگر به تلفات دسترسی نداشته باشند.
- ۶ در دوره پرورش حذف و تلفات را زیر نظر داشته باشید و کلیه آمار به طور دقیق روزانه ثبت شود.

- ۷ تلفات جمع آوری شده در پلاستیک در بسته قرار **۹** وسیله حمل تلفات، به طور روزانه در آغاز و پایان گیرد و به قسمت سکوی تلفات منتقل شود.
- ۸ وسیله حمل تلفات به سمت سالن ها نزدیک نشود **۱۰** مسیر حمل تلفات به گونه ای در نظر گرفته شود و از فاصله دورتر، تلفات به وسیله حمل منتقل شود.



حمل تلفات در کیسه هایی در بسته توسط خودروی حمل تلفات

- تا جای ممکن کلیه تلفات کالبدگشایی شده و سپس **۱۱** کلیه تلفات بعد از کالبدگشایی در کوره لاشه سوز گزارش های کالبدگشایی بایگانی شوند.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نمره
۲	جمع آوری تلفات	ماسک، دستکش	۱- جمع آوری به موقع تلفات ۲- جمع آوری نسبتاً به موقع تلفات ۳- عدم جمع آوری به موقع تلفات	۳ مشاهده تعداد زیادی تلفات در سالن	۳
				۲ مشاهده نسبی تلفات در سالن	۲
				۱ عدم مشاهده تلفات در سالن	۱

کالبدگشایی

کالبدگشایی براساس روش معین و اصولی می تواند یک کالبدگشایی مناسب باشد.

در مرغداری انجام کالبدگشایی های مداوم و اصولی اطلاعات بسیار با ارزشی برای مدیریت صحیح و مناسب گله به شما خواهد داد.

فعالیت کارگاهی

کالبدگشایی



ابزار و وسایل مورد نیاز

- قیچی بزرگ کالبدگشایی
- دستکش ■ قیچی ■ چاقوی کالبدگشایی ■ دسته بیستوری و تیغه آن ■ پنس



مراحل انجام کار

۱ قبل از آغاز کالبدگشایی

- شرح حال بالینی گله را بررسی کنید.
- لیستی از تشخیص‌های تفریقی خود را آماده کنید.
- علائم بالینی گله را در نظر بگیرید.
- با استفاده از جابه‌جا کردن مهره‌های گردن، مرگ بدون درد را در پرنده ایجاد کنید.



۲ کالبدگشایی را از ناحیه سر پرنده آغاز کنید.

- پرهای پرنده را با استفاده از آب خیس کنید.
- لاشه پرنده را به پشت بخوابانید.
- دهان پرنده را از گوشه آن بریده و باز و مسطح کنید.

■ محوطه دهان را بررسی کنید.

- برش محوطه دهان را به طرف گردن از طریق پوست و مری و سپس تا چینه‌دان ادامه دهید.
- عصب واگ، تیموس، مری و محتویات چینه‌دان را بازرسی کنید.



امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ

- حنجره را برش دهید و برش را در طول نای ادامه دهید.
- غشاهاي مخاطي ناي و محتويات داخل آن را بررسی کنيد.
- نوك بالائي را با يك برش عرضي از پايه آن ببريد.
- حفره بيني و سينوس هاي زير چشمی را بازرسی کنيد.
- اگر سينوس ها متورم بودند آنها را برش داده و باز کنيد.
- ترشحات داخل آن را بررسی کنيد.
- چشم ها را بررسی کنيد.




۳ نحوه باز کردن بدن

- پوست مابین پاها و شکم را ببريد.
- با کشیدن و چرخاندن ران ها، سر ران ها را از مفصل لگن جدا کنيد.
- پوست روی شکم را از دو طرف در امتداد شکم ببريد و پوست را از روی شکم و عضلات سینه کنار بزنيد.



۴ نحوه دستيابي به اندام هاي احشائي


- عضلات شکم را به موازات لبه هاي استخوان جناغ ببريد.
- بعد از برش عضلات شکم دندنه ها را نيز تا انتهای قفسه ببريد.
- بعد از برش عضلات شکم و دندنه ها، قفسه سينه را برای بازبینی اندام های احشایی باز کنید.
- سطوح اندام های احشایی در معرض دید را معاینه کنید و قبل از اینکه سایر مراحل کالبدگشایی را ادامه دهید، در صورت نیاز نمونه میکروب شناسی بردارید.





۵ بررسی اندام‌های احشایی



- برای جلوگیری از انتشار آلودگی بین اندام‌ها، هر کدام از اندام‌های مبتلا را در صورت لزوم برای کشت به طور جداگانه نمونه‌برداری کنید.
- کبد و روده‌ها را کنار بزنید، کيسه‌هایی هوایی، ریه‌ها و کلیه‌ها را بازرسی کنید.
- در صورت نیاز به نمونه‌برداری بیشتر و یا مشاهده بهتر و دقیق‌تر، اندام‌ها را ببرید و جدا کنید.



۶ اندام‌هایی که باید بازرسی و بررسی شوند:

- کبد
- طحال
- لوزالمعده
- کلیه‌ها
- تخمدان‌ها
- قلب
- ریه‌ها
- روده‌ها (همچنین لوزه‌های سکومی)
- اعصاب و شبکه سیاتیک
- مغز
- استخوان‌ها و مغز استخوان





پس از پایان کالبدگشایی، گزارشی از مشاهدات خود یادداشت کنید.

گفت و گو
کنید

آیا زمان انجام کالبدگشایی، پس از تلف شدن مرغ در تشخیص بیماری مؤثر و مهم است؟



توجه



نکته
اخلاقی



انجام کالبدگشایی با استفاده از روش استاندارد، معاينه هر بافت را به موقع و به جای خود تضمین کرده و عجله منجر به کاهش دقت، تشخیص غلط و یا عدم تشخیص خواهد شد.

گوشت و تخمر مرغ حاصل از مرغ های بیمار را از چرخه توزیع خارج کرده و به گونه ای بهداشتی معده و معدون کنید و در اسرع وقت به درمان مرغ های بیمار مبادرت کنید چرا که آنها نیز صاحب حق اند و از نعمات الهی برای ما انسان ها هستند و سلامت و یا بیماری آنها به طور مستقیم به ما انسان ها مربوط می شود.

فعالیت کارگاهی

معدوم کردن تلفات



معدوم کردن تلفات

ابزار و وسائل مورد نیاز

- لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی (دستکش، ماسک)
- کوره لاشه سوز ■ آهک
- ماده ضد عفونی کننده

مرحله انجام کار

- ۱ آماده به کار شوید. (رعايت نکات ایمنی فردی، پوشیدن لباس مناسب)
- ۲ لашه مرغ های تلف شده را در کوره های مخصوص بسوزاند.

۳ اگر از این کوره ها در دسترس نباشد باید در مرغداری از چاه تلفات استفاده کرد و هر چند روز یکبار به مقدار کافی آهک و یا ماده ضد عفونی در چاه ریخت.

توجه



توجه



لاشه مرغ های تلف شده اغلب منشأ خطرناکی برای بیماری در مرغداری هستند. بنابراین در زمان حمل و نقل آنها باید دقت کافی داشته باشیم.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ایزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/ داوری/نمره‌دهی)	نمره
۳	تعیین مکان استاندارد جهت معذوم سازی لاشه‌ها	معذوم سازی مناسب تلفات بیماری‌ها ۱- کاهش آلودگی و انتقال بیماری‌ها ۲- افزایش نسبی آلودگی و انتقال بیماری‌ها ۳- افزایش آلودگی و احتمال انتقال بیماری‌ها	معذوم سازی مناسب تلفات بیماری‌ها	معذوم سازی مناسب تلفات	۳
				معذوم سازی نسبتاً مناسب تلفات	۲
				معذوم سازی نامناسب تلفات	۱

احتیاط‌های لازم در کالبدگشایی



سطوحی را که کالبدگشایی روی آنها انجام می‌گیرد با کاغذ پوشانده و پس از اتمام کالبدگشایی کاغذها را اطراف لاشه پیچیده و همراه با لашه نسبت به معذوم سازی آنها اقدام کرد.



پس از اتمام کالبدگشایی همه اندام‌ها را درون کيسه پلاستیکی گذاشته و لاشه‌ها را با روش اصولی و بهداشتی معذوم کنید.

در بیماری‌های مشترک مانند بیماری سالمونولا توصیه می‌شود مراقبت‌های بیشتری در هنگام کالبدگشایی انجام دهید.

فعالیت کارگاهی

گزارش وضعیت گله

علائم کالبد گشاپی
 شیوع بیماری در گله
 تلفات
 واکسیناسیون
 پیشنهادات
 نتیجه گیری
 پیرو بررسی های بالینی و کالبد گشاپی و با استناد روش های بررسی و تشخیص بیماری و تحلیل آزمایشات از مرغداری به این نتیجه می توان رسید که بیماری / سلامت در گله قابل تشخیص می باشد.

- ۱ لباس مناسب بپوشید (لباس کار، دستکش یکبار مصرف، ماسک).
- ۲ با راهنمایی مربيان واحد آموزشی لاشه تلف شده مرغ را کالبد گشاپی کنید.
- ۳ لاشه باز شده را کاملاً بررسی کنید.
- ۴ فرم زیر را با دقت کامل نمایید.

نمونه گزارشی از وضعیت گله

سن کالبد گشاپی
 علائم بالینی

■ درباره نتایج به دست آمده از گزارش ها در کلاس درس بحث و گفت و گو کنید.

گفت و گو
کنید



آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهنده)	نمره
۱	گزارش سلامتی گله	فرم های مربوطه	۱- اطلاع درست از وضعیت سلامت گله ۲- اطلاع نسبی از وضعیت سلامت گله ۳- عدم اطلاع درست از وضعیت گله	ثبت دقیق تلفات و ارسال نمونه های مشکوک به دامپزشکی جهت تشخیص	۳
۲				ثبت نسبتاً دقیق، تعداد تلفات و ارسال نمونه های مشکوک به دامپزشکی جهت تشخیص	۲
۳				عدم ثبت تعداد تلفات و عدم توجه به نمونه های مشکوک به بیماری های رایج	۱

تشخیص بیماری‌های مرغ

به بیماری‌های مرغ باید به عنوان یک بیماری در کل گله نه به عنوان یک بیماری انفرادی توجه شود. وجود علائم در تعداد کمی از پرنده‌گان معمولاً نشانه‌ای از وجود مشکل و یا بیماری در سطح گستردگی از گله است.

۱ معاینه اندام‌های خارجی: قبل از شروع معاینه اندام‌های داخلی مرغ‌ها، باید به مشاهده و بازرسی علائم و نشانه‌های ظاهری آنها پرداخت. به وضعیت عمومی مرغ و همچنین وجود عضله بر روی استخوان توجه داشت. پوست و همه منافذ طبیعی بدن از جمله سوراخ‌های بینی، دهان، گوش و مقعد و همچنین سر، چشم‌ها، تاج و ریش را از نظر وجود تورم، جراحات و تاول، ترشح و یا رنگ‌های غیر طبیعی معاینه کرد. باید به وجود نشانه‌های لنگش، فلنجی و یا ضعف عمومی در گله توجه کرد. سطح خارجی بدن پرنده‌گان را از نظر آسودگی به انگل‌های خارجی مانند جرب، شپش، کنه و کک بازرسی کنید.

۲ معاینه اندام‌های داخلی: بعد از معاینه اندام‌های خارجی، اندام‌های داخلی شامل: دستگاه تنفسی، دستگاه‌های ادراری، تناسلی، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش معاینه شوند.

تشخیص بیماری‌های مرغ بر سه اصل مهم زیر استوار است :

- ۱ آشنایی با وضعیت ساختار بدن و اندام‌های حیاتی مرغ
- ۲ دانش و آگاهی کافی درباره نشانه‌ها و عوارض بیماری‌ها
- ۳ داشتن برنامه مشخص برای معاینه بدن پرنده‌گان

تشخیص سریع بیماری و استفاده به هنگام از درمان‌های مؤثر می‌تواند از بروز بیماری‌های شایع و شروع تلفات در مرغداری‌ها جلوگیری کند.

فعالیت کارگاهی

گزارش تلفات و علائم بیماری

۵) سن پرنده‌گان

۶) اطلاعات مدیریتی باید شامل موارد زیر باشد:

(الف) نام کارخانه جوچه کشی

(ب) شرایط و نحوه پرورش

(ج) برنامه تغذیه‌ای

(د) تاریخچه کامل برنامه واکسیناسیون

۷) اطلاعات مربوط به بیماری شامل موارد ذیل است:

(الف) اولین زمان مشاهده بیماری

(ب) شدت بیماری و تعداد پرنده‌گان مبتلا شده

(ج) تعداد تلفات

(د) تاریخچه‌ای از درمان‌های انجام شده

ابزار و وسائل مورد نیاز

لباس کار چکمه ماسک فرم مربوط به آن

مواحل انجام کار

منبع و منشأ بسیاری از بیماری‌ها می‌تواند با اخذ

تاریخچه دقیق گله مشخص شود.

مواد ذیل باید با دقت تکمیل شود.

۸) تاریخچه دقیق گله

(الف) نام و آدرس مالک گله

(ب) تعداد پرنده‌گان موجود در گله

(ج) نژاد سویه

نکته

باید وقوع بیماری در گله‌های قبلی و یک سری مشکلات و یا وضعیت‌های غیرطبیعی نیز در نظر گرفته و گزارش شود.



ملاحظات	علل احتمالی	درمان‌های انجام شده	تلفات گله	شیوع بیماری در گله	عالائم کالبد گشایی	عالائم بالینی	برنامه واکسیناسیون	عالائم برنامه تغذیه	سن	نام مالک مرغداری:	نژاد سویه:	تعداد گله:	نام کارخانه جوچه کشی:		تاریخ جوچه ریزی:
													شماره سالن	سالن شماره	

ارزشیابی شایستگی پیشگیری از بیماری‌ها

شرح کار:

- ۱- انجام اقدامات قرنطینه‌ای
- ۲- بررسی وضعیت سلامتی مرغ‌ها
- ۳- جمع‌آوری تلفات
- ۴- معدهوم‌سازی تلفات

استاندارد عملکرد:

انجام دقیق اقدامات بهداشتی

شاخص‌ها:

- ۱- کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و ضدعفونی وسایل ورودی به سالن پرورش
- ۲- تشخیص جوجه‌های سالم از بیمار با توجه به شکل ظاهری و ارسال گزارش به دامپزشک
- ۳- تلفات جمع‌آوری شده و ثبت اطلاعات مربوط به آن
- ۴- از بین بردن تلفات به صورت بهداشتی
- ۵- اختناب از تردد افراد متفرقه
- ۶- معدهوم‌سازی تلفات با در نظر گرفتن اصول بهداشتی

شرابط انجام کار:

مواد ضدعفونی کننده
لوازم ضد عفونی
فرم‌های ثبت اطلاعات

محل اختصاص یافته برای معدهوم‌سازی تلفات
چاه تلفات یا کوره لاشه‌سوز، مرغ

ابزار و تجهیزات:
مواد ضدعفونی کننده - ابزار ضد عفونی - فرم‌های ثبت اطلاعات

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	اقدامات قرنطینه‌ای	۲	
۲	گزارش سلامتی گله	۱	
۳	جمع‌آوری تلفات	۲	
۴	معدهوم‌سازی لашه‌ها	۲	
شاخص‌گاهی غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
استدلال، محاسبه و ریاضی، حفظ اینمنی در زمان انجام کار، استفاده از لباس کار مخصوص، جلوگیری از انتشار بیماری‌ها به خارج از سالن و محل پرورش، معدهوم کردن بهداشتی لاشه‌ها، امانت داری و صداقت			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری: ۱۴

درس: تولید و پرورش مرغ

رشته: امور دامی

- ۱ فرخوی محسن، خلیقی سیگارودی، تقی و فریدون نیک نفس (مترجمین)، راهنمای کامل پرورش طیور، انتشارات واحد آموزش و پژوهش کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، چاپ چهارم ۱۳۷۸.
- ۲ پوررضا جواد، اصول علمی و عملی پرورش طیور، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۷۰.
- ۳ اکبری علیرضا، شجاعدوسوست، بهرام و غلامعلی کلیدری (مترجمین)، مدیریت بهداشت و جوجه‌کشی، انتشارات واحد آموزش و پژوهش کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، ۱۳۷۵.
- ۴ پوررضا جواد، قربانعلی صادقی، مهران مهری (مترجمین)، تغذیه مرغ اسکات، انتشارات ارکان دانش، چاپ چهارم ۱۳۹۰.
- ۵ مزینی، پرویز، مبانی کارشناسی دام و طیور، مرکز نشر سپهر، نیکخواه، ۱۳۸۰.
- ۶ فرودی، فرهاد، دامپروری عمومی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم ۱۳۸۷.
- ۷ راهنمای مدیریت پرورش جوجه‌گوشتی، آرین، انتشارات مرکز پشتیبانی طیور.
- ۸ راهنمای مدیریت پرورش مرغ تخم‌گذار لوهمن ال اس ال لایت.
- ۹ فراهانی، جواد و مسعود قنبری امیر، راهنمای مدیریت مرغ تخم‌گذار هایلاین، انتشارات شرکت مرغک، ۲۰۱۵.
- ۱۰ گلیان، ابوالقاسم و محمدسالار معینی، تغذیه طیور، انتشارات واحد آموزش و پرورش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، چاپ سوم با ویرایش ۱۳۸۸.
- ۱۱ اوحدی نیا، حسن، تشخیص درمانگاهی و آزمایشگاهی و کالبدگشایی بیماری‌های طیور، انتشارات علم و فلم، ۱۳۹۱.
- ۱۲ حسن‌آبادی احمد، سعید خلجمی، تغذیه و منابع غذایی طیور، انتشارات دانشگاه زنجان، ۱۳۸۷.
- ۱۳ رکنی حسن، رضا ناصرالاسلامی، سasan شمس سبحانی، اصول پرورش مرغ تخم‌گذار، انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی، ۱۳۹۰.



بهرآوزان محترم، بهرجوان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پیام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر ثانی کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار داشت

- همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت نموده اند.
- استان خراسان رضوی: علی اسدی
- شهرستان های استان تهران: اردشیر احمدی، مهدی عابدینی سانیچی
- استان قزوین: حمید اسماعیلی، محمد سلمانی ایزدی، مریم گلچین کوهی، افشین یارمحمدی
- استان کرمان: سعید خسروی
- استان کرمانشاه: علیرضا رشیدی
- استان گیلان: محمد انتظامی پور
- استان لرستان: اسدالله حسنوند