


## پودمان ۳

# امور فنی پرورش ماکیان



برای پرورش ماکیان، عوامل محیطی برای رشد و بازدهی بالا باید مورد توجه قرار گیرند. عواملی چون میزان تهویه، رطوبت نسبی، درجه حرارت، مدت و شدت روشنایی از جمله این موارد هستند که عدم تأمین هر یک از این عوامل در حد مطلوب می‌تواند سبب بروز مشکلات و بیماری‌هایی در پرورش ماکیان شود؛ لذا باید با توجه به دستورالعمل پرورش اقدام به تأمین و کنترل عوامل محیطی دخیل در امر پرورش نمود.

## واحد یادگیری ۴

# تأمین و کنترل شرایط محیطی سالن پرورش ماکیان

### آیا قابه حال پی برده‌اید

- چه عواملی باید در سالن پرورش ماکیان کنترل شود؟
- از چه روش‌هایی برای تأمین دما و رطوبت در سالن پرورش ماکیان استفاده می‌شود؟
- از چه روش‌هایی می‌توان برای تهویه سالن پرورش ماکیان استفاده کرد؟
- در نمونه‌برگ‌های مربوط به کنترل شرایط محیطی چه اطلاعاتی باید ثبت شود؟

هدف از این بخش آموزش نحوه ایجاد شرایط محیطی مناسب (حرارت، رطوبت، تهویه و نور) در سالن پرورش ماکیان است، برای این منظور باید چهار عامل حرارت، رطوبت، تهویه و نور در محل پرورش به صورت مطلوب تأمین شود. در این بحث با نحوه تأمین و کنترل این عوامل آشنا شده و چگونگی انجام آن را فرا می‌گیرید. ایجاد شرایط محیطی مناسب در محل پرورش ماکیان باعث افزایش تولید و بازدهی می‌شود.

### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود به صورت روزانه شرایط محیطی (حرارت، رطوبت، تهویه و نور) سالن پرورش ماکیان را طبق دستورالعمل تأمین و کنترل کنند.

## دما و رطوبت سالن پرورش ماکیان به چه روش‌هایی تأمین می‌شود؟


بحث کلاسی



## دما

در طول یک دوره پرورش ماکیان یکی از مسائلی که به طور جدی یک پرورش‌دهنده باید به آن توجه کند تأمین، تنظیم و کنترل دما در محل پرورش ماکیان است. تنظیم دما و مدیریت آن مسئله‌ای بسیار مهم است و چنانچه به آن توجه نشود پرنده‌ها آسیب خواهند دید. چرا که در صورت کاهش دما جوجه‌ها علاوه بر بروز بیماری در گله، در اثر جمع‌شدن جوجه‌ها کنار یکدیگر احتمال خفگی وجود دارد، در مقابل افزایش دما باعث ایجاد عدم اشتها، لله زدن ماکیان و کاهش وزن می‌شود.

مشاهده وضعیت قرارگرفتن پرندگان در کف سالن، راهنمای خوبی برای قضاوت درمورد دمای سالن می‌باشد. برای تعیین دمای بهینه علاوه بر درجه حرارت ثبت شده بر روی دماسنجد، درصد رطوبت نسبی و شدت جریان هوا نیز مؤثر است. دمای سالن در روزهای اول پرورش باید بین ۳۲-۳۵ درجه سانتی‌گراد باشد و به تدریج هفت‌های ۲ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد تا به دمای ۱۹-۲۱ درجه سانتی‌گراد برسد.



بررسی علت پراکندگی جوجه‌ها در سالن پرورش

علاوه بر موارد بیان شده افزایش و کاهش دما چه مشکلات دیگری را برای ماکیان ایجاد می‌کند؟

پرسش





دما مطلوب برای پرورش شترمرغ، بوقلمون، کبک و بلدرچین در سنین مختلف چقدر است؟

## روطوبت

کنترل رطوبت در سالن‌های پرورش ماکیان اهمیت زیادی دارد زیرا کاهش رطوبت سالن منجر به دهیدراته شدن (از دست دادن آب بدن) جوجه‌ها و افزایش گرد و غبار در محل پرورش می‌شود و اگر رطوبت سالن بیش از حد باشد موجب کاهش توانایی دفع حرارت توسط ماکیان، افزایش رطوبت بستر و کاهش ظرفیت تنفسی پرنده می‌شود و نیز بروز بیماری‌های انگلی می‌شود.

دما و رطوبت با یکدیگر نسبت عکس دارند یعنی هر جا دما افزایش یابد رطوبت کاهش می‌یابد.  
دما و رطوبت داخل سالن تا حدی تحت تأثیر دما و رطوبت خارج از سالن قرار می‌گیرد.

توجه



## دما مورد نیاز برای پرورش شترمرغ

درجه حرارت محل پرورش شترمرغ مهم‌ترین عامل در تعیین میزان فعالیت آنها است. دما مطلوب با توجه به وزن و سن شترمرغ تغییر می‌کند. افزایش دما عامل مهمی برای شروع تولید مثل در شترمرغ‌های بالغ است؛ لذا با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت در مناطق مختلف ایران در پرورش این پرنده باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که شروع تولید جوچه شترمرغ در اواخر زمستان و یا اوایل بهار می‌باشد؛ لذا تأمین وسایل گرمایش و مادرمصنوعی ضروری است و در این خصوص نباید غفلت کرد. سیستم گرمایش از کف برای سالن پرورش جوجه (تولد تا ۱ ماهگی) به خصوص برای فصول سرد سال ضروری است. فقط داخل حلقه‌های پرورش به این سیستم مجهز شود و حتی برای صرفه جویی در هزینه‌ها می‌توان قسمتی از هر بخش را به این امر اختصاص داد. سیستم گرمایش از کف محیطی مطلوب را برای جوجه‌ها فراهم نموده و مانع از سرد شدن ناحیه شکمی جوجه می‌شود. سرد شدن ناحیه شکم جوجه باعث تأخیر در جذب کیسه زرده، اختلال در سیستم گوارشی و سلب آرامش جوجه می‌گردد. توجه داشته باشید که سیستم گرمایش از کف نباید به عنوان منبع حرارتی برای گرم کردن سالن درنظر گرفته شود، زیرا زمانی که از این سیستم با هدف گرم نمودن سالن پرورش استفاده شود، کف سالن بیش از حد گرم شده و در نتیجه جوجه‌ها بیش از حد احساس گرما نموده که در این صورت جوجه دهیدراته شده و آرامش خود را از دست می‌دهد و از آشامیدن و خوراک خوردن امتناع می‌کند. بنابراین نباید سرد و همچنین داغ باشد. بنابراین علاوه بر گرمایش از کف، باید منبع حرارتی مطمئن (هیتر یا فن جت یا مادر مصنوعی) برای گرم نمودن سالن نیز در نظر گرفت.

اگر استفاده از سیستم گرمایش از کف امکان‌پذیر نیست، باید یک بستر مناسب بین کف سالن و شکم جوجه به عنوان عایق در نظر گرفت و در بالای سر جوجه‌ها نیز لامپ حرارتی قرار گیرد. در صورت استفاده از مادرمصنوعی (لامپ حرارتی، بخاری، رادیاتور با آب گرم و مانند آن) دما می‌سالن پرورش جوجه در حدود ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. ارتفاع مادر مصنوعی باید طوری تنظیم شود که در ارتفاع قد جوجه‌ها حدود ۳۲ درجه سانتی‌گراد

## امور فنی پرورش ماکیان

منبع حرارتی فاصله می‌گیرند و اگر بیش از اندازه بالا باشد جوجه‌ها بر روی هم انباشته شده و امکان خفگی آنها وجود دارد.



استفاده از مادر مصنوعی برای گرم کردن جوجه‌های شترمرغ

هم زمان با افزایش سن جوجه شترمرغ ارتفاع مادر مصنوعی باید افزایش یابد تا به توان حرارت را به تدریج هفت‌های ۲ درجه سانتی‌گراد کاهش داد تا زمانی که دما به ۲۰ درجه سانتی‌گراد برسد. بهترین دما برای پرورش جوجه در سن ۳ ماهگی در حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد است.

توجه

با توجه به اینکه اختلاف قابل توجهی در وزن پرنده‌گان در هر سن وجود دارد بهتر است، تنظیم دمای اتاق بر اساس میانگین وزن شترمرغ صورت گیرد.



دمای مطلوب سالن پرورش با توجه به سن و وزن جوجه شترمرغ (بدون مادر مصنوعی)

درجه حرارت سالن (درجه سانتی‌گراد)	وزن	سن (روز)
۳۲	کمتر از ۱ کیلوگرم	۱-۳
۳۰	کمتر از ۱/۲ کیلوگرم	۴-۷
۲۸	کمتر از ۱/۵ کیلوگرم	۸-۱۴
۲۶	کمتر از ۲ کیلوگرم	۱۵-۲۱
۲۴	کمتر از ۵ کیلوگرم	۲۲-۳۵
۲۲	کمتر از ۱۰ کیلوگرم	۳۶-۵۰
۲۰	کمتر از ۳۵ کیلوگرم	۵۱-۶۰

توجه



با گذشت فصل بهار و شروع فصل تابستان مشکلات پرورش جوجه شترمرغ افزایش یافته و از رشد کمتری برخوردار می‌شوند. استفاده از سایبان، خنک کردن محیط با استفاده از مهپاش، افزایش تهویه سالن و سایر روش‌های معمول می‌تواند مشکلات مربوط به پرورش جوجه‌ها را کاهش دهد.

بیشتر بدانیم



در یک ماه اول پرورش (به خصوص در دو هفته اول) فضای زیاد در اختیار جوجه‌های شترمرغ قرار نگیرد. این امر باعث پراکندگی جوجه‌ها، کاهش مصرف خوارک و آب و ایجاد استرس در جوجه‌ها می‌شود. بنابراین در فضای مسقف برای هر چهار قطعه جوجه یک مترمربع و در گردشگاه برای هر ۲ قطعه جوجه یک مترمربع فضا در نظر گرفته شود. بعد از سن یک ماهگی نیاز به فضای بیشتر می‌باشد؛ بنابراین کمبود فضای می‌تواند در جوجه‌ها ایجاد استرس نماید.

### روطوبت مورد نیاز برای پرورش شترمرغ

در روزهای گرم بلافضله پس از بارش باران، میزان رطوبت خیلی زیاد خواهد بود. شستشوی روزانه محوطه نیز میزان رطوبت در داخل سالن را به خصوص در ماهای بالاتر که برای نگهداری جوجه‌ها موردنیاز است، بالا می‌برد. اگر دما و رطوبت بالا باشد جوجه‌ها در خنک کردن خودشان با مشکل روبرو خواهند شد که کاهش دمای هوا در این شرایط مفید خواهد بود. رطوبت بالا رشد میکروبی خصوصاً در مورد قارچ‌هایی مانند آسپرژیلوس را تقویت می‌کند. کنترل میزان رطوبت در محل پرورش می‌تواند در کاهش اثرات منفی عفونت‌های قارچی دستگاه تنفسی مؤثر باشد.



افزایش رطوبت محل پرورش شترمرغ در اثر بارش باران

## امور فنی پرورش ماکیان

### دماهی مورد نیاز برای پرورش بوقلمون

دما در هفته‌های مختلف برای پرورش بوقلمون باید مطابق جدول زیر تنظیم شود:

دماهی مناسب برای پرورش بوقلمون در سنین مختلف

هفتاه	هفتم به بعد	ششم	پنجم	چهارم	سوم	دوم	اول	هفته
۲۱	۲۳	۲۵	۲۷	۲۹	۳۱	۳۶-۳۴	دما بر حسب درجه سانتی‌گراد	

دماهی سالن را باید به تدریج کاهش داد. به‌طوری که در آغاز هفته دوم به  $31^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد برسد و سپس هر هفته  $2^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد از آن کاست.

برای تنظیم دماهی سالن پرورش بوقلمون، حتماً از راهنمای پرورش نژاد مورد نظر استفاده کنید.

توجه



### رطوبت مورد نیاز برای پرورش بوقلمون

در سه روز ابتدایی دوره پرورش بوقلمون رطوبت نسبی مناسب حدود  $60\text{--}75\%$  درصد و از روز سوم تا آخر دوره پرورش رطوبت  $50\text{--}55\%$  درصد در نظر گرفته می‌شود.

پرسش

چرا در سه روز اول دوره پرورش بوقلمون به میزان بالای رطوبت نیاز است؟



محل پرورش جوجه بوقلمون

## دماهی مورد نیاز برای پرورش بلدرچین

دماهی مناسب برای پرورش بلدرچین در سنین مختلف به شرح جدول زیر است و نکته مهم این است که دما باید به صورت تدریجی کاهش یابد.

### دماهی مورد نیاز برای پرورش بلدرچین در سنین مختلف

سن جوجه بلدرچین	دما بر حسب سانتی‌گراد
هفته اول	۳۷-۳۵
هفته دوم	۳۴
هفته سوم	۳۲
هفته چهارم	۲۹
هفته پنجم	۲۵
شش هفتگی به بعد	۲۵-۲۳

معیار ارزیابی دماهی سالن فقط نباید بر اساس مشاهده دماسنج‌های نصب شده باشد بلکه باید به راحتی و تحرک جوجه‌ها نیز توجه کرد.

تحقیق کنید



افزایش و کاهش دما چه اثری بر عملکرد و تولید بلدرچین خواهد داشت؟

## رطوبت مورد نیاز برای پرورش بلدرچین

رطوبت سبب افزایش توان نگهداری حرارت در هوا شده و نوسانات دماهی به آرامی اتفاق می‌افتد. رطوبت مناسب سبب راحتی تنفس پرندگان می‌شود. رطوبت نسبی مناسب روزهای اول حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد است که هم‌زمان با رشد جوجه در هفته پنجم به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.



محل پرورش جوجه بلدرچین

## نیاز حرارتی کبک در مراحل مختلف پرورش

جوچه کبک هج شده وزنی در حدود ۱۸ گرم دارد. به دلیل عدم توانایی بدن در کنترل دما، جوچه کبک نیز مانند بلدرچین به تغییرات دمایی بسیار حساس است و در روزهای اول پرورش در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد تا چند ساعت بیشتر نمی‌تواند زنده بماند.

یکی از رفتارهای غریزی جوچه کبک و بلدرچین در زمان کاهش دما جمع شدن روی هم است. جوچه با این رفتار سعی می‌کند از اتلاف گرمای بدن جلوگیری کند و با تجمع در کنار هم به گرم شدن یکدیگر کمک کنند. اگر روند کاهشی دما بیشتر شود، جوچه‌ها تلاش می‌کنند که به عمق توده تجمع یافته نفوذ کنند تا گرم شوند و در اثر این رفتار جوچه‌هایی که در عمق قرار می‌گیرند بعد از دقایقی با کمبود اکسیژن مواجه شده و تلف می‌شوند.

بنابراین نوسانات دما در روزهای نخستین پرورش حتی به میزان یک درجه سانتی گراد علاوه بر افزایش تلفات سبب کاهش راندمان تولید در طی دوره پرورش می‌شود.

### دماهی مورد نیاز برای پرورش کبک در سنین مختلف

ششم به بعد	پنجم	چهارم	سوم	دوم	اول	هفته
۱۹	۲۲	۲۵	۲۸	۳۱	۳۵-۳۳	حرارت

دماهی سالن را باید به تدریج کاهش داد و در شروع هفته دوم به ۳۱ درجه سانتی گراد رساند و سپس هر هفته ۳ درجه سانتی گراد از آن کم نمود و با افزایش سن و کامل شدن پرهای بدن دما به ۱۹ درجه سانتی گراد می‌رسد.

## رطوبت سالن‌های پرورش کبک


تأمین رطوبت مورد نیاز در سالن پرورش کبک رشد سریع و سلامت جوچه‌ها را به دنبال دارد. با توجه به این که دماهی سالن در ابتدای دوره پرورش کبک نسبتاً بالا است؛ بنابراین رطوبت کم در سالن سبب از دست رفتن سریع آب بدن و در نتیجه کاهش رشد و افزایش تلفات می‌شود. رطوبت زیاد هم منجر به خیس شدن بستر، ایجاد مشکلات تنفسی و بیماری‌های گوارشی برای پرنده می‌شود؛ بنابراین تنظیم رطوبت سالن نیز همانند تأمین دما یکی از موارد مهم در پرورش جوچه کبک محسوب می‌شود. بهترین میزان رطوبت هوا بین ۶۰ تا ۷۵ درصد بوده و به هیچ عنوان نباید به بیش از ۷۵ درصد و پایین‌تر از ۵۰ درصد برسد.



محل پرورش جوجه کبک

برای تأمین رطوبت محل پرورش شترمرغ، بوقلمون، کبک و بلدرچین می‌توان از روش‌های مختلفی مثل دستگاه‌های رطوبت‌ساز، قرار دادن ظروف آب در مسیر هواده یا روی منبع حرارتی، خیس کردن محوطه‌های خالی سالن و دیوارها، آویزان کردن گونی یا پارچه مرطوب، اسپری کردن آب در سالن از طریق مه‌پاش و پوشال خنک کننده (پد) استفاده نمود.

توجه



استفاده از پد سلولزی




استفاده از مه‌پاش

## امور فنی پرورش ماکیان

در تصاویر زیر با توجه به پراکنش جوجه‌ها در محل پرورش، علت رفتار جوجه‌ها را بررسی و یادداشت نمایید.

پرسش



با توجه به دانسته‌های پیشین به تصاویر زیر دقت کنید، دمای حداکثر و حداقل و میزان رطوبت را مشخص کنید؟

پرسش



..... رطوبت .....



..... دمای حداقل ..... دمای حداکثر .....

فعالیت  
کارگاهی



تنظیم دما و رطوبت سالن پرورش ماکیان  
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

۱- لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی (دستکش، ماسک)

۲- وسایل گرم کننده مانند هیتر و مادر مصنوعی

۳- مهپاش برای تأمین رطوبت ۴- دماسنجد ۵- رطوبتسنج

۶- آب ۷- هیتر یا فن جت مجهز به ترموموستات

مراحل انجام کار:

۱- لباس کار بپوشید.

۲- دما و رطوبت سالن پرورش را با مشاهده دماسنجد و رطوبتسنج، در نمونبرگ  
مربوطه ثبت کنید.

۳- در صورت نامناسب بودن دما یا رطوبت سالن آن را مطابق جداول استاندارد پرورش ماکیان تنظیم کنید.

۴- وضعیت پراکنده‌ها، را بررسی کنید و در نمونبرگ مربوطه ثبت کنید.

۵- هیتر یا مادر مصنوعی را تنظیم کنید به نحوی که با کاهش یا افزایش اندازه دمای هوا از دمای تنظیم شده، روشن  
یا خاموش شوند.

بهداشت و  
سلامت



همواره قرنطینه و بهداشت را رعایت کنید تا از ورود آلودگی به سالن پرورش ماکیان جلوگیری شود.

بحث کلاسی



اهمیت برنامه نوری در پرورش ماکیان چیست؟

## برنامه روشنایی

برنامه نوردهی و تنظیم آن تأثیر زیادی بر آسایش، عملکرد و بهره‌وری ماکیان دارد. ایجاد یک الگوی مشخص برای روشنایی و تاریکی باعث برقراری دوره‌های منظم استراحت و فعالیت می‌شود، از سوی دیگر بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی و رفتاری پرندگان از تغییرات طبیعی روزانه تبعیت می‌کنند؛ بنابراین، تنظیم یک برنامه نوری مناسب اهمیت زیادی در الگوهای رفتاری و رشد و نمو پرندگان دارد.

چهار جزء مهم یک برنامه نوری عبارت‌اند از:

■ طول دوره روشنایی: تعداد ساعت‌های روشنایی و تاریکی که در یک دوره ۲۴ ساعت اعمال می‌شود.

■ توزیع دوره روشنایی: چگونه ساعت‌های روشنایی و تاریکی در یک دوره ۲۴ ساعت توزیع شده است.

■ طول موج: رنگ نور.

■ شدت نور: میزان روشنایی در واحد سطح می‌باشد.

برنامه نوری مناسب برای هر گله بستگی به سن، نژاد و هدف پرورش (گوشتی یا تخم‌گذار) دارد.



### برنامه نوردهی در پرورش شترمرغ

جوچه‌های شترمرغ در اوایل دوره پرورش باید نور مداوم دریافت کنند. بعد از این که جوچه‌ها به سن ۳ هفتگی رسیدند در هنگام شب نیاز به روشنایی ندارند. عملکرد تولید مثلی شترمرغ با توجه به مدت روشنایی روز تنظیم می‌شود. در شترمرغ‌های ماده تولید تخم با افزایش طول روز آغاز می‌شود و در پاییز با کاهش طول روز کاهش می‌یابد. سلامت شترمرغ‌های تخم‌گذار به برنامه نوری مناسب بستگی دارد. برای اجرای برنامه نوری ترکیبی از روشنایی روز و نور مصنوعی برای تحریک، باروری و حفظ تولید تخم در پرندگان ماده ضروری است. در فصل جفت‌گیری پس از قرار گرفتن شترمرغ‌های نر و ماده در کنار یکدیگر باید مدت روشنایی به ۱۶ ساعت در روز تا آخر فصل تولید مثل افزایش یابد. هر چند این برنامه نوری، ۳ الی ۴ هفته قبل از انتقال پرندگان نر به جایگاه شترمرغ‌های ماده برای آنها باید اجرا شود. در پایان روز می‌توان از شدت نور مصنوعی ۲۵ لوکس در ارتفاع سر برای تحریک و حفظ تولید تخم استفاده کرد. در مدت تخم‌گذاری شترمرغ، طول روز و شدت نور هرگز نباید کاهش یابد. کاهش شدت و مدت نور باعث توقف کامل تولید تخم در گله مولد خواهد شد.



استفاده از نور طبیعی در پرورش شترمرغ

### برنامه نوردهی در پرورش بوقلمون

با توجه به پرورش صنعتی بوقلمون (گوشتی یا گله مادر) در محیط بسته، تأمین نور مناسب برای حفظ دید گله و دستیابی آسان آنها به دان و آب و همچنین تحریک نوری گله مادر برای تولید تخم نطفه‌دار، تنظیم و اجرای یک برنامه روشنایی کارآمد با شدت نور مناسب ضروری است. در پرورش بوقلمون مطابق جدول زیر روشنایی کامل از روز اول تا سوم دوره پرورش با شدت ۸۰ لوکس ضروری است. پس از آن جوچه‌ها باید با ۱۰ ساعت تاریکی مداوم در هر شب مواجه شوند. اعمال دوره‌های تاریکی به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب توصیه می‌شود.

برنامه نوردهی بوقلمون‌های سنگین وزن در فصل بهار و تابستان

مدت تاریکی	مدت روشنایی	سن
۰	۲۴	۳-۰ روزگی
۴	۲۰	۷-۴ روزگی
۴	۲۰	۶-۲ هفتگی
۵	۱۹	۷ هفتگی
۶	۱۸	۸ هفتگی
۷	۱۷	۹ هفتگی
۸	۱۶	۱۰ هفتگی
۹	۱۵	۱۱ هفتگی
۱۰	۱۴	۱۲ هفتگی

برنامه نوردهی بوقلمون‌های سنگین وزن در فصل پاییز و زمستان

مدت تاریکی	مدت روشنایی	سن
۰	۲۴	۳-۰ روزگی
۴	۲۰	۷-۴ روزگی
۴	۲۰	۶-۲ هفتگی
۵	۱۹	۷ هفتگی
۵/۵	۱۸/۵	۸ هفتگی
۶	۱۸	۹ هفتگی
۶/۵	۱۷/۵	۱۰ هفتگی
۷	۱۷	۱۱ هفتگی
۸	۱۶	۱۲ هفتگی

- ۱- در طی دوره تنفس گرمایی شدید، با کاهش مدت روشنایی می‌توان از تنفس گرمایی ماکیان جلوگیری کرد.  
 ۲- افزایش شدت نور و مدت روشنایی، مصرف خوراک و همدیگرخواری (کانی‌بالیسم) را افزایش می‌دهد.

توجه



### برنامه نوردهی در گلهای بوقلمون مادر

برنامه نوری یک عامل مؤثر بر عملکرد گله بوقلمون مادر است. توصیه یک برنامه نوری برای گلهایی در موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت، با انواع سالن‌های پرورش، شرایط آب و هوایی و روش‌های مدیریتی مختلف غیرممکن است. علاوه‌بر این در زمان اجرای برنامه نوری باید به سن و بلوغ تولیدمثلى پرنده توجه نمود. جدول زیر نحوه اجرای یک برنامه نوری را در گله بوقلمون مادر نشان می‌دهد.

برنامه نوری توصیه شده برای بوقلمون‌های ماده گله مادر

دوره پرورش	مدت روشنایی در سالن بسته و پنجره‌دار	حداقل شدت نور بر حسب لوکس
۱ روزگی تا ۱۷ هفتگی	۱۰ ساعت نور مداوم، اگر مدت روشنایی روز طبیعی کمتر از ۱۰ ساعت باشد از نور مصنوعی استفاده شود	۱۰۰-۸۰
۱۸ تا ۳۰ هفتگی	حداکثر ۶ ساعت	۱۰۰-۲۰
۳۰ هفتگی تا پایان تولید	حداقل ۱۴ ساعت	۱۲۰

برنامه نوری توصیه شده برای بوقلمون‌های نر گله مادر

دوره پرورش	مدت روشنایی در سالن بسته و پنجره‌دار	حداقل شدت نور بر حسب لوکس
۱ روزگی تا ۱۷ هفتگی	میزان ثابت ۱۴ ساعت روشنایی که به تدریج به ۱۶ ساعت روشنایی تا پایان دوره تولید افزایش می‌یابد. در سالن‌های پنجره‌دار استفاده از نور طبیعی و مصنوعی برای حفظ ۱۴ ساعت روشنایی	۱۰۰-۸۰
۱۸ تا ۳۰ هفتگی	حداکثر ۶ ساعت	۱۰۰-۲۰
۳۰ هفتگی تا پایان تولید	حداقل ۱۴ ساعت	۱۲۰



اجرای برنامه نوری در سالن پرورش بوقلمون

## برنامه نوردهی در پرورش بلدرچین

در طبیعت بلدرچین پرندهای با دوره تولید مثل کوتاه است و این دوره منحصر به فضول بهار و تابستان می‌باشد. این حیوان به شدت نسبت به افزایش طول روز عکس العمل نشان می‌دهد. در جنس ماده افزایش ساعات روشنایی باعث تسريع در بلوغ جنسی می‌شود. در گله‌های گوشتی، برای تأخیر در سن بلوغ جنسی و در نتیجه افزایش وزن، طول مدت نوردهی را کاهش می‌دهند. برای تولید تخم مناسب باید ۱۶-۲۰ ساعت نوردهی با شدت حداقل ۱۵-۲۰ لوکس باید تأمین شود. اگر طول مدت نوردهی کاهش یابد، میزان تولید تخم و آمیزش کاهش یافته و یا حتی متوقف می‌شود.

بلوغ جنسی در پرنده نر در حالت تأمین ۱۲ ساعت روشنایی و پرورش در کنار پرنده ماده سریع‌تر می‌باشد. همچنین می‌توان برنامه‌های نوری مورد استفاده در پرورش مرغ گوشتی را برای پرورش بلدرچین‌های گوشتی اجرا کرد.

مدت و شدت نوردهی در سالین مختلف بلدرچین

شدت نور (لوکس)	مدت روشنایی (ساعت)	سن (روز)
۲۰-۵۰	۲۴	۱-۷ روزگی
۵-۱۰	۸	روزگی تا تخم‌گذاری
۱۰-۲۰	۱۶	دوره تخم‌گذاری

۱- برای پرورش بلدرچین با هدف تولید گوشت اعمال ۸ ساعت نوردهی با شدت کم نیز کافی خواهد بود ولی بسیاری از پرورش دهنگان از روشنایی مداوم با ۱ الی ۲ ساعت خاموشی استفاده می‌کنند.

۲- در بلدرچین‌های تخم‌گذار برای دستیابی به حداقل میزان تولید تخم، اعمال ۱۶-۱۸ ساعت روشنایی ضروری می‌باشد.

توجه



اجرای برنامه نوری در سالن پرورش بلدرچین تخم‌گذار

## برنامه نوردهی در پرورش کبک

در طبیعت، کبک در فصل بهار تولیدمثل می‌کند، اما در شرایط پرورش صنعتی نیاز به فراهم کردن شرایط لازم برای تولید پیوسته کبک است. پرورش کبک نیز مانند سایر ماکیان به دو منظور تولیدگوشت و تخم صورت می‌گیرد. از آنجا که کبک در ۷ ماهگی به سن بلوغ جنسی و در ۴ ماهگی به بلوغ وزنی می‌رسد؛ بنابراین در صورتی که هدف تولید گوشت باشد، مدت دوره پرورش ۴ ماه خواهد بود که در این مدت میزان روشنایی و شدت نور مشابه پرورش مرغ گوشتی است.

فعالیت کبک برای تخم‌گذاری در ۷ ماهگی آغاز می‌شود که با اجرای برنامه نوری مشابه پرورش بلدرچین تخم‌گذار می‌توان از بلوغ زودرس پرنده جلوگیری کرد و از طرفی با افزایش مدت و شدت نور در نزدیکی سن بلوغ جنسی سبب تحریک دستگاه تولید مثل کبک و شروع تولید تخم در این پرنده شد.

مدت و شدت نوردهی در سنین مختلف کبک تخم‌گذار

شدت نور (لوکس)	مدت روشنایی (ساعت)	سن
۲۰-۵۰	۲۴	۱-۷ روزگی
۵-۱۰	۸	۸ روزگی تا تخم‌گذاری
۵۰-۱۰۰	۱۶	دوره تخم‌گذاری

معمولًاً برای هر دوره تخم‌گذاری کبک ۴ ماه در نظر گرفته می‌شود، که بعد از آن پرنده به یک دوره استراحت یا تولک نیاز دارد. برای انجام این برنامه نوری ابتدا یک دوره کاهش مدت و شدت نور اجرا می‌شود و به صورت تدریجی به ۱۶ ساعت تاریکی و ۸ ساعت روشنایی می‌رسد، به این دوره اصطلاحاً دوره استراحت یا تولک رفتن کبک می‌گویند که ۶-۸ هفته به طول می‌انجامد.

شدت نور در دوران استراحت کبک (تولک) باید در حدی باشد که کبک بتواند به آب و غذا دسترسی داشته باشد، حداکثر شدت نور باید ۵ لوکس باشد. در ساعات تاریکی نیز باید تاریکی مطلق در سالن اجرا شود. پس از طی شدن دوره تولک، به تدریج مدت و شدت نور افزایش می‌یابد تا به حدود ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی برسد. این افزایش نور روزانه ۳۰ دقیقه است. شدت نور هم باید به صورت تدریجی افزایش یابد به طوری که هر روز حدود ۵ لوکس اضافه شود تا این که در روز ۱۶ پس از شروع تحریک نوری به حدود ۸۵ لوکس برسد.

باید توجه داشت که کبک نر نسبت به کبک ماده پاسخ آرامتری به برنامه تحریک نوری دارد؛ بنابراین به منظور تولید تخم نطفه‌دار بهتر است برنامه تحریک نوری برای کبک نر یک هفته زودتر اجرا شود. در صورت اجرای همزمان برنامه نوری برای هر دو جنس کبک باید ۲ هفته پس از تولید تخم، اقدام به جمع‌آوری تخم نطفه‌دار کرد.



استفاده از روشنایی طبیعی در دوره استراحت یا تولک



سالن پرورش کبک در دوره تخم‌گذاری

با توجه به گرد و غباری که در دوره پرورش جوجه بلدرچین و کبک به خصوص در هفته‌های پایانی رشد تولید می‌شود. بهتر است در زمان کثیف شدن لامپ‌ها برای افزایش بازدهی نور، آنها را تمیز کنید.

#### اخلاق حرفه‌ای



#### فعالیت کارگاهی



تنظیم نور سالن پرورش ماکیان مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

۱- لباس کار، چکمه، ماسک ۲- نورسنگ

۳- لامپ مناسب به تعداد کافی ۴- انعکاس دهنده نور

۵- دیمر ۶- دستمال

**مراحل انجام کار:**

۱- لباس کار مناسب بپوشید.

۲- برنامه نوری موردنظر را بر اساس دستورالعمل پرورش ماکیان اعمال کنید.

۳- شدت نور را توسط دیمر تنظیم کنید.

۴- شدت نور اعمال شده را توسط دستگاه نورسنگ (لوکس‌متر) بسنجید.

۵- در صورت نامناسب بودن نور نسبت به رفع آن اقدام کنید.

۶- لامپ‌ها را هر هفته یا دو هفته یکبار با دستمال تمیز کنید.



### محاسبه تعداد لامپ

ابتدا باید مقدار فاکتور K را مشخص کنید و این بستگی به میزان وات لامپ‌ها دارد. فاکتور K در لامپ‌های تنگستن ۲۵ واتی برابر  $\frac{4}{2}$ ، در لامپ‌های تنگستن ۴۰ واتی برابر  $\frac{4}{6}$ ، در لامپ‌های تنگستن ۶۰ واتی برابر ۵ و در لامپ‌های تنگستن ۱۰۰ واتی برابر ۶ است.

$$\text{مساحت سالن (مترمربع)} \times \text{حداکثر شدت نور مورد نیاز (لوکس)} = \frac{\text{تعداد لامپ}}{\text{میزان قدرت لامپ (وات)} \times \text{ضریب K}}$$

یک استاندارد مشترک که برای توصیف نور وجود دارد مقدار لومن به ازای هر وات است. به طور مثال مقادیر مربوط به لامپ رشتهدی  $15 \text{ LM/W}$ ، لامپ کم مصرف  $60 \text{ LM/W}$  و لامپ LED  $75 \text{ LM/W}$  می‌باشد. یک لوکس عبارت است از شدت روشنایی که از جریان نوری یک لومن در روی سطح یک متر مربع ایجاد می‌شود.

### تهویه

به جابه‌جایی هوای درون سالن پرورش با هوای بیرون از آن تهویه گویند.



هدف از تهویه محل پرورش ماکیان چیست؟

به منظور تأمین اکسیژن و دفع گازهای سمی (کربن دی‌اکسید، آمونیاک، رطوبت) در داخل سالن نیاز به تهویه است. تهویه مناسب در کنترل دما و رطوبت نیز مؤثر است. تأمین اکسیژن، میزان گازهای متضاد شده و تعديل دمای داخل سالن در امر پرورش ماکیان بسیار حائز اهمیت می‌باشد. مقدار گاز آمونیاک و کربن دی‌اکسید سالن پرورش از حد مجاز آن نباید تجاوز کند. بدین منظور محاسبه تعداد، قدرت و نحوه قرار گرفتن هواکش‌ها و هواده‌ها بسیار مهم می‌باشد.



هواده و هواکش را تعریف کنید.

### أنواع تهویه

بسته به نوع سالن پرورش ماکیان از دو روش طبیعی و مکانیکی برای تهویه آن استفاده می‌شود.

### الف) تهویه طبیعی

این نوع تهویه در مناطق گرم و مرطوب، سالن‌های باز، نیمه باز و سالن‌هایی با دیواره جانبی باز همراه با پرده، امکان‌پذیر است. باید توجه داشت که کنترل شرایط محیطی در این روش تهویه دشوار است.



سالن پرورش بوقلمون با دیواره جانبی باز همراه با پرده

### ب) تهویه مکانیکی

در این نوع تهویه از هواکش دمنده یا مکنده استفاده می‌شود و بسته به نوع هواکش دمنده یا مکنده به ترتیب در اثر فشار مثبت یا منفی ایجاد شده جابه‌جایی هوا صورت می‌گیرد.

تهویه مکانیکی در سالن‌های پرورش ماکیان به ۴ روش امکان‌پذیر است:

۱- تهویه عرضی


۲- تهویه طولی (تونلی)

۳- تهویه سقفی

۴- تهویه ترکیبی

۱- تهویه عرضی

در این نوع تهویه هوا از دیواره جانبی یک طرف سالن وارد شده و پس از پیمودن عرض سالن از سمت دیگر خارج می‌شود.




تحقیق کنید



درباره مزایا و معایب روش تهویه عرضی تحقیق کنید و گزارش آن را در کلاس درس بیان کنید.

## ۲- تهویه طولی (تونلی)

در این تهویه هوا از عرض سالن وارد شده و پس از عبور در طول سالن از سمت دیگر به وسیله هوافکش‌ها خارج می‌شود، در صورتی که طول سالن بیش از ۶۰ متر باشد، سالن از وسط به دو قسمت تقسیم می‌شود و ورود هوا از این ناحیه صورت می‌گیرد.



تهویه تونلی (تهویه تابستانه)

تحقیق کنید



درباره مزایا و معایب روش تهویه طولی تحقیق کنید و گزارش آن را در کلاس درس بیان کنید.


## ۳- تهویه سقفی

در این روش می‌توان دریچه‌های ورودی یا خروجی هوا را در سقف و دیوارها در نظر گرفت این نوع تهویه برای مناطق بسیار سرد یا بسیار گرم و یا سالنهایی با عرض بیش از ۱۲ متر مناسب است.

پرسش



دلایل استفاده از تهویه سقفی در مناطق بسیار سرد یا بسیار گرم چیست؟



تهویه سقفی


تحقیق کنید



درباره مزايا و معایب روش تهویه سقفی تحقیق کنید و گزارش آن را در کلاس درس بیان کنید.

#### ۴- تهویه ترکیبی

در این روش تهویه، هوا از طول و عرض سالن وارد شده و پس از عبور از کل سالن از هواکش‌هایی که در عرض و انتهای سالن قرار گرفته، خارج می‌شود. در این نوع تهویه باید توجه نمود که ورود هوا از دو طرف طول سالن طوری باشد که به طرف سقف هدایت شده و پس از برخورد با تاج سقف به سمت پایین سالن هدایت شود و مسیر طول سالن را طی نموده و سپس از هواکش‌ها خارج شود.



تهویه ترکیبی

تحقیق کنید




درباره مزايا و معایب روش تهویه ترکیبی تحقیق کنید و گزارش آن را در کلاس درس بیان کنید.

#### پرسش



با توجه به مطالب بیان شده نوع روش تهویه در سالن‌های صفحه بعد را مشخص کنید.



هواکش برای انجام تهیویه سالن

### تهیویه در سالن‌های پرورش شترمرغ

در پرورش شترمرغ بسته به روش پرورش و اقلیم از گردشگاه و فضای مسقف در سنین مختلف برای جوجه‌ها، پرنده‌های جوان و پرنده‌های مولد استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای جوجه‌ها کنترل دما از اهمیت بیشتری برخوردار است. سالن پرورش جوجه‌ها باید از تهیویه مناسب برخوردار باشد؛ زیرا گرم نگه داشتن سالن از طریق کاهش تهیویه می‌تواند موجب تجمع گاز آمونیاک و آسیب مخاط دستگاه تنفس، بافت ملتحمه و قرنیه چشم شود. همچنین تجمع گازهای سمی از قبیل آمونیاک که از مدفعه و یا فساد فضولات ایجاد می‌شود، می‌تواند علاوه بر سلامت جوجه شترمرغ‌ها برای کارکنان نیز زیان آور باشد.

جوجه‌ها به ترتیب در حلقه‌های پرورش قرار گرفته، به طوری که از سمتی که هوای تهیویه سالن (انتهای سالن) قرار دارند، این بخش‌ها جوجه‌ریزی شده و به سمت دیگر سالن ادامه می‌یابد. در این صورت با افزایش سن جوجه‌ها، جوجه‌های جدید در محلی قرار خواهند گرفت که آلوگی کمتری وجود داشته و هوای سالم و تمیز، ابتدا در اختیار آنان قرار خواهد گرفت و سپس جوجه‌های مسن‌تر از آن استفاده نموده و نهایتاً هوای کثیف توسط هوایکش‌ها از سالن خارج می‌شود.

بسته به ابعاد سالن پرورش در انتهای سالن یک یا دو هوایکش (بر اساس طول و عرض سالن و نیز حداکثر تراکم جوجه در سالن) با قدرت مناسب منظور می‌شود. در صورت لزوم و در روز و یا شب‌های گرم تابستان می‌توان پنجره‌ها را باز نمود و هوایکش‌ها را روشن کرد تا اکسیژن و هوای تازه در اختیار جوجه‌ها قرار گیرد.

## بیشتر بدانیم



برای ماکیان، حداقل و حداکثر سرعت تهويه در محل پرورشی به ترتیب  $1/5$  و  $6$  مترمکعب در ساعت به ازای هر کیلوگرم وزن زنده است. از این ارقام نیز می‌توان برای جوجه شترمرغ‌ها استفاده کرد.

## پرسش



اگر در یک اتاق پرورش جوجه، تعداد  $100$  قطعه جوجه شترمرغ با میانگین وزن  $5$  کیلوگرم نگهداری شود در نتیجه حداقل هوای مورد نیاز در این سالن را محاسبه کنید.

با توجه به پرورش شترمرغ‌های مسن و مولد در سالن‌های نیمه‌باز روش تهويه در این سالن‌ها بستگی به نوع آب و هوای منطقه دارد. در مناطق کم باران و گرم تنها یک سایبان که دارای پرده‌های محافظ باشد کافی است. از طرف دیگر شترمرغ‌های جوان در مناطق پر باران و یا سردسیر، زمان نسبتاً زیادتری را در فضای سرپوشیده به سر می‌برند. بنابراین استفاده از روش تهويه مکانیکی در سالن پرورش ضروری است.

## تهويه در سالن پرورش بوقلمون



تهويه با استفاده از هواکشن‌های کمکی

تهويه یکی از اصلی‌ترین نیاز پرورش بوقلمون بوده و برقراری یک روش تهويه مناسب بسیار حیاتی است. به منظور افزایش رفاه و راندمان گله، کاهش بروز بیماری‌های تنفسی و حفظ روشنایی یکنواخت در سالن (بدون وجود غبار تیره کننده) باید تهويه‌ای مناسب را در سالن مهیا کرد. طراحی و نصب هواکشن‌ها در سالن باید به طور اصولی و علمی انجام گیرد. تهويه مورد نیاز برای بوقلمون‌های تجاری،  $7/5$  مترمکعب در ساعت به ازای هر کیلوگرم وزن زنده می‌باشد. کاهش این میزان تهويه باعث انشاستگی گازهای متابولیسمی نظیر آمونیاک و دی‌اکسیدکربن و همچنین افزایش گرد و غبار در سالن می‌شود که نهایتاً با ایجاد بیماری‌های تنفسی، چشمی، پوستی و کاهش نوردهی مناسب، سبب کاهش راندمان گله و افزایش تلفات می‌گردد.

در مقابل، تهويه بیش از حد نیز باعث بروز کوران در سالن پرورش می‌شود. استفاده صحیح از هواکشن‌های تایم‌دار در سالن‌های بسته، به منظور تحت کنترل قرار دادن رفتار پرنده‌ها و دریافت اطلاعات محیطی در سطح آنها به کار می‌رود.

هنگام ورود به سالن پرورش می‌توان وضعیت تهويه را به خوبی تشخیص داد، زیرا وجود هرگونه بوی نامناسب دلیل عدم و یا نقص تهويه است. تهويه نامناسب از طرفی سبب کاهش رطوبت می‌شود، وجود رطوبت در داخل سالن نیز یکی از نشانه‌های تهويه نامناسب است. در سالن نگهداری جوجه‌ها اگر خشکی هوا بیش از حد لازم باشد رشد پرها کم شده و وضعیت پرها نامناسب می‌شود.

## امور فنی پرورش ماکیان

میزان هوای مورد نیاز در ساعت برای یک سالن پرورش بوقلمون گوشتی به ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه با متوسط وزن پایانی ۱۲ کیلوگرم چقدر می‌باشد؟

پرسش



## تهویه در سالن‌های پرورش کبک و بلدرچین

انواع روش‌های تهویه سالن‌های مرغداری را در پرورش کبک و بلدرچین نیز می‌توان استفاده کرد. اما در صورت پرورش گروههای سنی مختلف این پرنده‌گان در سالن باید به نیاز تهویه‌ای متناسب هر گروه توجه کرد. به عنوان مثال جوجه‌های با سن کمتر از یک هفته نسبت به جوجه‌های آماده کشتار، نیاز تهویه‌ای بسیار متفاوتی دارند و از طرفی در صورت وجود ارتباط محیطی بین بخش‌های مختلف پرورش، علاوه بر انتقال آلودگی سبب اختلالات دمایی نیز می‌شود.



## تنظیم هوای داخل سالن پرورش ماکیان مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

فعالیت  
کارگاهی



۱- لباس کار ۲- دستکش ۳- چکمه ۴- ماسک ۵- دماسنجه ۶- رطوبت‌سنج ۷- هواکش ۸- تایмер هواکش

مراحل انجام کار:

۱- لباس کار بپوشید.

۲- در هنگام ورود به سالن وضعیت رفتاری پرنده‌گان را بررسی کنید.

۳- ورودی‌های هوای هوا و هواکش‌ها را با توجه به حداقل نیاز تهویه‌ای ماکیان تنظیم کنید.

۴- ورودی هوای را طوری تنظیم کنید که هوای سرد هنگام ورود، با هوای گرم سالن مخلوط شده سپس به سمت سر پرنده حرکت کند.

۵- اگر بستر مرطوب شده و یا میزان آمونیاک هوای سالن افزایش یافته، حداقل میزان تهویه سالن را افزایش دهید.

۶- اگر دمای سالن بیش از حد است، کنترل کننده دما را بررسی کنید.

۷- در پایان موارد لازم را به هنرآموز خود گزارش دهید.

### آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	بررسی دستورالعمل‌های مربوط به شرایط محیطی	اینترنت، کتب پرورش ماکیان	شاپیتگی کامل	تطابق شرایط محیطی تعیین شده با دستورالعمل	۳
			شاپیته نیازمند آموزش	تطابق نسبی شرایط محیطی تعیین شده با دستورالعمل	۲
				عدم تطابق شرایط محیطی تعیین شده با دستورالعمل	۱

### آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
۱	تنظیم دستگاه‌های کنترل شرایط محیطی	هیتر، دستگاه‌های خنک‌کننده، مه‌پاش، هواکش، دیمیر، سالن پرورش، لوکس‌سنچ	شاپیتگی کامل	پراکندگی یکنواخت جوجه‌ها در سالن	۳
			شاپیته نیازمند آموزش	پراکندگی نسبتاً یکنواخت جوجه‌ها در سالن	۲
				پراکندگی غیریکنواخت جوجه‌ها در سالن	۱

### کنترل شرایط محیطی سالن‌های پرورش ماکیان

با توجه به تأثیر تهویه، دما، رطوبت و روشنایی بر سلامت و عملکرد ماکیان، همیشه در طول دوره پرورش باید موردتوجه قرار گیرند. تأمین و کنترل این عوامل بهصورت دستی و خودکار امکان‌پذیر است، بهطوری که در روش دستی به تجهیزاتی چون ترموموستات، دماسنچ، رطوبت‌سنچ، تایمیر، دیمیر، لوكس‌سنچ و مانند آن نیاز است. در حالی که در روش خودکار با استفاده از حسگرها و کنترل‌کننده‌های هوشمند تنظیم تهویه، دما، رطوبت و روشنایی با توجه به نیاز پرنده و بر اساس سن، وزن، نوع ماکیان مطابق با دستورالعمل پرورش صورت می‌گیرد. بنابراین مقدار هوای ورودی و خروجی توسط هواده‌ها و هواکش‌ها، دما، رطوبت، مدت و شدت نور در این روش به طور خودکار قابل تنظیم و کنترل است.


## امور فنی پرورش ماکیان



گردش هوا در داخل سالن پرورش



ورود هوا از طریق پنجره‌های خودکار (اینلت)



حسگرهای کنترل کننده شرایط محیطی

سعی کنید تهویه سالن پرورش ماکیان را مطابق دستورالعمل پرورش انجام دهید.

اخلاق حرفه‌ای





### بررسی حسگرهای کنترل کننده شرایط محیطی

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

۱- لباس کار -۲- دستکش -۳- چکمه -۴- ماسک -۵- دماسنجد

۶- رطوبت سنج -۷- حسگرها -۸- تایمر -۹- سالن پرورش

۱۰- لوکس سنج

مراحل انجام کار:

۱- لباس کار بپوشید.

۲- وارد سالن پرورش شوید.

۳- کنترل کننده دما شامل حسگر و ترموستات را با استفاده از

دماسنجد بررسی کنید.

۴- کنترل کننده رطوبت و حسگر مربوط به آن را با استفاده از رطوبت سنج بازبینی کنید.

۵- کنترل کننده نور شامل حسگر، تایمر و دیمیر را با استفاده از لوکس سنج بررسی کنید.

۶- در صورت وجود کنترل کننده تهویه در محل پرورش با استفاده از حسگرهای اکسیژن، گاز آمونیاک و مانند آن

بررسی کنید.

۷- در پایان نتایج فعالیت خود را به هنرآموز مربوطه گزارش دهید.



### آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (بازار، مواد، تجهیزات، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)
۳	بررسی حسگرهای کنترل کننده شرایط محیطی	دماسنجد، رطوبت سنج، حسگرها، ترموستات، تایمر، دیمیر، سالن پرورش، لوکس سنج	شاپیستگی کامل	حفظ شرایط محیطی مطلوب (دما، رطوبت نسبی، تهویه، نور)
۲	بررسی حسگرهای کنترل کننده شرایط محیطی	دماسنجد، رطوبت سنج، حسگرها، ترموستات، تایمر، دیمیر، سالن پرورش، لوکس سنج	شاپیسته نیازمند آموزش	حفظ شرایط محیطی نسبتاً مطلوب (دما، رطوبت نسبی، تهویه، نور)
۱	بررسی حسگرهای کنترل کننده شرایط محیطی	دماسنجد، رطوبت سنج، حسگرها، ترموستات، تایمر، دیمیر، سالن پرورش، لوکس سنج		ایجاد شرایط محیطی نامطلوب (دما، رطوبت نسبی، تهویه، نور)

### تهیه نمونبرگ‌های ثبت شرایط محیطی

با توجه به اهمیت کنترل شرایط محیطی در سالن پرورش مأکیان و نیز لزوم تأمین دما، رطوبت، مدت و شدت روشنایی و تهویه مطلوب طی دوره پرورش، سنجش و ثبت مداوم این متغیرهای محیطی با استفاده از دماسنجد، رطوبت سنج و لوکس‌متر و سایر حسگرها بسیار لازم و ضروری است. برای ثبت این متغیرها باید نمونبرگ‌های مناسب تهیه و اطلاعات لازم در آن ثبت شود.

## امور فنی پرورش ماکیان

نام گله مادر:		نام شرکت جوچه کشی:		تاریخ ورود جوچه:		نمونه برگ کنترل شرایط محیطی در سالن پرورش ماکیان		
نوع ماکیان:		سالن شماره:		تعداد کل جوچه:				
ملاحظات	وضعیت تهییه	شدت نور (لوکس)	رطوبت (درصد)	حداکثر دما (سانتی گراد)	حداقل دما (سانتی گراد)	ساعت ثبت	سن پرنده (روز)	تاریخ

### ثبت اطلاعات در نمونه برگ

فعالیت  
کارگاهی



### مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

- لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی (دستکش، ماسک)
- نمونه برگ‌های کنترل شرایط محیطی
- لوازم تحریر
- ساعت (دماسنجد) ۵ لوكس متر (۷ رطوبت‌سنجد)

### مراحل انجام کار:

- لباس کار بپوشند.
- میزان دما، رطوبت، تهییه، روشنایی سالن پرورش را بررسی و ثبت کنید.
- در صورت نامناسب بودن هر کدام از موارد فوق، آن را تنظیم کنید.
- با توجه به نوع و سن پرنده شرایط محیطی سالن پرورش ماکیان تنظیم کنید.

### آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نمره
		نمونه برگ‌های مربوط به ثبت اطلاعات حسگرهای دماسنجد، رطوبت سنج، حسگرهای ترموموستات، تایмер، دیمیر، سالن پرورش، لوكس سنج	شایستگی کامل	ثبت روزانه شرایط محیطی (دما، رطوبت نسبی و ...)	۳
	مستندسازی	نمونه برگ‌های مربوط به ثبت اطلاعات حسگرهای دماسنجد، رطوبت سنج، حسگرهای ترموموستات، تایmer، دیمیر، سالن پرورش، لوكس سنج	شایسته نیازمند آموزش	ثبت نامنظم شرایط محیطی (دما، رطوبت نسبی و ...)	۲
۴				عدم ثبت روزانه شرایط محیطی (دما، رطوبت نسبی و ...)	۱

## ارزشیابی شایستگی تأمین و کنترل شرایط محیطی سالن پرورش ماکیان

شرح کار:

- ۱- بررسی دستورالعمل‌های مربوط به کنترل شرایط محیطی
- ۲- تنظیم و کنترل دقیق وسایل گرمایشی، سرمایشی و هواکش‌ها و روشنایی
- ۳- بررسی کنترل‌کننده‌ها
- ۴- ثبت اطلاعات

استاندارد عملکرد:

کنترل دقیق شرایط محیطی به صورت روزانه

شاخص‌ها:

- ۱- تنظیم دقیق دما، رطوبت نسبی، تهویه و برنامه نوری
- ۲- کار با دستگاه‌های کنترل‌کننده شرایط محیطی
- ۳- درستی عملکرد دستگاه‌های کنترل‌کننده شرایط محیطی
- ۴- کامل بودن نمونه‌برگ‌های مربوط

شرایط انجام کار:

سالن پرورش ماکیان، هواکش، لامپ، دیمیر، رطوبت‌سنج، دستگاه گرمایشی، رطوبت‌ساز

ابزار و تجهیزات:

وسایل گرمایشی، سرمایشی، دما‌سنج، رطوبت‌سنج، تایмер، نمونه‌برگ‌های مربوط به ثبت شرایط محیطی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	درباره و بررسی دستورالعمل‌های مربوط به شرایط محیطی	۱	
۲	تنظیم دستگاه‌های کنترل شرایط محیطی	۲	
۳	بررسی حسگرهای کنترل شرایط محیطی	۲	
۴	مستندسازی	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:		
۲	استفاده از لباس‌کار، ماسک، دستکش، عینک، اهمیت دادن به ابزار و وسایل کار، نگهداری فناوری‌های به کار گرفته شده، به کارگیری فناوری‌های مناسب، استفاده از تجهیزات کم‌صرف، استفاده از روش‌های کاهش بو، استفاده از استاندارد سوختی جهت کاهش آلودگی هوا، امانت داری، حفظ تجهیزات سالن و محل پرورش ماکیان.	۲	
*	میانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.