



پودمان ۱

شاپیستگی‌های پایه

اتحادها

$$(x+y)^r = x^r + rx y + y^r$$

$$(x-y)^r = x^r - rx y + y^r$$

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$(x+y)^r = x^r + rx^r y + rx y^r + y^r$$


$$(x-y)^r = x^r - rx^r y + rx y^r - y^r$$

$$x^r - y^r = (x-y)(x^{r-1} + xy + y^{r-1})$$


$$x^r - y^r = (x-y)(x^{r-1} + xy + y^{r-1})$$

$$x^r + y^r = (x+y)(x^{r-1} - xy + y^{r-1})$$



مجموعه ها




A \cap B دو مجموعه



A \subseteq B، B $\not\subseteq$ A
زیر مجموعه






تفاضل دو مجموعه






اجتماع دو مجموعه

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعه	نمایش روی محور	نمایش بازه
$\{x \in \mathbb{R} a \leq x \leq b\}$		$[a, b]$
$\{x \in \mathbb{R} a < x \leq b\}$		$(a, b]$
$\{x \in \mathbb{R} a \leq x < b\}$		$[a, b)$
$\{x \in \mathbb{R} a < x < b\}$		(a, b)
$\{x \in \mathbb{R} a < x\}$		$(a, +\infty)$
$\{x \in \mathbb{R} x \leq b\}$		$(-\infty, b]$

	<p>مربع</p> <p>L طول ضلع e قطر A مساحت</p>	$A = L^2$ $e = \sqrt{2} \cdot L$
	<p>لوزی</p> <p>b ارتفاع L طول ضلع A مساحت</p>	$A = L \cdot b$
	<p>مستطيل</p> <p>e قطر b عرض L طول A مساحت</p>	$e = \sqrt{L^2 + b^2}$ $A = L \cdot b$
	<p>متوازي الاضلاع</p> <p>L طول b عرض A مساحت</p>	$A = L \cdot b$
	<p>ذوزنقه</p> <p>A مساحت L₁ طول قاعدة بزرگ L₂ طول قاعدة كچك L_m طول متواسط b عرض</p>	$L_m = \frac{L_1 + L_2}{2}$ $A = l_m \cdot b$ $A = \frac{L_1 + L_2}{2} \cdot b$
	<p>مثلث</p> <p>A مساحت L طول قاعدة b ارتفاع</p>	$A = \frac{L \cdot b}{2}$
	<p>حلقه دائري</p> <p>A مساحت D قطر خارجي d قطر داخلي d_m قطر متواسط b عرض</p>	$d_m = \frac{D + d}{2}$ $A = \pi \cdot d_m \cdot b$ $A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$
	<p>بيضي</p> <p>A مساحت D قطر بزرگ d قطر كچك U محيط</p>	$U = \frac{\pi}{4} \cdot (D + d)$ $A = \frac{\pi \cdot D \cdot d}{4}$

	مكعب A_o مساحت L طول ضلع V حجم	$A_o = 6L^2$ $V = L^3$
	مكعب مستطيل b عرض h ارتفاع A_o مساحت L طول قاعده V حجم	$V = L.b.h$ $A_o = 2(L.b + L.h + b.h)$
	اسطوانه A_m مساحت جانبی h ارتفاع V حجم A_o مساحت	$A_u = \pi.d.h$ $V = \frac{\pi.d^2}{4}.h$ $A_s = \pi.d.h + 2 \frac{\pi.d^2}{4}$
	هرم منتظم h ارتفاع h_s ارتفاع وجه b عرض قاعده L_1 طول يال L طول قاعده V حجم	$V = \frac{L.b.h}{3}$ $L_1 = \sqrt{h_s^2 + \frac{b^2}{4}}$ $h_s = \sqrt{h^2 + \frac{l^2}{4}}$
	مخروط V حجم d قطر h ارتفاع h_s طول يال A_M مساحت جانبی	$h_s = \sqrt{\frac{d^2}{4} + h^2}$ $A_M = \frac{\pi.d.h_s}{2}$ $V = \frac{\pi.d^2}{4}.h$
	كرة A_o مساحت V حجم d قطر كرة	$A_s = \pi.d^2$ $V = \frac{\pi.d^3}{6}$

نسبت و تنااسب

۱ در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی‌اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:

$$c=kd \quad a=kd \quad \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k$$

۲ اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار $k=a \times b$ ثابت است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

$$a=\frac{k}{d} \quad c=\frac{k}{d} \quad k=a \times b=c \times d$$

۳ خواص عملیات

در عبارت‌های زیر، فرض بر آن است که مخرج‌ها مخالف صفر هستند.

$\frac{a}{b}=\frac{ca}{cb} \quad (c \neq 0)$	$c \times \frac{a}{b}=\frac{ca}{b}$	$\frac{a}{b}=a \times \frac{1}{b}$
$\frac{a+b}{c}=\frac{a}{c}+\frac{b}{c}$		$-\frac{a}{b}=\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}$
$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}=\frac{ad}{bc}$		$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$

$$a \times d = b \times c \quad \text{معادل است با} \quad \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$$

درصد و کاربردهای آن

۱ معادله درصد: رابطه بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می‌دهد.

$$b = x \times a$$

مقدار نهایی
↓
درصد به صورت عدد
اعشاری / کسری

۲ درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

$$\frac{\text{مقدار اولیه} - \text{مقدار نهایی}}{\text{مقدار اولیه}} \times 100 = \frac{\text{میزان تفاوت در مقدار}}{\text{مقدار اولیه}} \times 100$$

را درصد تغییر آن کمیت می‌نامند.

درصد تغییر می‌تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.

معادله درجه دوم

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \left\{ \begin{array}{l} \Delta > 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\ \Delta = 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b}{2a} \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{معادله ریشه ندارد} \end{array} \right.$$

نامعادله درجه دوم

نامساوی هایی به صورت $ax^2 + bx + c \geq 0$ یا $ax^2 + bx + c \leq 0$ که در آن a, b, c اعداد داده حقیقی هستند ($a \neq 0$) را نامعادله درجه دوم می‌نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی درست تبدیل می‌کنند، جواب‌های نامعادله می‌نامند.

توان و ریشه یابی

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\sqrt[n]{a} \sqrt[m]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$


$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0)$$

مثلثات

۱ یکی از حالات تشابه دو مثلث، تساوی زاویه‌های آن دو مثلث می‌باشد.

۲ رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم‌الزاویه ABC داریم:

$$(AB)^2 = (AC)^2 + (BC)^2$$




۲ نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه تند:

در مثلث قائم‌الزاویه ABC زاویه تند α را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:

$$\tan \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبروی زاویه } \alpha}{\text{طول ضلع مجاور زاویه } \alpha} = \frac{BC}{AC}$$

$$\pi = \frac{\pi}{180} R \quad (\text{رادیان}) \quad R = \frac{L}{r}$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبروی زاویه } \alpha}{\text{وتر}} = \frac{BC}{AB}$$



$$\frac{L}{r} = \frac{\pi}{180} D \quad (\text{درجه}) \quad D = \frac{180}{\pi} R$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{طول ضلع مجاور زاویه } \alpha}{\text{وتر}} = \frac{AC}{AB}$$

$$D = \frac{180}{\pi} R$$

۳ روابط بین نسبت‌های مثلثاتی:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\text{ب})$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad (\text{الف})$$

$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$	$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$	$\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$
$\sin(-\theta) = -\sin \theta$	$\cos(-\theta) = \cos \theta$	$\tan(-\theta) = -\tan \theta$
$\sin(2\pi + \theta) = \sin \theta$	$\cos(2\pi + \theta) = \cos \theta$	$\tan(2\pi + \theta) = \tan \theta$
$\sin(2\pi - \theta) = -\sin \theta$	$\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta$	$\tan(2\pi - \theta) = -\tan \theta$

Angle A in degrees	Angle A in radians	$\sin A$	$\cos A$	$\tan A$	$\cot A$
0°	0	0	1	0	∞
15°	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{2} - \sqrt{2})$	$\frac{1}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{2})$	$2 - \sqrt{3}$	$2 + \sqrt{3}$
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	1	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$
75°	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{2})$	$\frac{1}{4}(\sqrt{2} - \sqrt{2})$	$2 + \sqrt{3}$	$2 - \sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	$\pm\infty$	0

Angle A in degrees	Angle A in radians	sin A	cos A	tan A	cot A
105°	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$-\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$-(2 + \sqrt{3})$	$-(2 - \sqrt{3})$
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	-1	-1
150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\sqrt{3}$
165°	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$-\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$-(2 - \sqrt{3})$	$-(2 + \sqrt{3})$
180°	π	0	-1	0	$\pm\infty$

لگاریتم و خواص آن:

اگر a یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی b و c به گونه‌ای باشند که: $b = a^c$ آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می‌نامند و با $\log_a b$ نشان می‌دهند. به عبارت دیگر داریم:

$$\log_a b = c$$

■ فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت $\log_a b$ فقط برای $b > 0$ تعریف می‌شود.

$$\log(bc) = \log b + \log c$$

■ برای $b, c > 0$ داریم:

$$\log(a+b) \neq \log a + \log b$$

■ در حالت کلی: برای هر $a, b > 0$ داریم:

$$\log \frac{b}{c} = \log b - \log c$$

■ برای $b, c > 0$ داریم:

$$\log(a-b) \neq \log a - \log b$$

■ در حالت کلی: برای هر $a, b > 0$ داریم:

$$\log b^x = x \log b$$

■ برای $b > 0$ و هر عدد حقیقی x داریم:


$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$

■ برای $a \neq 1$ و $a, b > 0$ داریم:


آمار توصیفی: ✓

- نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه‌ای از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر نقطه، داده‌های مربوط به اندازه‌گیری‌های متناظر دو کمیت است.
- x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت برای بخشی از x ها در یک بازه، مشخص باشد، پیش‌بینی مقادیر y به ازای x ‌های مشخص در این بازه به کمک خط پرازش را برونوی می‌نماید.
- پس از مرتب کردن مقادیر داده‌ها، عددی را که تعداد داده‌های قبل از آن با تعداد داده‌های بعد از آن برابر است را میانه می‌نامند.

نمودار جعبه‌ای



ساختمان نمودارها



■ نمودارها و منحنی‌ها

■ حد تابع

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \Leftarrow \text{اگر}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} k = k \quad \lim_{x \rightarrow a} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k \cdot A$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \pm B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)] \cdot [\lim_{x \rightarrow a} g(x)] = A \cdot B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B} \quad B \neq 0$$

$$p(x) \quad \text{چند جمله‌ای باشد} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^k = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^k = A^k$$

■ پیوستگی و ناپیوستگی تابع‌ها

تابع f و یک نقطه a از دامنه آن را در نظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطه a پیوسته است، هرگاه حد f در a موجود باشد و


$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطه a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنه خود پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می‌نامند.

مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع ✓

فرض کنید تابع f در نقطه a از دامنه خود مشتقپذیر باشد. در این صورت، $(a, f(a))$ نشان‌دهنده

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطه $M = \begin{bmatrix} a \\ f(a) \end{bmatrix}$ است.



مشتق تابع

$$m_{\tan} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f(x) = k \quad f'(x) = 0.$$

$$f(x) = x^n \quad f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f(x) = k \cdot g(x) \quad f'(x) = k \cdot g'(x)$$

$$f(x) = u(x) \pm v(x) \quad f'(x) = u'(x) \pm v'(x).$$

$$f(x) = u(x) \cdot v(x) \quad f'(x) = u(x) \cdot v'(x) + v(x) \cdot u'(x).$$

$$f(x) = u(x)/v(x) \quad f'(x) = \frac{v(x) \cdot u'(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

$$y = f[g(x)] \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x).$$

اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

کمیت‌های اصلی و یکای آنها

نام یکا	نام یکا	کمیت
m	متر	طول
kg	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	زمان
K	کلوین	دما
mol	مول	مقدار ماده
A	آمپر	جريان الکتریکی
cd	کنده (شمع)	شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعی	SI	کمیت
m/s	m/s	تندی و سرعت
m/s ^r	m/s ^r	شتاب
kg.m/s ^r	(N)	نیرو
kg/ms ^r	(Pa)	فشار
kgm ^r /s ^r	(J)	انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول‌های اندازه‌گیری شده

جسم	طول	جسم	طول
فاضله منظمه شمسی تا نزدیک‌ترین کهکشان	9×10^1 فوتیال	فاضله منظمه شمسی تا نزدیک‌ترین ستاره	2×10^{21}
فاضله منظمه شمسی تا نزدیک‌ترین ستاره	5×10^{-3} طول بدن نوعی مگس	یک سال نوری	4×10^{16}
شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید	1×10^{-4} اندازه ذرات کوچک گرد و خاک	شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید	9×10^{15}
فاضله میانگین ماه از زمین	1×10^{-5} اندازه پاخته‌های بیشتر موجودات زنده	فاضله میانگین ماه از زمین	$1 / 50 \times 10^{11}$
فاضله میانگین ماه از زمین	$0 / 2 - 2 \times 10^{-6}$ اندازه بیشتر میکروب‌ها	فاضله میانگین زمین	$3 / 84 \times 10^8$
فاضله میانگین زمین	$1 / 56 \times 10^{-10}$ قطر اتم هیدروژن	فاضله میانگین زمین	$6 / 40 \times 10^6$
فاضله ماهواره‌های مخابراتی از زمین	$1 / 75 \times 10^{-15}$ قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)	فاضله ماهواره‌های مخابراتی از زمین	$3 / 6 \times 10^7$

مقادیر تقریبی برخی جرم‌های اندازه‌گیری شده

جسم	جرم (kg)	جسم	جرم (kg)
عالم قابل مشاهده	1×10^{52}	انسان	1×10^{52}
کهکشان راه شیری	7×10^{41}	قورباغه	1×10^{-1}
خورشید	2×10^{30}	پشه	1×10^{-5}
زمین	6×10^{24}	باکتری	1×10^{-15}
ماه	$7/34 \times 10^{22}$	آتم هیدروژن	$1/6 \times 10^{-72}$
کوسه	1×10^3	الکترون	$9/1 \times 10^{-31}$

مقادیر تقریبی برخی از بازه‌های اندازه‌گیری شده

بازه زمانی	ثانیه
سن عالم	5×10^{17}
سن زمین	$1/43 \times 10^{17}$
میانگین عمر یک انسان	2×10^9
یک سال	$3/15 \times 10^7$
یک روز	$8/6 \times 10^4$
زمان بین دو ضربان عادی قلب	8×10^{-1}

واحدهای اندازه‌گیری انگلیسی

۱ واحدهای اندازه‌گیری طول

۱ میلی‌متر (mm) = $25/4$ سانتی‌متر (cm) = $25/54$ اینچ (in)

۱ فوت (ft) = 12 اینچ (in)

۱ فوت (ft) = 36 اینچ (in) ≈ 90 سانتی‌متر (cm)

۱ متر (m) = 5280 فوت (ft) = 6336 میل (mil) = $1609/344$ اینچ (in)

۱ متر (m) ≈ 1853 فوت (ft) ≈ 6080 مایل دریایی (nautical mile)

۱ مایل خشکی (dry mile) ≈ $1/15$ مایل دریایی (nautical mile)

ضریب تبدیل (با تقریب کمتر از ۰/۰۱)	به	برای تبدیل از
۱/۶۱	کیلومتر	مایل
۲/۵۴	سانتی‌متر	اینچ
۰/۳۱	متر	فوت
۰/۹۱	متر	یارد
۰/۶۲	مایل	کیلومتر
۰/۳۹	اینچ	سانتی‌متر
۳/۲۸	فوت	متر
۱/۰۹	یارد	متر

۲ واحدهای اندازه‌گیری جرم

$$1 \text{ اونس (oz)} = 0/035 \text{ گرم (g)} \quad 1 \text{ گرم (g)} = 28 \text{ اونس (oz)}$$

$$1 \text{ کیلوگرم (kg)} = 35/27 \text{ اونس (oz)} \quad 1 \text{ اونس (oz)} = 16 \text{ پوند (lb)}$$

$$1 \text{ کیلوگرم (kg)} = 0/45 \text{ پوند (lb)} \quad 1 \text{ پوند (lb)} = 220 \text{ تن (T)}$$

۳ واحدهای اندازه‌گیری حجم

$$1 \text{ میلی‌لیتر (ml)} = 5 \text{ قاشق چایخوری (tsp)}$$

$$1 \text{ میلی‌لیتر (ml)} = 15 \text{ قاشق سوپ‌خوری (tbsp)}$$

$$1 \text{ میلی‌لیتر (ml)} = 240 \text{ فنجان (C)}$$


پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه SI

نماد	پیشوند	ضریب	نماد	پیشوند	ضریب
y	یوکتو	10^{-24}	Y	یوتا	10^{24}
z	زیتو	10^{-21}	Z	زتا	10^{21}
a	آتو	10^{-18}	E	اگزا	10^{18}
f	فِمتو	10^{-15}	P	پِتا	10^{15}
p	پیکو	10^{-12}	T	تِرا	10^{12}
n	نانو	10^{-9}	G	گیگا (جیگا)	10^9
μ	میکرو	10^{-6}	M	مِگا	10^6
m	میلی	10^{-3}	k	کیلو	10^3
c	سانتی	10^{-2}	h	هِکتو	10^2
d	دِسی	10^{-1}	da	دِکا	10^1




پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

اهرم‌ها



گشتاور نیروی ساعتگرد = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 $d_r \times f_r = d_l \times f_l$




مزیت مکانیکی

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{\text{بازوی محرك}}{\text{بازوی مقاوم}} = \frac{\text{اندازه نیروی مقاوم}}{\text{اندازه نیروی محرك}}$$

کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
جریان مقاومت‌های موازی	$I_1 + I_2 + I_3 = I_{eq}$
ولتاژ مقاومت‌های موازی	$V_1 = V_2 = V_3 = V_{eq}$
مقاومت معادل مقاومت‌های موازی	$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{eq}}$
فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس	$P = \frac{F}{A}$
اختلاف فشار دو نقطه شاره ساکن	$P_3 - P_1 = +\rho g \Delta h$
فشار یک نقطه شاره ساکن	$p = \rho g \Delta h + p_{atm}$
اصل پاسکال	$P_3 = P_1 \Rightarrow \frac{F_3}{A_3} = \frac{F_1}{A_1}$
چگالی	$\rho = \frac{m}{v}$
چگالی نسبی	$d = \frac{\rho_3}{\rho_1}$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت	$F = \frac{9}{5}\theta + 32$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین	$T = \theta + 273$
رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین	$T = (F + 459) \div 1.8$
مقدار گرمایی داده شده به یک جسم	$Q = mC(\theta_3 - \theta_1) = mC\Delta\theta$
تعادل گرمایی	$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0$
گرمای منتقل شده از طریق رسانش	$Q = \frac{KAt(T_3 - T_1)}{L} = \frac{KAt\Delta T}{L}$
انبساط خطی	$L_3 - L_1 = \alpha L_1 \Delta \theta$ $L_3 = L_1 (1 + \alpha \Delta \theta)$
انبساط سطحی	$A_3 - A_1 = 2\alpha A_1 \Delta \theta$ $A_3 = A_1 (1 + 2\alpha \Delta \theta)$
انبساط حجمی	$V_3 - V_1 = 3\alpha V_1 \Delta \theta$ $V_3 = V_1 (1 + 3\alpha \Delta \theta)$

کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)	کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
نیروی وزن	$g = \frac{W}{m} \rightarrow W = mg$	بازه زمانی	$\Delta t = t_f - t_i$
بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی	$f_{s(max)} = \mu_s N$	جابجایی	$\Delta x = x_f - x_i$
نیروی اصطکاک جنبشی	$f_k = \mu_k N$	سرعت متوسط	$\bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
شدت جریان الکتریکی متوسط	$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	رابطه مکان زمان حرکت یکنواخت	$x = vt + x_0$
قانون اهم	$R = \frac{V}{I}$	شتاب متوسط	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت	$R = \frac{\rho L}{A}$	شتاب لحظه‌ای حرکت با شتاب ثابت	$a = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
انرژی الکتریکی مصرفی	$U = I^2 R t$	رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت	$v = v_0 + at$
توان مصرفی	$P = I^2 R \quad P = \frac{U}{t}$ $P = VI \quad P = \frac{V^2}{R}$	سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت	$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$
جریان مقاومت‌های متواالی (سری)	$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_{eq}$	رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت	$v_f^2 - v_i^2 = 2a(x - x_0)$
ولتاژ مقاومت‌های متواالی (سری)	$V_1 + V_2 + V_3 = V_{eq}$	رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت	$\Delta x = x_f - x_i = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t$
مقاومت معادل مقاومت‌های متواالی (سری)	$R_1 + R_2 + R_3 = R_{eq}$	قانون دوم نیوتون	$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$




کدهای رنگی مقاومت



انواع مقاومت ثابت



مقدار خطأ



نحوه خواندن مقاومت رنگی

رنگ	کد رنگ	درصد خطأ
سیاه	۰	-
قهوه‌ای	۱	۱ درصد
قرمز	۲	۲ درصد
نارنجی	۳	۳ درصد
زرد	۴	۴ درصد
سبز	۵	-
آبی	۶	-
بنفش	۷	-
خاکستری	۸	-
سفید	۹	-
طلایی	-	۵ درصد
نقره‌ای	-	۱۰ درصد

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ضریب انبساط طولی $\frac{1}{k}$	ماده	ضریب انبساط طولی $\frac{1}{k}$	ماده
17×10^{-6}	مس	$1/2 \times 10^{-6}$	الماس
19×10^{-6}	برنج	$3/2 \times 10^{-6}$	شیشه پیرکس
23×10^{-6}	آلومینیوم	$9-12 \times 10^{-6}$	شیشه معمولی
29×10^{-6}	سرپ	$11-13 \times 10^{-6}$	فولاد
51×10^{-6}	پخت (در ${}^{\circ}\text{C}$)	$10-14 \times 10^{-6}$	بتون

ضریب انبساط حجمی چند مایع در
دهمای حدود 20°C

* گرمای ویژه برخی از مواد

جرمای ویژه J/kg K	ماده	جهد نهضتی kg/m^2
۱۲۸	سرب	
۱۳۴	تنگستن	
۲۳۶	نقره	
۳۸۶	مس	
۹۰۰	آلومینیوم	
۳۸۰	برنج	
۴۵۰	نوعی فولاد (آلیاژ آهن با ۲٪ کربن)	
۴۹۰	فولاد زنگنزن	
۷۹۰	گرانیت	
۸۰۰	پتون	
۸۴۰	شیشه	
۲۲۲۰	یخ	
۱۴۰	جیوه	
۲۴۳۰	اتانول	
۳۹۰۰	آب دریا	
۴۱۸۷	آب	

* تمام نقاط غیر از یخ در دمای 20°C

چگالی برخی مواد متداول

ماده	ضریب انبساط طولی $\frac{1}{\text{K}}$
جیوه	$0/18 \times 10^{-3}$
آب	$0/27 \times 10^{-3}$
آلیسیرین	$0/49 \times 10^{-3}$
روغن زیتون	$0/70 \times 10^{-3}$
پارافین	$0/76 \times 10^{-3}$
بنزین	$1/00 \times 10^{-3}$
اتانول	$1/09 \times 10^{-3}$
استیک اسید	$11/0 \times 10^{-3}$
بنزن	$12/5 \times 10^{-3}$
کلروفرم	$12/7 \times 10^{-3}$
استون	$14/3 \times 10^{-3}$
اتر	$16/0 \times 10^{-3}$
آمونیاک	$24/5 \times 10^{-3}$

ماده	$\rho(\text{kg/m}^3)$	ماده	$\rho(\text{kg/m}^3)$
آب	$1/00 \times 10^3$	یخ	$0/917 \times 10^3$
آلیسیرین	$1/26 \times 10^3$	آلومینیوم	$2/70 \times 10^3$
آهن	$0/80 \times 10^3$	اتیل الکل	$7/86 \times 10^3$
مس	$0/879 \times 10^3$	بنزن	$8/92 \times 10^3$
نقره	$13/6 \times 10^3$	جیوه	$10/5 \times 10^3$
سرب	$1/29$	هوای	$11/3 \times 10^3$
اورانیوم	$1/79 \times 10^{-1}$	هلهیم	$19/1 \times 10^3$
طلای	$1/43$	اکسیژن	$19/3 \times 10^3$
پلاتین	$8/99 \times 10^{-2}$	هیدروژن	$21/4 \times 10^3$

داده‌های این جدول در دمای صفر درجه (0°C) سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه‌گیری و گزارش شده‌اند.

جدول تناوبی عنصرها

۱	H هیدروژن ۱.۱۰۰۰	۲	Li لیتیم ۷.۳۸۵	۳	B بئریم ۹.۰۱۲	۴	C کربن ۱۲.۰۱۱	۵	N نیتروژن ۱۴.۰۱۲	۶	O اکسیژن ۱۶.۰۰۰	۷	F فلوئور ۱۹.۰۰۰	۸	Ne نیون ۲۰.۱۷۴
۹	Mg مگنیزیم ۱۲.۰۱۱	۱۰	Na ناتریم ۲۲.۰۱۸	۱۱	Al آلومینیم ۲۶.۹۸۱	۱۲	Si سیلیسیم ۲۸.۰۸۵	۱۳	Cl کلرین ۳۵.۴۵۳	۱۴	Ar آرگون ۳۶.۱۷۱	۱۵	W وولفراوم ۹۱.۹۷۵	۱۶	W وولفراوم ۹۱.۹۷۵
۱۷	K کالیمیم ۳۹.۱۰۲	۱۸	Ca کلسیم ۴۰.۱۱۵	۱۹	Sc سکلیپسیم ۴۵.۰۱۰	۲۰	Ti تیتانیم ۴۷.۸۶۷	۲۱	V وینیم ۵۰.۹۰۶	۲۲	Cr کروم ۵۲.۹۳۷	۲۳	Mn منگنز ۵۴.۹۳۷	۲۴	Ni نیکل ۵۸.۶۹۵
۲۵	Rb ریبیوم ۷۲.۶۷۰	۲۶	Y یوتیزیم ۷۸.۹۰۰	۲۷	Ta تاکنیم ۹۰.۹۰۰	۲۸	Tc تکنیک ۹۱.۹۰۰	۲۹	Ru رولمیم ۹۸.۹۰۰	۳۰	Pd پدیم ۱۰۶.۹۰۰	۳۱	Ag آگریم ۱۰۷.۹۰۰	۳۲	Zn زنکنیم ۱۱۳.۹۰۰
۳۳	Cs کسیم ۱۳۶.۹۰۰	۳۴	Ba باریم ۱۳۷.۹۰۰	۳۵	La لاریم ۱۴۰.۹۰۰	۳۶	Pr پریم ۱۴۱.۹۰۰	۳۷	Ce سیم ۱۴۴.۹۰۰	۳۸	Gd گدیم ۱۴۷.۹۰۰	۳۹	Eu ایوین ۱۵۱.۹۰۰	۴۰	Tb تبیم ۱۵۷.۹۰۰
۴۱	Fr فریم ۱۷۷.۹۰۰	۴۲	Ra ریوم ۱۸۶.۹۰۰	۴۳	Rf رفیم ۱۹۰.۹۰۰	۴۴	Db دبلیوم ۱۹۱.۹۰۰	۴۵	Sg سیگم ۱۹۶.۹۰۰	۴۶	Ds دبلیوسیم ۱۹۸.۹۰۰	۴۷	Ro رولوم ۲۰۰.۹۰۰	۴۸	Cn کنیم ۲۰۱.۹۰۰
۴۹	Ac اکتیوم ۲۲۷.۹۰۰	۵۰	Fr فریم ۲۲۷.۹۰۰	۵۱	La لاریم ۲۲۷.۹۰۰	۵۲	Pa پاکیم ۲۳۱.۹۰۰	۵۳	Ce سیم ۲۳۱.۹۰۰	۵۴	Pr پریم ۲۳۱.۹۰۰	۵۵	Nd نیدیم ۲۳۴.۹۰۰	۵۶	Pm پرمیم ۲۳۵.۹۰۰
۵۷	Ac اکتیوم ۲۴۷.۹۰۰	۵۸	Fr فریم ۲۴۷.۹۰۰	۵۹	La لاریم ۲۴۷.۹۰۰	۶۰	Ce سیم ۲۴۷.۹۰۰	۶۱	Pr پریم ۲۴۷.۹۰۰	۶۲	Nd نیدیم ۲۴۷.۹۰۰	۶۳	Pm پرمیم ۲۴۷.۹۰۰	۶۴	Gd گدیم ۲۴۷.۹۰۰
۶۵	Ac اکتیوم ۲۵۷.۹۰۰	۶۶	Fr فریم ۲۵۷.۹۰۰	۶۷	La لاریم ۲۵۷.۹۰۰	۶۸	Ce سیم ۲۵۷.۹۰۰	۶۹	Pr پریم ۲۵۷.۹۰۰	۷۰	Nd نیدیم ۲۵۷.۹۰۰	۷۱	Pm پرمیم ۲۵۷.۹۰۰	۷۲	Dy دیمیم ۲۵۷.۹۰۰
۷۳	Ac اکتیوم ۲۶۷.۹۰۰	۷۴	Fr فریم ۲۶۷.۹۰۰	۷۵	La لاریم ۲۶۷.۹۰۰	۷۶	Ce سیم ۲۶۷.۹۰۰	۷۷	Pr پریم ۲۶۷.۹۰۰	۷۸	Nd نیدیم ۲۶۷.۹۰۰	۷۹	Pm پرمیم ۲۶۷.۹۰۰	۸۰	Tb تبیم ۲۶۷.۹۰۰
۸۱	Ac اکتیوم ۲۷۷.۹۰۰	۸۲	Fr فریم ۲۷۷.۹۰۰	۸۳	La لاریم ۲۷۷.۹۰۰	۸۴	Ce سیم ۲۷۷.۹۰۰	۸۵	Pr پریم ۲۷۷.۹۰۰	۸۶	Nd نیدیم ۲۷۷.۹۰۰	۸۷	Pm پرمیم ۲۷۷.۹۰۰	۸۸	Dy دیمیم ۲۷۷.۹۰۰
۸۹	Ac اکتیوم ۲۸۷.۹۰۰	۹۰	Fr فریم ۲۸۷.۹۰۰	۹۱	La لاریم ۲۸۷.۹۰۰	۹۲	Ce سیم ۲۸۷.۹۰۰	۹۳	Pr پریم ۲۸۷.۹۰۰	۹۴	Nd نیدیم ۲۸۷.۹۰۰	۹۵	Pm پرمیم ۲۸۷.۹۰۰	۹۶	Tb تبیم ۲۸۷.۹۰۰
۹۷	Ac اکتیوم ۲۹۷.۹۰۰	۹۸	Fr فریم ۲۹۷.۹۰۰	۹۹	La لاریم ۲۹۷.۹۰۰	۱۰۰	Ce سیم ۲۹۷.۹۰۰	۱۰۱	Pr پریم ۲۹۷.۹۰۰	۱۰۲	Nd نیدیم ۲۹۷.۹۰۰	۱۰۳	Pm پرمیم ۲۹۷.۹۰۰	۱۰۴	Dy دیمیم ۲۹۷.۹۰۰

عند این
عنصر
جذب انسان می‌گیرند



حیدروژن

حامد

مالیع

گاز

شنبه فار

قمر


ناین

عند انسان می‌گیرند

ثابت تفکیک اسیدها (Ka) و بازها (Kb)

توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ‌تر باشد، آن اسید یا باز قوی‌تر است.

ثابت تفکیک (Ka)	فرمول شیمیابی	نام اسید	ثابت تفکیک (K _a)	فرمول شیمیابی	نام اسید
6.9×10^{-3}	H ₃ PO ₄	فسفریک اسید	اسید قوی	HClO ₄	پر کلریک اسید
1.3×10^{-3}	CH ₃ ClCO ₂ H	کلرو استیک اسید	اسید قوی	H ₂ SO ₄	سولفوریک اسید
7.4×10^{-4}	C ₆ H ₅ O ₇	سیتریک اسید	اسید قوی	HI	هیدروکلریک اسید
6.3×10^{-4}	HF	هیدروفلوئوریک اسید	اسید قوی	HCl	هیدروکلریک اسید
5.6×10^{-4}	HNO ₂	نیترو اسید	اسید قوی	HNO ₃	نیتریک اسید
6.2×10^{-5}	C ₆ H ₅ CO ₂ H	بنزوئیک اسید	2.2×10^{-1}	CCl ₃ CO ₂ H	تری کلرو استیک اسید
1.7×10^{-5}	CH ₃ CO ₂ H	استیک اسید	1.8×10^{-1}	H ₂ CrO ₄	کرومیک اسید
4.5×10^{-7}	H ₂ CO ₃	کربنیک اسید	1.7×10^{-1}	HIO ₃	یدیک اسید
8.9×10^{-8}	H ₂ S	هیدرو سولفوریک اسید	5.6×10^{-1}	C ₂ H ₅ O ₄	اگرالیک اسید
4×10^{-8}	HClO	هیپوکلرو اسید	5×10^{-2}	H ₃ PO ₃	فسفو اسید
5.4×10^{-10}	H ₃ BO ₃	بوریک اسید	4.5×10^{-1}	CHCl ₃ CO ₂ H	دی کلرو استیک اسید
			1.4×10^{-2}	H ₂ SO ₃	سولفورو اسید
ثابت تفکیک (K _b)	فرمول شیمیابی	نام باز	ثابت تفکیک (K _b)	فرمول شیمیابی	نام باز
4×10^{-4}	C ₆ H ₅ NH ₂	بوتیل آمین	باز قوی	KOH	پتاسیم هیدروکسید
6.3×10^{-5}	(CH ₃) ₂ N	تری متیل آمین	باز قوی	NaOH	سدیم هیدروکسید
1.8×10^{-5}	NH ₃	آمونیاک	باز قوی	Ba(OH) ₂	باریم هیدروکسید
1.7×10^{-6}	C ₆ H ₅ N	پیریدین	باز قوی	Ca(OH) ₂	کلسیم هیدروکسید
7.4×10^{-11}	C ₆ H ₅ NH ₂	آنیلین	5.4×10^{-4}	(CH ₃) ₂ NH	دی متیل آمین
			4.5×10^{-4}	C ₆ H ₅ NH ₂	اتیل آمین



نمک طعام



آب




گوگرد




ژرمانیوم






طلاء



نمونه‌ها	نام کلروئید	حالت فیزیکی	نوع کلروئید	فاز پخش کننده	فاز پخش شونده
-	-	-	-	گاز	گاز
کفت صابون	کفت	مایع	گاز در مایع	مایع	
سنگ پا، یونالیت	کفت جامد	جامد	گاز در جامد	جامد	
مه، افسانه‌ها (اسپری‌ها)	آبروسول مایع	گاز	مایع در گاز	گاز	
شیر، کره، مایونیز	امولسیون	مایع	مایع در مایع	مایع	مایع
ژله، ژل موی سر	ژل	جامد	مایع در جامد	جامد	
دود، غبار	آبروسول جامد	گاز	جامد در گاز	گاز	
رنگ‌های روغنی، چسب مایع	سول	مایع	جامد در مایع	مایع	جامد
سرامیک، شیشه، رنگی، یاقوت، لعل، فیروزه	سول جامد	جامد	جامد در جامد	جامد	








زیست شناسی

ساختار سلولی	درشت مولکول	واحد سازنده	نام
			گلوکز
			نوکلئوتید
			آمینواسید
			اسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول‌های شرکت‌کننده در ساختار یاخته‌ها

سازمان‌بندی یاخته‌ها








تصویر گروه های اصلی جانوران


جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعات	نوع منبع
جنگل ها و مراع و کشاورزی	منابع گیاهی
حيات وحش و دامپروری	منابع جانوری
مجموعه قارچ ها و باکتری ها	منابع میکروبی
مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارش	منابع جوی
انواع آب: سفره های آب زیرزمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و آقیانوس ها	منابع آبی
انواع خاک و بستر سنگی - کوه، تپه، دره و دشت	منابع خاکی
فلزات و سنگ های قیمتی	منابع کانی
نفت، گاز و زغال سنگ	منابع فسیلی
تمام افراد جامعه	منابع انسانی





شكل بالا گردش خون را در بدن نشان می‌دهد. شماره ۳، ۲ و ۴ آغاز و پایان گردش ششی و ۱، ۵ و ۶ آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می‌دهد.



تنوع استخوان‌ها و کاربرد آنها در ورزش

