



## فصل ۳

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات

# افلاک

## رقم گندم نان مناسب کشت دا قلیم گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۸۹

مناطق مناسب کشت: شمال خوزستان، جنوب استان فارس، مناطق گرم استان های کرمان، لرستان و کرمانشاه

رقم افلاک با نام Debeira و با شجره // Nai۶۰/۳/ Cno/۲۳۸۵۴/۳/ Tit/Son۶۴/۴/LR/Son۶۴ HD۱۶۰/۵/Tob/ از بین ژرم پلاسم خزانه بین المللی مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (CIMMYT) که در سال زراعی ۱۳۷۵-۷۶ ارزیابی شده بود، گرینش و به برنامه به نژادی اقلیم گرم و خشک جنوب کشور وارد شد. این رقم در ارزیابی انجام شده در قالب مطالعه خزانه های به نژادهای فیزیولوژیک زنگ زرد در مناطقی با شدت بیماری مقاوم بوده است. کیفیت نانوایی این رقم در گروه خوب قرار دارد و درصد پروتئین آن بین ۱۱-۱۳/۲ درصد متغیر است. بررسی های تحقیقی - ترویجی در مزارع مناطق مختلف نشان دهنده سازگاری و افزایش عملکرد این رقم در مناطق گرم و خشک کشور تا حدود ۶ درصد برتری تولید در برابر رقم چمران است. پتانسیل عملکرد بالا، تحمل نسبتاً خوب به گرمای آخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت به بیماری زنگ زرد و ریزش دانه از ویژگی های بارز رقم افلاک محسوب می شود.

عملکرد	۵۹۰۰ کیلوگرم در هکتار
رکورد عملکرد ثبت شده	۸۳۸۳ کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته	۹۵ سانتی متر
وزن هزار دانه	۴۰ گرم
عادت رشدی	بهاره
واکنش به زنگ زرد	مقاوم
واکنش به زنگ قهوه ای	نیمه مقاوم
خوابیدگی بوته	مقابض
ریزش دانه	مقابض
پروتئین دانه	۱۲/۲ درصد
کیفیت نانوایی	خوب



# اروم

## رقم گندم نان مناسب کشت در مناطق سرد کشور

سال معرفی: ۱۳۸۹

مناطق مناسب کشت: مناطق سرد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد

رقم اروم با شجره Alvand//NS۷۳۲/Her رقم الوند و لاین NS۷۳۲/Her با منشأ خارجی در ارومیه حاصل شد. این رقم دارای عادت رشد بینابین است و از نظر رسیدگی، در گروه متوسط رس قرار می گیرد. در اقلیم سرد کشور با بیش از ۸۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی، عوامل محدود کننده ای چون: سرمای شدید زمستانه، سرمای دیررس اوایل بهار، بیماری زنگ زرد، وجود داشته و بنابراین با توجه به این عوامل محدود کننده و پراکنده و تنوع شرایط زراعی و حساس شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد طی سال های اخیر، شناسایی لاین ها و معروفی ارقام جدید واحد پتانسیل عملکرد بالا و پایدار و مقاوم به زنگ زرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا و برای این اقلیم رقم جدید اروم معرفی شد. متوسط عملکرد دانه این رقم در شرایط تحقیقاتی ۷۳۸۲ کیلوگرم در هکتار با رکورد ۸۳۵۸ کیلوگرم در هکتار بوده است. کیفیت نانوایی این رقم در حد خوب است.

میانگین عملکرد	۷۳۸۲ کیلوگرم در هکتار
رکورد عملکرد ثبت شده	۸۳۵۸ کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته	۸۸ سانتی متر
عادت رشدی	بینابین
واکنش به بیماری زنگ زرد	مقاوم
واکنش به بیماری زنگ سیاه	نیمه مقاوم تانیمه حساس
واکنش به بیماری زنگ قهوه ای	نیمه مقاوم تانیمه حساس
خوابیدگی بوته	مقاوم
ریزش دانه	مقاوم
میانگین وزن هزار دانه	۴۳ گرم
میانگین درصد پروتئین	۱۱٪
کیفیت نانوایی	خوب



# زارع

## رقم گندم نان برای کشت در شرایط آبی و منطقه‌ی آخوند اقیم سروکش

سال معرفی: ۱۳۸۹

مناطق مناسب کشت: مناطق سرد استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد

رقم گندم نان زارع با شجره ۱۳۰L۱,۱۱//F۳۵,۷۰/Mo۷۳/۴/Ymh/Tob//Mcd/۳/Lira  
و با منشأ خزانه بین‌المللی مشاهده‌ای گندم‌های زمستانه ویژه مناطق سرد در سال زراعی ۱۳۸۰-۸۱، به چرخه به نزادی گندم نان ایران وارد شد و سازگاری خوبی در مناطق سرد کشور در شرایط نرمال و تنفس خشکی آخر فصل نشان داد، به همین دلیل، به عنوان رقم جدید برای این اقلیم معرفی و آزادسازی شد. متوسط عملکرد دانه این رقم در شرایط آبیاری نرمال ۷۵۵۰ و در شرایط تنفس خشکی آخر فصل ۴۸۹۳ کیلوگرم در هکتار بوده است. کیفیت نانوایی آن در حد خوب و از نظر گروه رسیدن نسبتاً دیررس است.

شرایط نرمال: ۷۵۵۰ کیلوگرم در هکتار شرایط تنفس خشکی: ۴۸۹۳ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۹۸ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
شرایط نرمال: ۴۰ گرم شرایط خشکی: ۳۱ گرم	میانگین وزن هزار دانه
زمستانه	عادت رشدی
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری زنگ قهوه‌ای
نیمه حساس	واکنش به بیماری زنگ سیاه
مقاوم	واکنش به خوابیدگی بوته
۱۱/۴	میانگین درصد پروتئین
خوب	کیفیت نانوایی



# میهن

رقم گندم نان مناسب کشت در شرایط آبی و تنش بخوبی آخ ر فعل زراعی در مناطق سرد کشور

سال معرفی: ۱۳۸۹

مناطق مناسب کشت: مناطق سرد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد

رقم گندم نان میهن با عادت رشدی زمستانه و با شجره Zhong87-Zhong95 Bkt/۹۰ حاصل برنامه به نزدی ملی غلات آبی کشور برای اقلیم سرد است که تلاقي آن در سال زراعی ۱۳۷۴-۷۵ در کرج انجام شد. با توجه به عوامل محدود کننده تولید در مناطق سرد سیر از قبیل سرمای شدید زمستانه، سرمای دیررس اوایل بهار، بیماری مهم زنگ زرد، پراکندگی و تنوع شرایط زراعی و حساس شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد طی سال های اخیر، شناسایی لاین ها و معروفی ارقام جدید وارد پتانسیل عملکرد بالا و پایدار و مقاوم به زنگ زرد از اهمیت ویژه ای برای این اقلیم برخوردار است. رقم میهن نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به بیماری های زنگ سیاه و زنگ قهوه ای نیمه مقاوم است. متوسط عملکرد دانه این رقم در شرایط آبیاری نرمال ۷۷۸۰ کیلوگرم در هکتار و در شرایط تنفس قطع آبیاری پس از مرحله گله دهی ۵۹۶۰ کیلوگرم در هکتار در شرایط تحقیقاتی بوده است. کیفیت نانوایی آن در حد خوب است و از نظر رسیدگی در گروه متوضطرس قرار می گیرد.

میانگین ارتفاع بوته	۸۴ سانتی متر
میانگین وزن هزار دانه	۴۳ گرم شرایط نرمال: ۳۴ گرم شرایط تنفس خشکی:
عادت رشدی	زمستانه
واکنش به بیماری زنگ زرد	مقاوم
واکنش به بیماری زنگ قهوه ای	نیمه مقاوم
واکنش به بیماری زنگ سیاه	نیمه مقاوم تا نیمه حساس
واکنش به خوابیدگی بوته	مقاوم
میانگین پروتئین دانه	۱۱ درصد
میانگین عملکرد دانه در شرایط:	نرمال: ۷۷۸۷ کیلوگرم در هکتار تنفس: ۵۹۶۷ کیلوگرم در هکتار



# سیروان

رقم گندم نان محل به کشاورزی آخوند و مناسب کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران

سال معرفی: ۱۳۹۰

مناطق مناسب کشت: مزارع مواجه با تنش رطوبتی آخر فصل در مناطق معتدل کشور از جمله استان‌های تهران، البرز، خراسان، فارس، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، سمنان و یزد و سایر مناطق معتدل

۵۹۷۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه (شرايط تنش خشکی)
۸۸۶۸ کیلوگرم در هکتار	رکورد عملکرد (در شرایط تحقیقاتی)
زودرس	گروه رسیدگی
۹۴ سانتی متر	متوسط ارتفاع بوته
بهاره	عادت رشدی
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری زنگ سیاه (نژاد UG99)
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری زنگ قهوه‌ای
مقاوم	وضعیت خوابیدگی
نیمه مقاوم	وضعیت ریزش دانه
۴۵ گرم	وزن هزار دانه
۱۲	میانگین درصد پروتئین
خیلی خوب	کیفیت نانوایی



رقم گندم نان سیروان با شجره PRL/۲\*PASTOR بین المللی مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) گزینش و با پشت سر گذاشتن مراحل ارزیابی برای کشت در اقلیم معتدل کشور در سال ۱۳۹۰ معرفی شد. مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید گندم در اقلیم معتدل کشور که سطحی بالغ بر ۶۸۲ هزار هکتار از مجموع سطح زیر کشت گندم آبی را به خود اختصاص می‌دهد، خشکی آخر فصل و بیماری‌ها بهویژه زنگ زرد و زنگ سیاه (نژاد UG99) است که بر روی بسیاری از ارقام گندم موجود بیماری‌زاوی داردند. این رقم برای جایگزینی ارقام حساس به خشکی در مناطق معتدل و نیز برای کاهش خطر رویداد اپیدمی زنگ زرد و سیاه گندم توصیه می‌شود. ویژگی زودرسی و کیفیت نانوایی خیلی خوب این رقم به ارزش زراعی آن می‌افزاید.



# افق

## رقم ۵۳ نم آبی مناسب کشت در مناطق دارای آب یا خاک شور و بثور و اقلیم معتدل تابستانگرم

سال معرفی: ۱۳۹۱

مناطق مناسب کشت: مناطق با شوری متوسط آب و خاک و تقریباً گرم استان‌های یزد، خراسان رضوی و جنوبی، قم، کرمان، سمنان، اصفهان و البرز

شوری آب و خاک از مهم‌ترین تنش‌های غیرزنده است که سبب کاهش رشد و باروری گیاهان می‌شود و تولید محصولات کشاورزی را محدود می‌سازد. بیش از ۸۰۰ میلیون هکتار از اراضی در دنیا متأثر از شوری است. در کشور ایران، حدود ۲۴ میلیون هکتار از اراضی با درجات مختلفی تحت تأثیر شوری قرار دارد که در اقلیم‌های مختلف کشور پراکنده شده است. بنابراین، یکی از اهداف مهم اصلاح نباتات در این مناطق تهیه و معروفی ارقام پرپتانسیل و متتحمل به شوری است. رقم افق با شجرة GF-gy54/Attila علاوه بر تحمل به شوری، پتانسیل عملکرد بالا و سازگاری خوب در مناطق دارای آب یا خاک شور و لب شور، دارای مقطع دانه شیشه‌ای بوده و از شاخص سختی دانه بیشتری در مقایسه با ارقام شاهد ارگ و بم برخوردار است. این رقم در آزمایش‌های تحقیقی - ترویجی در مزارع زارعان (تحت شرایط تنش شوری) با میانگین عملکردهای ۴/۳۳۳ تن در هکتار در مقایسه با ۳/۸۰۴ تن در هکتار متوسط عملکردهای ارقام شاهد (ارگ ۳/۹۷۷ و بم ۳/۶۳۰ تن در هکتار)، به طور میانگین ۵۲۹ کیلوگرم نسبت به ارقام ارگ و بم افزایش عملکرد داشته است.



بهاره	عادت رشدی
۷۴ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
مقاآم	مقاآمت به خوابیدگی
مقاآم	مقاآمت به ریزش دانه
۳۵ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۱/۹۵	میانگین درصد پروتئین
واکنش به نزاد Ug۹۹ سیاه	نیمه مقاآم تا متوسط
متتحمل تا نیمه حساس	واکنش نسبت به زنگ زرد
نیمه حساس	واکنش به بیماری زنگ قهوه‌ای
خوب	کیفیت نانوایی

مقادیر این صفات مربوط به میانگین آزمایش‌های مقایسه عملکرد در شرایط تنش شوری می‌باشد

(۸ - ۱۲ds/m = EcWater<sup>۹</sup> - ۱۴ ds/m EcSoil)

# گنبد

رقم گنبد نان مقاوم به بیماری های قارچی و عارضه جوانه زنی قبل از برداشت

سال معرفی: ۱۳۹۲  
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و مرطوب شمال کشور

رقم گنبد با شجره ATRAK/WANG\_BAI حاصل دورگ گیری بین گندم بهاره اترک (Kauz)، رقم تجاری پا کوتاه و پر محصول مناطق گرم و گندم WANG\_SHUI\_BAI، است که برنامه تلاقی آن در سال زراعی ۱۳۷۴-۷۵ انجام شد. این رقم گنبد دارای میانگین عملکرد ۶/۴۷۰ تن در هکتار است که نسبت به گندم نان مروارید (شاهد آن) با میانگین عملکرد ۵/۱۴۳ تن در هکتار در آزمایش ها برتر بوده است. این لاین نسبت به بیماری زنگ زرد، زنگ قهقهه ای و زنگ سیاه، نیمه مقاوم و نسبت به بیماری سفیدک پودری و سپتoria با نیمه حساس است. واکنش مقاومت برای این رقم نسبت به بیماری بلاست فوزاریومی گزارش شده است. رقم جدید گنبد با داشتن رنگ دانه قرمز به عارضه جوانه زنی قبل از برداشت نیز مقاوم است. کیفیت نانوایی این لاین گزارش شده است.

میانگین عملکرد دانه	۶۴۷۰ کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی	بهاره
میانگین ارتفاع بوته	۹۰-۱۰۰ سانتی متر
واکنش به بیماری زنگ زرد	مقاوم تا نیمه مقاوم
واکنش به بیماری فوزاریوم سنبله	مقاوم
واکنش به بیماری قهقهه ای	نیمه مقاوم تا نیمه حساس
واکنش به بیماری زنگ سیاه	نیمه مقاوم تا نیمه حساس
واکنش به بیماری زنگ سیاه	نیمه مقاوم تا نیمه حساس
واکنش به بیماری سفیدک پودری	نیمه حساس
واکنش به سپتoria برجی	نیمه حساس
واکنش به جوانه زنی قبل از برداشت	مقاوم
میانگین درصد پروتئین	۱۱/۹
میانگین وزن هزار دانه	۴۱ گرم



## چمران ۲

### پ<sup>ر</sup> رُمَكْنَدْ نَانْ مَنَسِبْ كَشْتْ دَالْقَلِيمْ كَرمْ وَخَشْكَ جَنَوبْ كَثُورْ

سال معرفی: ۱۳۹۲

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور و بهویژه مناطقی که بیماری زنگ زرد در آن مناطق محدود کننده است (استان های خوزستان و ایلام، مناطق جنوبی استان فارس، مناطق گرم استان های لرستان، کرمان، کرمانشاه)

رقم چمران ۲ با شجره Attila/Bacanora ۵۰y//Attila/Bacanora ۵۰y، حاصل برنامه به نزادی ملی غلات کشور است و دورگ گیری این لاین در سال زراعی ۱۳۷۵-۷۶ بین دو والد چمران (Attila50y) و لاین Attila/Bacanora در کرج انجام شد و دورگ (F<sub>1</sub>) حاصل در سال زراعی ۱۳۷۶-۷۷، ارزیابی و گرینش شد. این دورگ در سال زراعی ۱۳۷۷-۷۸ به برنامه دو نسل در سال که بین ایستگاه های ایرانشهر و کلاردشت برقرار است، وارد شد. رقم چمران ۲ دارای پایداری عملکرد دانه در شش ایستگاه اقلیم گرم و خشک جنوب کشور بوده است. رکورد تولید رقم چمران ۲ به میزان ۸۲۳۸ کیلوگرم در هکتار در ایستگاه تحقیقاتی داراب ثبت شده است. پتانسیل عملکرد بالا، تحمل نسبتاً خوب به گرمای آخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت به بیماری زنگ زرد و قهوه ای، ریزش دانه و خوابیدگی، از ویژگی های بارز این رقم محسوب می شود.

میانگین عملکرد	۶۴۴۲ کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی	بهاره
واکنش به بیماری زنگ زرد	مقاوم
واکنش به بیماری زنگ قهوه ای	مقاوم
واکنش به خوابیدگی	مقاوم
میانگین درصد پروتئین	۱۱/۶
میانگین وزن هزار دانه	۴۱ گرم
وضعیت ریزش دانه	مقاوم
کیفیت نانوایی	خوب



# بهاران

## رقم‌گندم‌آبی مناسب کشت در مناطق معتدل موایجاً تا شرط‌طبی آخوند

سال معرفی: ۱۳۹۳

**مناطق مناسب کشت:** مناطق معتدل استان‌های فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، لرستان، تهران، یزد، کرمان و سمنان

در راستای مقابله با تأثیرات خشکسالی، لاین جدید زودرس و متحمل به کم‌آبی WS-۸۹-۷ از میان ژنتیپ‌های متعدد موجود در خزانه‌های بین‌المللی دریافت شده از مرکز تحقیقات بین‌المللی ذرت و گندم (سیمیت) انتخاب و برای نام‌گذاری و جایگزینی قسمتی از سطح زیر کشت ارقام آبی در مناطق معتدل مواجه با تنفس خشکی با نام بهاران معرفی شد. این لاین از مجموعه آزمایش‌های بهنژادی انتخاب شد که در آنها ارقام متحمل به کم‌آبی پیش‌تاز و سیروان شاهد بوده‌اند و با توجه به عملکرد خوب این ارقام، انتظار می‌رود که این رقم تیز توسعه خوبی داشته باشد. لاین مذکور نسبت به بیماری زنگ زرد در شرایط اپیدمی شدید در خزانه‌های زنگ زرد تحت آلوگی مصنوعی نیمه‌ مقاوم گزارش شد. کاشت این‌گونه ارقام زودرس و متحمل به کم‌آبی گندم در مقایسه با ارقام دیررس قدیمی می‌تواند تا میزان ۰ ۱۵۰ متر مکعب در هکتار موجب صرفه جویی در مصرف آب آبیاری شود.

۱۰۸۴۰ کیلوگرم در هکتار	پتانسیل عملکرد در آزمایش شرایط نرمال
۵۱۴۴ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد در آزمایش شرایط تنفس خشکی
۴۷۰۷ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد در آزمایش‌های تحقیقی - ترویجی (شرایط تنفس خشکی)
۸۹ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
بهاره	عادت رشدی
نیمه‌ مقاوم	واکنش نسبت به بیماری زنگ زرد
مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
۱۲/۴	میانگین درصد پروتئین
خوب	کیفیت نانوایی



# مرگان

## رقم‌گندم نان مناسب کشت دالقیم کرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۹۳

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور به‌ویژه مناطقی که زنگ‌ها به‌ویژه زنگ زرد محدود‌کننده کشت گندم است (شمال استان خوزستان، مناطق جنوبی استان فارس، مناطق گرم استان‌های لرستان، کرمان و کرمانشاه)

۵۶۹۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
بهاره	عادت رشدی
۸۹ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
۴۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ قهوه‌ای
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ سیاه نژاد Ug۹۹
مقاوم	وضعیت ریزش دانه
۱۳/۸	میانگین درصد پروتئین
بسیار خوب	کیفیت نانوایی

رقم مهرگان، ویژه اقلیم گرم جنوب با شجرة OASIS/SKAUZ//BCN/۲\*PASTOR از خزانة بین‌المللی مرکز تحقیقات بین‌المللی ذرت و گندم (CIMMYT) انتخاب و در سال زراعی ۸۷-۸۶، در کرج مورد ارزیابی مقدماتی و تکثیر بذر قرار گرفت. این رقم دارای پایداری عملکرد دانه بوده و ارزیابی آن در قالب مطالعه خزانه بیماری‌ها نشان داده است که به نژادهای فیزیولوژیک زنگ زرد در مناطق با شدت زیاد بیماری واکنش مقاومت داشته است. بررسی‌های انجام شده در کنیا نیز حاکی از مقاومت آن به بیماری زنگ سیاه نژاد Ug۹۹ است. میانگین عملکرد رقم مهرگان و رقم شاهد چمنان در ایستگاه‌های تحقیقاتی اقلیم گرم و خشک جنوب کشور به ترتیب ۵۶۹۰ و ۵۴۷۲ کیلوگرم در هکتار بوده است. این رقم تحمل نسبتاً خوبی به گرمای آخر فصل دارد و در گروه رسیدگی زودرس قرار می‌گیرد.



# شوش

## رقم گندم نان مناسب کشت در قیمت کرم و خنک جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۹۳

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور و مناطقی که زنگ‌ها به ویژه زنگ زرد محدود کننده کشت گندم است (مناطق شمالی استان خوزستان، مناطق جنوبی استان فارس، مناطق گرم استان‌های لرستان، کرمان و کرمانشاه)

۵۵۹۶ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
بهاره	عادت رشدی
۹۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
۳۷ گرم	میانگین وزن هزار دانه
مقاوم	مقاومت به خوالیدگی
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ قهوه‌ای
مقاوم	وضعیت ریزش دانه
۱۲/۴	میانگین درصد پروتئین
بسیار خوب	کیفیت نانوایی

CBRD\_۳/ شوش با شجره STORK X DICOCCOIDES حاصل بر نامه مشترک تحقیقاتی اصلاح گندم‌های بهاره ویژه مناطق با عرض جغرافیایی بایین در غرب و مرکز آسیا و شمال آفریقا (AIISWIP) است که از سال زراعی ۸۳-۸۴ بین مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مرکز تحقیقات بین‌المللی ایکاردا آغاز شد و تا سال ۱۳۸۶ ادامه داشت. پتانسیل عملکرد بالا، تحمل نسبتاً خوب آن به گرمای آخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت قابل قبول به بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای و ریزش دانه، از ویژگی‌های بارز رقم شوش محسوب می‌شود.



# نارین

رقم نارین مناسب کشت در مناطق مواجه با شوری در اقلیم معتدل و گرم

سال معرفی: ۱۳۹۳

مناطق مناسب کشت: مناطق دارای تنش شوری در اقلیم معتدل و گرم (بخش‌هایی از استان‌های یزد، کرمان، خراسان جنوبی و رضوی، فارس، سیستان (زابل)، قم، سمنان و اصفهان)

رقم نارین با شجره ۱-۶۶-۲۲/۳/Alvand/Ias۵۸ حاصل دورگ‌گیری بین گندم پیشتراز با سازگاری وسیع و پتانسیل عملکرد بالا به عنوان والد پدری و لاین متحمل به شوری ۱-۶۶-۲۲ به عنوان والد مادری است. این رقم طی آزمایش سازگاری و پایداری عملکرد (در شرایط تنش شوری) با میانگین عملکرد  $4/90\text{t}$  تن در هکتار در مجموع ۱۹ درصد نسبت به میانگین ارقام شاهد افزایش عملکرد داشته است. میانگین عملکرد این رقم در آزمایش‌های تحقیقی - تطبیقی و ترویجی اجرا شده در مناطق مختلف دارای آب و خاک شور در اقلیم معتدل و گرم، به ترتیب  $4/70\text{t}$  و  $4/47\text{t}$  تن در هکتار بود که نسبت به میانگین عملکرد دانه ارقام شاهد در شرایط زارعان حدود ۱۷ درصد افزایش عملکرد داشت. با توجه به تحمل به شوری، پتانسیل عملکرد بالا، سازگاری خوب در مناطق با تنش شوری در اقلیم معتدل و گرم، مقاومت به خوابیدگی، مقاومت به ریزش دانه، کیفیت خوب، و زودرسی نسبی رقم نارین در مقایسه با ارقام شاهد ارگ، افق و بم، این رقم برای مناطق مواجه با تنش شوری آب و خاک ( $11\text{ds/m} = \text{EcWater}$  و  $8\text{ ds/m} = \text{EcSoil}$ ) معرفی شد.

بهاره	عادت رشدی
۷۶ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
مقاوم	وضعیت ریزش دانه
نیمه مقاوم تانیمه حساس	واکنش به بیماری زنگ زرد
نیمه حساس	واکنش به بیماری زنگ قهوه‌ای
نیمه حساس	واکنش به زنگ سیاه نژاد Ug۹۹
۴۱ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۱/۸	میانگین درصد پروتئین
خوب	کیفیت نانوایی



# حیدری

رقم کندم نان مناسب برای شرایط مشکل آفریضی از خشکی زراعی در اقلیم سرد

سال معرفی: ۱۳۹۴  
مناطق مناسب کشت: مناطق دارای تنفس خشکی آخر فصل در اقلیم سرد

میانگین عملکرد دانه	۵۵۹۶ کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی	بهاره
میانگین ارتفاع بوته	۹۵ سانتی متر
میانگین وزن هزار دانه	۳۷ گرم
مقاومت به خوابیدگی	مقاوم
واکنش به بیماری زنگ زرد	مقاوم
واکنش به بیماری زنگ قهوه‌ای	مقاوم
وضعیت ریزش دانه	مقاوم
میانگین درصد پروتئین	۱۲/۴
کیفیت نانوایی	بسیار خوب

گندم نان رقم حیدری با شجره "s" / "s" Bow / ۹۰ Zhong ۸۷ / ۳ / Shiroodi حاصل دورگ‌گیری بین گندم شیرودی و لاین "s" / "s" Bow / ۹۰ Zhong ۸۷ در کرج است. این رقم دارای پتانسیل عملکرد بالا هم در شرایط آبیاری نرمال و هم در شرایط تنفس قطع آبیاری‌های آخر فصل زراعی است. میانگین تعداد روز تا سنبله‌دهی در این رقم در هر دو شرایط نرمال و تنفس خشکی آخر فصل ۱۲۸ روز است. همچنین میانگین روز تا رسیدن فیزیولوژیکی در شرایط نرمال ۱۷۶ روز و در شرایط تنفس خشکی ۱۶۵ روز است. رنگ دانه این رقم زرد کهربایی است و شاخص سختی دانه آن ۵۱ است.



# برات

## رقم‌نام نان مناسب برای کشت دار قیم کرم و خنک جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۹۴

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور بهخصوص مناطقی که بیماری‌ها به ویژه زنگ زرد محدود کننده کشت گندم است (مناطق شمالی و جنوبی استان خوزستان، مناطق جنوبی استان فارس، مناطق گرم استان‌های لرستان، کرمان و کرمانشاه)

گندم نان رقم برات با شجرة SLVS\*/PASTOR انتخاب شده از خزانه بین‌المللی ۲۴SAWSN دریافت شده از مرکز تحقیقات بین‌المللی ذرت و گندم (سیمیت) است. این رقم دارای پایداری عملکرد دانه در شش ایستگاه اقلیم گرم و خشک جنوب کشور (زابل، داراب، اهواز، ایرانشهر، دزفول و خرم‌آباد) بوده و ارزیابی آن در قالب مطالعه خزانه بیماری‌ها نشان داد که نسبت به نژادهای فیزیولوژیک زنگ زرد در مناطق با شدت بیماری بالا (زرقان، ساری، مشهد، کرج، معان، اسلام‌آباد و اردبیل) مقاوم بوده است. پتانسیل عملکرد مطلوب، مقاومت به بیماری زنگ زرد و اردبیل) مقاوم بوده است. پتانسیل عملکرد مطلوب، مقاومت به ریزش دانه از ویژگی‌های بارز این رقم محسوب می‌شود.

بهاره	عادت رشدی
۹۷ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
نیمه مقاوم تا نیمه حساس	واکنش به بیماری زنگ قهوه‌ای
نیمه حساس	واکنش به سپتومیوز
مقاوم	واکنش به ریزش دانه
۴۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
در مزرعه: ۵۱۲ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
در ایستگاه تحقیقاتی: ۶۴۳۳ کیلوگرم در هکتار	میانگین درصد پروتئین
۱۲/۱ روز	تعداد روز تا ظهور سنبله
۱۱۲ روز	تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی
۱۵۰ روز	کیفیت نانوایی
خوب	



# شاور

رقم گندم نان مناسب برای کشت دا قلیم گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۹۴

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور به ویژه در کشت‌های تأخیری و در نظام‌های زراعی متداول در شمال خوزستان

بهاره	عادت رشدی
۸۵-۹۰ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
نیمه مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
نیمه حساس	واکنش به بیماری زنگ قوهای
نیمه مقاوم	واکنش به زنگ سیاه زیاد ug۹۹
مقاوم	واکنش به ریزش دانه
۳۸ گرم	میانگین وزن هزار دانه
در کشت تأخیری: ۳۹۸۰ کیلوگرم در هکtar	میانگین عملکرد دانه
۱۲/۲	میانگین درصد پروتئین
۱۱۵ روز	تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی
خوب	کیفیت نانوایی

گندم نان رقم شاور با شجره Rsh ۲/۱۰۱۲//Zagros از طریق روش تولید هاپلولئید در ارقام گندم هگزاپلولئید و با روش حذف کروموزومی (تلاقی گندم و ذرت) در داخل کشور تولید شد. این رقم نسبت به بیماری زنگ زرد گندم، مقاومت قابل قبولی از خود نشان داده است. همچنانی نتایج آزمایش‌های انجام شده در کشور کنیا نیز حاکی از این است که رقم شاور نسبت به بیماری زنگ سیاه زیاد ug۹۹ نیمه مقاوم بوده است. با توجه به خصوصیات بر جسته این رقم و ضرورت جایگزینی ارقام زودرس‌تر با مقاومت بالاتر نسبت به بیماری زنگ زرد در کشت‌های تأخیری به جای ارقامی مانند ویریناک در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور، رقم شاور می‌تواند کمبود رقم را در اینگونه سیستم‌های زراعی تأمین کند.



# رخشان

رقم کندم نان مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور

سال معرفی: ۱۳۹۴

مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل استان های فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی و جنوبی، لرستان، البرز، تهران، یزد، کرمان و سمنان

بهاره	عادت رشدی
۱۰۰ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری زنگ قهقهه ای
نیمه مقاوم	واکنش به زنگ سیاه نژاد ug۹۹
شرایط نرمال: ۸۲۳۳ کیلوگرم در هکتار شرایط تنفس خشکی: ۴۴۷۸ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه در مزارع کشاورزان
۱۲/۳	میانگین درصد پروتئین
	تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی
خوب	کیفیت نانوایی

گندم نان رخشان با شجره SHARP/۳/PRL/SARA//TSI/VEE#۵/۵/VEE/LIRA//BOW/۳/BCN/۴/ KAUZ دارای پتانسیل عملکرد خوب در شرایط نرمال است. این رقم نسبتاً زودرس بوده و نسبت به خشکی و کم آبی در انتهای فصل و دوره پر شدن دانه متحمل است. علاوه بر این نسبت به بیماری های زنگ زرد، زنگ قهقهه ای و زنگ سیاه نژاد ug۹۹ نیز نیمه مقاوم است.



## سخنجهه

### رقم لندم دوروم دیررس و دارای عادت رشد زمانی

سال معرفی: ۱۳۷۶

مناطق مناسب کشت: اقلیم سرد کشور به ویژه دو استان آذربایجان غربی و همدان

گندم دوروم رقم سیمینه دارای شجره DKGST.۳۶ و تیپ رشد زمستانه است. میانگین عملکرد آن در ایستگاه‌های مورد مطالعه ۶۳۱ کیلوگرم در هکتار بود. این رقم نسبت به بیماری‌های زنگ زرد و زنگ قوهای مقاومت بالایی نشان داد. مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه و داشتن دانه‌های زرد نیز از دیگر مشخصات زراعی آن محسوب می‌شود. علاوه بر این، رقم سیمینه در برابر بیماری سیاهک ناقص نیز مقاوم است. مقدار سمولینا در این رقم ۵۸ درصد بوده و از کیفیت مناسبی برای تهیه ماکارونی برخوردار است.

میانگین عملکرد دانه ۶۳۱ کیلوگرم در هکتار	
زمستانه	عادت رشدی
دیررس	گروه رسیدگی
مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
مقاوم	وضعیت ریزش دانه
مقاوم	مقاومت به سرما
۱۰۰ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
۴۳ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۲	میانگین درصد پروتئین



# کرخه

رقم لندم دورم دارای عادت رشد بسیاره و مناسب کشت در نیزه جنوبی کشور

سال معرفی: ۱۳۸۲

مناطق مناسب کشت: اقلیم گرم و خشک جنوب کشور به ویژه استان های خوزستان، ایلام و جنوب فارس، مناطق گرم کرمان و جنوب استان کرمان

رقم کرخه با شجرة Shwa/Mald/Aza و عادت رشدی بهاره، مناسب کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور است. میانگین ارتفاع بوته آن حدود ۹۵ سانتی متر است و کیفیت مطلوبی برای پخت ماکارونی دارد. مقاومت به بیماری های زنگ زرد، سفیدک پودری، سیاهک ناقص و نقطه سیاه از ویژگی های این رقم است. این رقم ظرفیت کودپذیری زیادی دارد و دارای دانه هایی با بافت شیشه ای و به رنگ زرد کهربایی است.

میانگین عملکرد	۶۶۰۰ کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی	بهاره
واکنش به بیماری زنگ زرد	مقاوم
میانگین ارتفاع بوته	۹۵ سانتی متر
میانگین وزن هزار دانه	۴۶ گرم
گروه رسیدگی	زودرس
واکنش به خوابیدگی	مقاوم
واکنش به ریزش دانه	مقاوم
میانگین درصد پروتئین	۱۳/۲



# آریا

## رقم کندم و دروم مناسب کشت در مناطق معتدل کشور

سال معرفی: ۱۳۸۲

مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل گرم و معتدل سرد شامل استان‌های البرز، کرمانشاه، تهران، خوزستان، فارس و خراسان رضوی

رقم آریا با شجره Stork و عادت رشدی بهاره برای کشت در مناطق معتدل گرم و معتدل سرد معرفی و آزادسازی شده است. این رقم به خوابیدگی و ریزش دانه مقاوم بوده و از ظرفیت کودپذیری زیادی برخوردار است. در آزمایش‌های انجام شده در هشت ایستگاه تحقیقاتی معتدل و گرم کشور، این رقم با رکورد ۸/۹۴۰ تن در هکتار در کرج و متوسط عملکرد ۶/۷۸۲ تن در هکتار در سه سال و هشت منطقه حدود ۱۰ درصد برتری عملکرد دانه نسبت به رقم شاهد یاوروس نشان داد. دانه رقم آریا به رنگ زرد کهربایی و بافت آن شبیه‌ای است که برای تولید ماکارونی و صنایع پاستا کاملاً مناسب است. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که این رقم در برای بیماری‌های زنگ زرد، سفیدک پودری، سیاهک ناقص و نقطه سیاه از مقاومت خوبی برخوردار است.

میانگین عملکرد دانه ۶۷۸۲ کیلوگرم در هکتار	
بهاره	عادت رشدی
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
۹۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
۴۵ گرم	میانگین وزن هزار دانه
متوسط‌رس	گروه رسیدگی
مقاوم	واکنش به خوابیدگی
مقاوم	واکنش به ریزش دانه
۱۲/۸	میانگین درصد پروتئین دانه



# دنا

## رقم گندم در روم مناسب کشت داقلیم های معتدل و گرم و خنک جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۸۶

مناطق مناسب کشت: استان های گلستان، تهران، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، اصفهان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و سایر مناطق مشابه در هر دو اقلیم معتدل و گرم و خشک جنوب کشور

رقم دنا با شجره Tarro<sup>۳</sup> در قالب خزانه بین المللی در سال زراعی ۱۳۷۴-۱۳۷۳ از مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت (CIMMYT) دریافت و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال ۱۳۸۶ معرفی و آزادسازی شد. این رقم در کلیه مراحل تحقیقاتی نسبت به ارقام شاهد در هر دو اقلیم گرم و معتدل برتری داشت. زودرس تر بودن نسبت به ارقام شاهد، عملکرد بیشتر، درصد پروتئین بالا، مقاومت به ریزش و بیماری های زنگ و سیاهک ناقص و درصد گلوتون بیشتر از ویژگی های بارز این رقم است.

۶۸۰۰ کیلوگرم در هектار	میانگین عملکرد دانه
۹۴ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
بهاره	عادت رشدی
مقاوم	وضعیت ریزش دانه
مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
۴۴ گرم	وزن هزار دانه
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
مقاوم	واکنش به بیماری سیاهک پنهان
مقاوم	واکنش به بیماری سیاهک ناقص
۱۲/۲	میانگین درصد پروتئین
خوب	کیفیت پخت ماکارونی



# بهرنگ

رقم گندم دوروم مناسب کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۸۸

**مناطق مناسب کشت:** مناطق گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و بوشهر

رقم بهرنگ با شجره ۳-ZHONG ZUO/۲\*GREEN در قالب خزانه بین المللی در سال زراعی ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ از مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت (CIMMYT) دریافت و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال ۱۳۸۸ معرفی و آزادسازی شد. مقاومت به بیماری زنگ سیاه نژاد UG99، مقاومت به بیماری زنگ زرد در ایستگاه های مورد بررسی و پایداری عملکرد دانه از ویژگی های بارز این رقم است. این رقم به دلیل سازگاری مناسب و عملکرد مطلوب در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور و نیز کیفیت خوب دانه برای تهیه ماکارونی مناسب است و مورد استقبال کشاورزان این اقلیم قرار گرفته است.



میانگین ۶۶۸۵ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
بهاره	عادت رشدی
۶۴ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
مقاوم	واکنش به خوابیدگی
مقاوم	وضعیت ریزش دانه
۵۲ گرم	میانگین وزن هزار دانه
MR ۲۰	واکنش به بیماری زنگ زرد
مقاوم	واکنش به بیماری سیاهک پنهان
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری زنگ سیاه نژاد UG99
مقاوم	واکنش به بیماری سیاهک ناقص
خوب	کیفیت پخت ماکارونی

# شیرنگ

رقم گندم در روم مناسب کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۹۳

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشک کشور، نظیر استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، ایلام و مناطق گرم استان های کرمان، لرستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و فارس

میانگین عملکرد دانه در هکتار	۶۶۳۹ کیلوگرم
بهاره	عادت رشدی
۹۱ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
مقاوم	واکنش به خواهیدگی بوته
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ قهوه‌ای
۴۶ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۱/۸	میانگین درصد پروتئین
خوب	کیفیت پخت ماکارونی

لاین (DW-۸۱-۱۸) طی ۱۲ سال در پنج ایستگاه تحقیقاتی گرم کشور ارزیابی شد و در نهایت شیرنگ نام گرفت. شاخص ترین برتری رقم شیرنگ نسبت به شاهد کرخه، بالا بودن عملکرد دانه آن به میزان ۷ درصد (۴۶ کیلوگرم / هکتار) است. این رقم علاوه بر عملکرد بالاتر، دارای سازگاری بیشتری با مناطق شمال خوزستان، لرستان و مناطق هم اقلیم آنها است. رقم شیرنگ نسبت به بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه‌ای مقاوم می باشد. از نظر کیفیت و ارزش غذایی نیز با ۱۱/۸ درصد پروتئین جزو ارقام با کیفیت خوب گندم است.



# کویر

رقم جزو دس دارای عادت رشدی میانی و مناسب کشت در مناطق معتدل گرم

سال معرفی: ۱۳۵۸

مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل گرم دارای زمستان ملایم و بهار نسبتاً کوتاه

جو کویر با شجره Arivat با مبدأ وزارت کشاورزی ایالات متحدة آمریکا انتخاب و در سال ۱۳۵۸ و پس از ارزیابی های تکمیلی معرفی و آزادسازی شد. جو کویر رقمی پر محصول و زودرس و مناسب کشت در مناطق معتدل گرم با زمستان ملایم و بهار نسبتاً کوتاه است. متوسط عملکرد این رقم در استان های معتدل گرم کشور ۴/۵-۵/۵ تن در هکتار است و طی سال ها و شرایط آب و هوایی مختلف عملکرد پایداری نشان داده است. جو کویر زودرس و میانگین ارتفاع آن ۹۰ سانتی متر بوده و نسبت به خوابیدگی نیمه مقاوم است. این رقم نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه ۴۴-۴۵ گرم است. رقم کویر نسبت به سفیدک حقیقی نیمه مقاوم است.

میانگین عملکرد دانه ۵۰۰۰ کیلو گرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
بینابین	عادت رشدی
نیمه مقاوم	واکنش به سفیدک حقیقی جو
مقاوم	واکنش به خشکی آخر فصل
زودرس	گروه رسیدگی
نیمه مقاوم	واکنش به خوابیدگی
نیمه حساس	واکنش به ریزش دانه
۱۱/۵	میانگین درصد پروتئین
۹۰ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
۴۲ گرم	میانگین وزن هزار دانه



کارون

رقم جو مناسب کشت دمناٹی گرم جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۵۹

**مناطق مناسب کشت:** اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ایلام، بوشهر، جنوب کرمان و بخش‌هایی از استان لرستان و خراسان رضوی

جو کارون با شجره Strain ۲۰۵ با مبدأ وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا انتخاب و در سال ۱۳۵۹ و پس از ارزیابی های تکمیلی معرفی و آزادسازی شد. جو کارون رقمی پرمحصول و مقاوم به تنش های گرمایی آخر فصل است. عملکرد این رقم ۴/۵ تن در هکتار بوده و پایداری عملکرد این محصول طی سال ها و شرایط آب و هوایی مختلف از خصوصیات بارز آن است. جو کارون رقمی نیمه پالپیند با متوجه ارتفاع ۱۰۵ سانتی متر است. این رقم نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن و وزن هزار دانه آن ۴۳-۴۱ گرم است. این رقم در برابر سفیدک حقیق مقاوم است.

میانگین عملکرد دانه	۴۲۵۰ کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی	بهاره
واکنش به سفیدک حقیقی جو	مقاوم
واکنش به خوابیدگی	نیمه مقاوم
واکنش به ریزش دانه	نیمه حساس
واکنش به گرمای آخر فصل	مقاوم
میانگین درصد پروتئین	۱۱/۵
میانگین ارتفاع بوته	۱۰۵ سانتی متر
میانگین وزن هزار دانه	۴۲ گرم
گروه رسیدگی	متوسط رس



# الفجر

رقم جو نیز زودس دارایی عادت رشدی میانی و مناسب کشت در مناطق سرد با بهار طولانی

سال معرفی: ۱۳۶۴

مناطق مناسب کشت: مناطق سرد با بهار طولانی

جو والفجر با شجره ۱۰۸۹۸۵ - CI از بین مواد دریافتی از کلکسیون بین المللی جو انتخاب شد. جو والفجر رقمی پرمحصول است. عملکرد این رقم در ایستگاههای مختلف بین ۵/۵-۷/۵ تن در هکتار بوده است. بیشترین میزان برداشت از این رقم، حدود ۱۱ تن در هکتار در یکی از مزارع کشاورزان استان خراسان گزارش شده است. این رقم پابلند، دارای تیپ رشد بینابین بوده و نسبت به سرما نیمه مقاوم است. متوسط ارتفاع آن ۱۱۰ سانتی متر و نسبت به خوابیدگی نیمه حساس است. این رقم متوسطرس و نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه ۴۰-۴۴ گرم بوده و در برابر سفیدک جو نیمه مقاوم است.

میانگین عملکرد دانه	کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی	بینابین
واکنش به سفیدک حقیقی جو	نیمه مقاوم
واکنش به خوابیدگی	نیمه حساس
واکنش به ریزش دانه	نیمه حساس
میانگین درصد پروتئین	۱۲/۵
میانگین ارتفاع بوته	۱۱۰ سانتی متر
میانگین وزن هزار دانه	۴۲ گرم
گروه رسیدگی	متوسطرس



# ارس

رقم جویرس دارایی عادت رشدی زمانه مناسب کشت و مناطق مرتفع سرد کشور

سال معرفی: ۱۳۶۷

مناطق مناسب کشت: اراضی دشت مغان

جو ارس با شجره Arumir از اروپا وارد و در سال ۱۳۶۷ پس از ارزیابی های تکمیلی معرفی و آزادسازی شد. متوسط عملکرد این رقم ۵۴۰۰ کیلوگرم در هکتار و میانگین ارتفاع آن ۹۵ سانتی متر است. این رقم جو، دو ردیفه بوده و نیمه مقاوم به ریزش دانه و مقاوم به خوابیدگی است. میانگین درصد پروتئین آن ۱۳ و میانگین وزن هزار دانه آن ۴۶ گرم است. این رقم نسبت به سفیدک سطحی جو مقاوم و نسبت به سرما متحمل است.

۵۴۰۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
بهاره	عادت رشدی
مقاوم	واکنش به سفیدک سطحی جو
متحمل	واکنش به سرما
مقاوم	واکنش به خوابیدگی
نیمه مقاوم	واکنش به ریزش دانه
۱۳	میانگین درصد پروتئین
۹۵ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
۴۶ گرم	میانگین وزن هزار دانه
متوضطرس	گروه رسیدگی



# ماکویی

رقم جو در ای عادت رشدی زمستانه مناسب کشت در مناطق مرتفع سرد کثیر

سال معرفی: ۱۳۷۰

مناطق مناسب کشت: اقلیم سرد شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، خراسان شمالی و رضوی، چهارمحال و بختیاری و بخش هایی از استان فارس، کرمان و لرستان

جو ماکویی از طریق سازمان خواربار جهانی (FAO) با نام Star دریافت شد و پس از ارزیابی های تکمیلی، به پاس بزرگداشت مرحوم حسن نصرت ماکویی در سال ۱۳۶۹، ماکویی نام گرفت و آزادسازی شد. این رقم مقاوم به سرما بوده و مناسب کشت در مناطق مرتفع دارای زمستانهای سرد است. جو ماکویی رقمی نیمه پابلند با متوسط ارتفاع ۱۰۵ سانتی متر و نسبت به خوابیدگی مقاوم است. این رقم دیررس و نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه ۴۰-۴۲ گرم است. رقم ماکویی نسبت به سرما و نسبت به بیماری سفیدک جو مقاوم است.

میانگین عملکرد دانه	۶۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی	زمستانه
واکنش به لکه قهوه ای برگی جو	نیمه مقاوم
واکنش به سفیدک سطحی جو	مقاوم
واکنش به خوابیدگی	مقاوم
واکنش به سرما	نیمه حساس
میانگین درصد پروتئین	۱۱/۵
میانگین ارتفاع بوته	۱۰۵ سانتی متر
میانگین وزن هزار دانه	۴۱ گرم



# دشت

رقم جوینید و رس دارای عادت رشدی میانگین و مناسب کشت در اراضی دشت مغان

سال معرفی: ۱۳۷۲

مناطق مناسب کشت: اراضی دشت مغان

جو دشت با شجره Probest dwarf از بین مواد دریافتی از مرکز تحقیقات بین‌المللی مناطق خشک (ایکاردا) با مبدأ کشور فرانسه، انتخاب و پس از ارزیابی‌های تکمیلی در سال ۱۳۷۲ معرفی و آزادسازی شد. جو دشت رقمی پرمحصول، با میانگین ارتفاع ۹۰ سانتی‌متر، دیررس و نیمه مقاوم به ریزش دانه است. رنگ دانه این رقم روشن با وزن هزار دانه ۴۶-۴۸ گرم است. این رقم دارای تیپ رشد بهاره - پاییزه بوده و مناسب کشت در مناطق گرم شمال کشور به ویژه سازگار با شرایط محیطی منطقه مغان و مناسب کشت در اراضی دیم و آبی این منطقه است. این رقم نسبت به بیماری‌های قارچی برگی جو مقاومت دارد.

میانگین عملکرد دانه	۵۲۵۰ کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی	بناییمن
واکنش به لکه قهوه‌ای برگ	مقاوم
واکنش به سفیدک	مقاوم
واکنش به خشکی	متحمل
واکنش به گرمای آخر فصل	متتحمل
واکنش به خوابیدگی	مقاوم
واکنش به ریزش دانه	نیمه مقاوم
میانگین درصد پروتئین	۱۳
میانگین وزن هزار دانه	۴۷ گرم
میانگین ارتفاع بوته	۹۰ سانتی‌متر



# ترکمن

رقم جزو دس دارای عادت رشدی بهار و مناسب کشت در مناطق گرم و اراضی لب شور

سال معرفی: ۱۳۷۲

مناطق مناسب کشت: شمال گرگان و دشت، مناطق گرم، اراضی لب شور و با رطوبت کم

جو ترکمن با شجره "Rihane S-۵۰۰" از بین مواد دریافتی از مرکز تحقیقات بین‌المللی برای مناطق خشک (ایکاردا) انتخاب و پس از ارزیابی‌های تکمیلی معرفی و آزادسازی شد. این رقم برای کشت در مناطق گرم شمال کشور به‌ویژه قسمت‌های شمالی دشت گرگان که دارای اراضی لب شور و رطوبت کم هستند، مناسب است. جو ترکمن رقمی نیمه پابلند با متوسط ارتفاع ۱۰۵ سانتی‌متر بوده و نسبت به خوابیدگی نیمه حساس است. این رقم زودرس و نیمه مقاوم به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه ۴۰-۴۴ گرم است. رقم ترکمن نسبت به سفیدک جو نیمه مقاوم است.

میانگین عملکرد دانه ۵۰۰۰ کیلوگرم در هектار	
بهاره	عادت رشدی
نیمه مقاوم	واکنش به لکه قهوه‌ای جو
نیمه مقاوم	واکنش به سفیدک سطحی جو
مقاوم	واکنش به لکه برگی نواری
متحمل	واکنش به سوختگی برگی جو
حساس	واکنش به سرما
نیمه حساس	واکنش به خوابیدگی
نیمه مقاوم	واکنش به ریزش دانه
۱۲/۵	میانگین درصد پروتئین
۴۲ گرم	میانگین وزن هزار دانه



# ریحان

رقم جو نیز زودرس دارای عادت رشدی باره و مناسب برای کشت در مناطق معتدل و معتدل گرم

سال معرفی: ۱۳۷۳

مناطق مناسب کشت: اقلیم معتدل شامل استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، یزد، کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوین و بخش هایی از مناطق اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

این رقم با نام Rihane از بین مواد دریافتی از مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) انتخاب و پس از طی مراحل مقایسه عملکرد و ارزیابی سازگاری ریحان نام گرفت و برای کشت در مناطق معتدل گرم کشور معرفی شد. جو ریحان رقمی پرمحصول و زودرس با عملکرد ۶-۷ تن در هکتار است. میانگین ارتفاع آن ۹۰ سانتی متر بوده و نسبت به خوابیدگی و ریزش دانه نیمه مقاوم است. رنگ دانه آن روشن و وزن هزار دانه آن ۴۲-۴۶ گرم است. جو ریحان در برابر سفیدک حقیقی در مناطق معتدل کشور نیمه مقاوم است.



میانگین عملکرد کیلوگرم در هکتار	۷۵۰۰
عادت رشدی	بهاره
جو	واکنش به لکه قهوه ای
سفیدک	واکنش به سفیدک
جو	واکنش به زنگ قهوه ای
سرما	واکنش به سرما
خوابیدگی	واکنش به خوابیدگی
دانه	واکنش به ریزش دانه
درصد پروتئین	میانگین درصد پروتئین
گرم	میانگین وزن هزار دانه

# جنوب

رقم جوینید زودس دارای عادت رشدی بماره

سال معرفی: ۱۳۷۶

مناطق مناسب کشت: اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ایلام، بوشهر، جنوب کرمان و بخش‌هایی از استان لرستان و خراسان رضوی

جو رقم جنوب با شجرة "Gloria"s/Copal"s" از بین مواد دریافتی از مرکز تحقیقات بین‌المللی ذرت و گندم (سیمیت) انتخاب و پس از ارزیابی‌های تکمیلی در سال ۱۳۷۶ معرفی و آزادسازی شد. این رقم پرمحصول و مقاوم به تنفس گرمای آخر فصل و مناسب کشت در اراضی منطقه گرم جنوب کشور است. این رقم نیمه‌زودرس و نیمه‌مقاوم به ریزش دانه و مقاوم به خوابیدگی است و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه ۴۰-۴۴ گرم است. نتایج بررسی‌ها در ایستگاه‌های تحقیقاتی مناطق گرم کشور نشان داده است که این رقم در برابر سفیدک حقیقی مقاوم است.

میانگین عملکرد دانه در هکتار	۵۲۵۰ کیلوگرم
بهار	عادت رشدی
نیمه‌ مقاوم	واکنش به لکه قهوه‌ای جو
نیمه‌ مقاوم	واکنش به سفیدک سطحی جو
متتحمل	واکنش به خشکی آخر فصل
متتحمل	واکنش به گرمای آخر فصل
مقاوم	واکنش به خوابیدگی
نیمه‌ مقاوم	واکنش به ریزش دانه
۱۲	میانگین درصد پروتئین
۴۲ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۸۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته



# صحرا

رقم جزو دس وارای عادت رشدی بهاره و مناسب کشت در اراضی گرم شمال کشور

سال معرفی: ۱۳۸۲

مناطق مناسب کشت: اراضی گرم شمال کشور به ویژه اراضی گرم ساحل خزر، گرگان و گنبد و دشت مغان

جو صحرا با شجره Glorias"s"Com L.BLRAN/Una۸۲۷۱// دریافتی از مرکز تحقیقات بین‌المللی ذرت و گندم (سیمیت) انتخاب و در سال ۱۳۷۶ معرفی و آزادسازی شد. این رقم مقاوم به حرارت محیط و مناسب کشت در اراضی منطقه گرم شمال به ویژه اراضی گرم ساحل خزر، گرگان و گنبد است. میانگین ارتفاع این رقم ۹۷/۵ سانتی‌متر است. این رقم در برابر ریزش دانه و خوابیدگی مقاوم بوده، رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه ۴۴ گرم است.

میانگین وزن هزار دانه	متوجه این رقم در سال ۱۳۷۶
۵۲۵۰ کیلوگرم در هکتار	عادت رشدی
بهاره	واکنش به لکه قهوه‌ای جو
نیمه مقاوم	واکنش به سفیدک سطحی جو
نیمه مقاوم	واکنش به گرمای آخر فصل
مقاوم	واکنش به خوابیدگی
مقاوم	واکنش به ریزش دانه
۱۲	میانگین درصد پروتئین
۴۴ گرم	میانگین وزن هزار دانه
زود رس	گروه رسیدگی



# نیمروز

رقم جو آبی با سارگاری و سیم و مناسب کشت در قلیم کرم جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۸۷

مناطق مناسب کشت: اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ایلام، بوشهر، جنوب کرمان و بخش‌هایی از استان لرستان و خراسان رضوی

رقم جو نیمروز با شجره Trompillo از خزانه جو مرکز تحقیقات بین‌المللی گندم و ذرت (سیمیت) در سال زراعی ۱۳۶۸-۶۹ دریافت و انتخاب شد و پس از ارزیابی‌های تکمیلی در سال ۱۳۸۷ معرفی و آزادسازی شد. از خصوصیات بارز آن مقاومت نسبت به شکنندگی محور سنبله، تحمل به خشکی و گرمای آخر فصل زراعی در مناطق گرم جنوب کشور است. میانگین پروتئین این لاین ۱۲ درصد است که نشان‌دهنده کیفیت مطلوب آن از نظر علوفه است.

میانگین عملکرد دانه	۴۹۰۲ کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته	۹۴ سانتی‌متر
عادت رشدی	بهاره
تعداد ردیفه	دو ردیفه
وضعیت ریزش دانه	مقاوم
مقاومت به خوابیدگی	مقاوم
میانگین وزن هزار دانه	۴۶ گرم
واکنش به بیماری سفیدک جو	مقاوم
کیفیت دانه	خوب



# نصرت

رقم جوآبی بازارگاری وسیع و مناسب کشت در اقلیم معتدل

سال معرفی: ۱۳۸۷

مناطق مناسب کشت: اقلیم معتدل کشور شامل استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، یزد، کرمان و بخش‌هایی از استان‌های کرمانشاه، مرکزی و قزوین

رقم نصرت حاصل تلاقي رقم کارون (پایه مادری) و کویر (پایه پدری) در سال زراعی ۱۳۶۳-۶۴ است. هر دو رقم والدی از ارقام تجاري مورد کشت بوده و سازگاری خوبی با شرایط اقلیمی ايران داشته‌اند. جو نصرت از سازگاری وسیع و پایداری عملکرد دانه قابل توجهی برخوردار است. تحمل به سرما و شرایط سخت محیطی، کشت این رقم را در مقایسه با دیگر ارقام مناسب منطقه معتدل، ارجح می‌کند. این رقم نسبت به سرما نیمه حساس است و خسارت سرما در پی کاشت آن در مناطق معتدل سرد کشور شدید نیست.

۶۹۶۵ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۱۰۰ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
بینابین	عادت رشدی
شش ردیفه	تعداد ردیفه
نیمه مقاوم	وضعیت ریزش دانه
نیمه مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
۴۴ گرم	میانگین وزن هزار دانه
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری سفیدک
خوب	کیفیت



# فهرس - ۳۰

رقم جوایز با علکردها، معادم به خوابیدگی در شرایط بینه و مناسب کشته دناتق معتدل کشور

سال معرفی: زمستان ۱۳۸۷

**مناطق مناسب کشت:** اقلیم معتدل کشور شامل استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، یزد، کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوین

رقم فجر - ۳۰ حاصل دورگ گیری بین لاین Lignee ۱۳۱/Gerbel//Alger-Ceres به عنوان پایه مادری و رقم جنوب به عنوان پایه پدری است. تلاقي این رقم در سال ۱۳۷۱-۷۳ در کرج انجام گرفت و یکی از ارقام حاصل از برنامه ملی به نژادی جو در کشور است. از صفات بارز این رقم مقاومت به خوابیدگی و شکنندگی محور سنبله، ریزش دانه و کودپذیری زیاد است.

میانگین عملکرد	۵۹۲۲ کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته	۸۰ سانتی متر
عادت رشدی	بینابین
تعداد ردیف	شش ردیفه
گروه رسیدگی	متوسط رس
مقاومت به خوابیدگی	مقاوم
وزن هزار دانه	۴۰ گرم
واکنش به بیماری سفیدک جو	نیمه حساس
میانگین درصد پروتئین	۱۲
مقاآمت به سرما	نیمه مقاوم
مقاآمت به شکنندگی محور	مقاوم
واکنش به خشکی آخر فصل	نیمه حساس



# بهمن

رقم جوآبی با علکرد و انبلا، مقاوم به خواصیکی و سرا، محل به تحقیق مناسب کشته در مناطق سردسیر کشور

سال معرفی: ۱۳۸۷

مناطق مناسب کشته: اقلیم سرد کشور شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی، خراسان شمالی و رضوی، همدان، زنجان، اردبیل، کردستان و بخش هایی از استان های مرکزی، لرستان، فارس و کرمان

رقم جو بهمن با شجره WA ۲۱۹۶-Ny ۰۵-۱۸-F1//Scotia I از خزانه دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک (ایکاردا) در سال زراعی ۱۳۷۰-۷۱ به کشور وارد و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال ۱۳۸۷ معرفی و آزادسازی شد. رقم بهمن علاوه بر سازگاری و عملکرد بالا در منطقه سرد کشور، واجد خصوصیات مطلوبی نظریر مقاومت به سرما و متتحمل بودن به خشکی بوده و کشت آن از لحاظ اقتصادی باصرفه تر از رقم ماکویی است. این رقم در برابر شکنندگی محور سنبله نیز مقاوم است.

میانگین عملکرد دانه	۶۳۸۵ کیلوگرم در هектار
میانگین ارتفاع بوته	۸۰ سانتی متر
عادت رشدی	زمستانه
گروه رسیدگی	متوسطترس
مقاومت به خواصیکی	مقاوم
وزن هزار دانه	۴۰ - ۳۵ گرم
واکنش به سفیدک پودری	نیمه حساس - حساس
واکنش به لکه برگی های جو	نیمه مقاوم
واکنش به ریزش دانه	مقاوم
میانگین درصد پروتئین	۱۱
مقاومت به سرما	در شرایط پوشش برف مقاوم و در شرایط بدون پوشش نیمه مقاوم



# یوسف

رقم جزو درس نمکی آخر فصل، با بهره وری بالای مصرف آب و مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور

سال معرفی: ۱۳۸۸

مناطق مناسب کشت: اقلیم معتدل کشور شامل استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، یزد، کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوین

Lignee ۵۲۷/Chn ۰۸/۳/Deir Alla ۰۵/Strain ۲۰۵ در سال زراعی ۱۳۷۷-۷۸ از طریق خزانه بین المللی ژنوتیپ های جو مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک (ایکاردا) به کشور وارد و پس از ارزیابی های تکمیلی در سال ۱۳۸۸ معرفی و آزادسازی شد. در اقلیم معتدل تنفس خشکی آخر فصل، رقابت محصولات بهاره با غلات برای آبیاری های آخر فصل و بادزدگی سبب محدودیت تولید جو می شوند. تولید ارقامی با خصوصیات رقم یوسف که متتحمل به خشکی آخر فصل و دارای پتانسیل عملکرد بالا زودرسی، تحمل به بادزدگی و بهره وری بالای مصرف آب و پایداری عملکرد با حداقل خصوصیات مطلوب است، در این اقلیم ضرورت دارد. عملکرد این رقم در شرایط تنفس آخر فصل و نیز در شرایط بدون تنفس در آزمایش های سازگاری و مزرعه کشاورزان نسبت به شاهد یک تن افزایش عملکرد داشته است. رکورد عملکرد دانه رقم یوسف در مزارع کشاورزان ۹۰۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است.

۵۱۹۸ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه (تنفس خشکی آخر فصل)
۶۱۶۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه (بدون تنفس خشکی)
بهاره	عادت رشدی
شش ردیفه	تعداد ردیف
۹۰ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
زودرس	گروه رسیدگی
نیمه حساس	واکنش به سفیدک سطحی
نیمه مقاوم	واکنش به لکه قهوه ای نواری
۴۲-۴۴ گرم	میانگین وزن هزار دانه
نیمه حساس	مقاومت به سرما
نیمه مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
مقاوم	مقاومت به شکنندگی محور سنبله
۱۲/۵	میانگین درصد پروتئین دانه
متحمل به خشکی	واکنش به خشکی



# نک

## رقم جوآبی بازارگاری و سچ مناسب کشت دا قلیم معتدل کشور

سال معرفی: ۱۳۹۰

مناطق مناسب کشت: اقلیم معتدل شامل استان‌های تهران، البرز، خراسان‌رضوی، فارس، اصفهان، یزد، کرمان و بخش‌هایی از استان‌های کرمانشاه، مرکزی و قزوین و بخش‌هایی از مناطق اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

رقم نیک با شجره ۶۳-۸۰ Lignee۵۲۷/NK۱۲۷۲//JLB۷۰ در سال زراعی ۱۳۷۹-۸۰ در قالب خزانه بین‌المللی از مرکز تحقیقات بین‌المللی برای مناطق خشک (ایکاردا) به کشور وارد و پس از ده سال بررسی معرفی و آزادسازی شد. این رقم در برابر سرما تحمل دارد و در برابر خشکی‌های آخر فصل و بیماری سفیدک پودری مقاوم و در برابر بیماری لکه قهوه‌ای نواری و زنگ زرد نیمه مقاوم است.

۶۰۵۲ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۸۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
بهاره	عادت رشدی
شش ردیفه	تعداد ردیف دانه در سنبله
متوسط رس	گروه رسیدگی
مقاوم	واکنش به بیماری سفیدک پودری
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری لکه نواری
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد
مقاوم	وضعیت ریزش دانه
نیمه مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
۴۲ گرم	میانگین وزن هزار دانه
خوب	کیفیت دانه



# زهک

رقم جوآبی باسارگاری ویچ و مناسب کشت در مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۹۱

مناطق مناسب کشت: اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ایلام، بوشهر، جنوب کرمان و بخش‌هایی از استان لرستان و خراسان رضوی

رقم زهک با شجرة Poa/Hjo//Qjina در سال زراعی ۱۳۷۵-۷۶ در قالب خزانه‌های بین‌المللی جو از مرکز تحقیقات بین‌المللی ذرت و گندم (سیمیت) به کشور وارد و پس از ارزیابی‌های تکمیلی در سال ۱۳۹۱ معرفی و آزادسازی شد. از صفات بارز این رقم طولانی‌تر بودن دوره پر شدن دانه نسبت به ارقام موجود جو و نبود گلچه‌های عقیم در سنبلچه‌های پایینی سنبله است.

میانگین عملکرد دانه	۴۸۴۶ کیلوگرم در هکتار
رکورد عملکرد دانه	۸۳۲۵ کیلوگرم در هکتار
عادت رشدی	بهاره
تعداد ردیف	شش ردیفه
میانگین ارتفاع بوته	۹۰ سانتی‌متر
گروه رسیدگی	نیمه‌زودرس
میانگین وزن هزار دانه	۳۵-۴۰ گرم
واکنش به بیماری سفیدک	نیمه مقاوم
واکنش به بیماری لکه قهوه‌ای	نیمه مقاوم
مقاومت به خوابیدگی	مقاوم
وضعیت ریزش دانه	مقاوم
باروری گلچه‌های پایینی سنبله	بارور
کیفیت دانه	خوب



# لوت

رقم جبودون پوشینه، سازگاری مناطق معتدل کشور و مناسب تغذیه طیور

سال معرفی: ۱۳۹۱

مناطق مناسب کشت: اقلیم معتدل شامل استان‌های تهران، البرز، خراسان‌رضوی، فارس، اصفهان، یزد، کرمان و بخش‌هایی از استان‌های کرمانشاه، مرکزی و قزوین

رقم لوت با شجره CONGONA/BORR در سال زراعی ۱۳۸۰-۸۱ در قالب خزانه بین‌المللی جو بدون پوشینه از مرکز تحقیقات بین‌المللی ذرت و گندم (سیمیت) انتخاب و پس از ارزیابی‌های تکمیلی در سال ۱۳۹۱ معرفی و آزادسازی شد. جو بدون پوشینه از لحاظ سازگاری با شرایط محیطی، به دلیل قدرت تحمل تنش‌های خشکی، گرما، شوری و فقر خاک وضعیت خوبی نسبت به سایر غلات دارد. جو بدون پوشینه به دلیل دارا بودن درصد الیاف و بتاگلوكان کمتر، می‌تواند در رژیم‌های غذایی طیور در کنار ذرت استفاده گردد. ویژگی‌های بارز رقم جو بدون پوشینه لوت، مناسب بودن برای تغذیه طیور، مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه، درصد پروتئین زیاد و بتاگلوكان اندک است.

۵۵۷۴ کیلوگرم در هکتار		میانگین عملکرد
۷۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته	
بهاره	تیپ رشد	
متوسط رسان	گروه رسیدگی	
۳۷ گرم	میانگین وزن هزار دانه	
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری لکه نواری	
نیمه حساس	واکنش به بیماری سفیدک پودری	
مقاوم	وضعیت ریزش دانه	
مقاوم	مقاومت به خوابیدگی	
۱۳	میانگین درصد پروتئین	
۳/۷۶	میانگین درصد بتاگلوكان	
خوب	مناسب برای تغذیه طیور	



# برخ

رقم جهانی بازارگاری و سچ برای اقلیم معتدل و مناسب برای تولید مالت

سال معرفی: ۱۳۹۲

**مناطق مناسب کشت:** اقلیم معتدل شامل استان‌های تهران، البرز، خراسان‌رضوی، فارس، اصفهان، یزد، کرمان و بخش‌هایی از استان‌های کرمانشاه، مرکزی و قزوین

۶۹۳۷ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۷۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
بهاره	عادت رشدی
دو ریفه	تعداد ردیف دانه در سنبله
نیمه مقاوم	واکنش به بیماری نواری
مقاوم	واکنش به بیماری زنگ زرد جو
نیمه حساس	واکنش به بیماری سفیدک
متوسط‌رس	گروه رسیدگی
نیمه مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
۴۵-۵۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
مقاوم	وضعیت ریزش دانه
خوب	وضعیت تولید مالت

رقم به رخ با شجره Novosadski\_۴۴۴ ۲۴ لاین بین‌المللی دیگر از کشورهای یوگسلاوی و روسیه در سال زراعی ۱۳۷۸-۷۹ وارد کشور شد و پس از ارزیابی‌های تکمیلی در سال ۱۳۹۲ معرفی و آزادسازی شد. جو به رخ از سازگاری وسیع و پایداری عملکرد دانه چشمگیری برخوردار است. مناسب بودن برای تولید مالت، وزن زیاد هزار دانه، مقاومت به زنگ زرد جو و نیمه‌ مقاوم بودن به بیماری لکه قهوه‌ای نواری از خصوصیات برجسته این رقم است.



# خاتم

## رقم جوآبی بسازگاری و عکلربال اراضی سور و لب شورا قلم معدل کشور

سال معرفی: ۱۳۹۴

مناطق مناسب کشت: اراضی آبی سور و لب شور استان های حاشیه کویرهای نمک و لوت شامل استان های اصفهان، یزد، قم، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و نیز مناطقی از استان های مرکزی و تهران

در شرایط سوری: ۵۳۷۵ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
در شرایط لب شور: ۶۹۶ کیلوگرم در هکتار	میانگین ارتفاع بوته*
۶۵ سانتی متر	عادت رشد
بینابین	روز تا گلددهی*
۱۰۴ روز	روز تا رسیدن فیزیولوژیکی*
۱۵۳ روز	واکنش به بیماری لکه برگی
نیمه حساس	واکنش به بیماری زنگ زرد
نیمه حساس	واکنش به بیماری سفیدک پودری
مقاوم	مقاومت به خواص گرگی
۱۲	میانگین درصد پروتئین
۳۶ گرم	میانگین وزن زهار دانه*
مقاوم	واکنش به ریزش دانه

\* در شرایط سوری



جو رقم خاتم با شجرة LB.Iran/Una ۸۲۷۱//Gloria"s"/Com"s"/Kavir حاصل تلاقی رقم صحراء، به عنوان پایه مادری و رقم کویر به عنوان پایه پدری است. این رقم دارای تیپ رشد بینابین بوده و متوسط ارتفاع بوته آن در شرایط نرمال ۹۰ سانتی متر و در شرایط تنفس شوری ۶۵ سانتی متر است. طول دوره رشد آن متوسط و حدود ۳-۴ روز زودرس تر از رقم نصرت است. رقم خاتم نسبت به خواص گرگی، ریزش دانه و شکنندگی محور سنبله مقاوم بوده و در برابر بیماری های زنگ زرد، سفیدک پودری و لکه قهوه ای جو نیمه حساس است، ولی در شرایط مناطق خشک حاشیه کویر نسبت به هیچ یک از این بیماری ها حساسیتی مشاهده نشده است. این رقم دارای سنبله شش ردیفه بوده و ویژگی اساسی آن سازگاری در شرایط خشک مناطق سور و لب شور حاشیه کویرهای لوت و نمک که اکثرا دارای اراضی کم بازده هستند، می باشد.

# جلگه

## رقم جو آبی باسارگاری و عملکرد بالامناوب کاشت داقیم سرد کشور

سال معرفی: ۱۳۹۴

مناطق مناسب کشت: اراضی پر پتانسیل اقلیم سرد کشور شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، زنجان، قزوین، تهران، مرکزی، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی

میانگین عملکرد دانه	میانگین ارتفاع بوته	سانتی متر	در هکتار	کیلوگرم ۷۳۶۱
عادت رشد	۹۰	زمستانه	میانگین ارتفاع بوته	
تعداد روز تا گلدهی *	۱۲۷	روز	زاده رشد	
تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیک *	۱۷۰			
واکنش به بیماری لکه‌نواری قهوه‌ای		نیمه حساس		
واکنش به بیماری زنگ زرد جو		نیمه مقاوم		
واکنش به بیماری سفیدک پودری		نیمه مقاوم		
مقاومت به خوابیدگی		مقاوم		
میانگین درصد پروتئین	۱۲			
میانگین وزن هزار دانه	۴۱ گرم			
واکنش به ریزش دانه		مقاوم		

\* از اوّل ماه ژانویه

جو رقم جلگه با شجرة Makouee/Zarjow/۸۰-۵۱۵۱ حاصل دو رگ گیری بین جو رقم ماکویی به عنوان پایه مادری و Zarjow/۸۰-۵۱۵۱ به عنوان پایه پدری می‌باشد. این رقم با تیپ رشد زمستانه دارای سنبله شرشدیفه بوده، و متوسط ارتفاع بوته آن ۹۰ سانتی متر است. رقم جلگه نسبت به سرما، خوابیدگی، ریزش دانه و شکنندگی محور سنبله مقاوم بوده و در برابر بیماری‌های زنگ زرد و سفیدک پودری جو نیمه مقاوم است. این رقم نسبت به بیماری لکه‌نواری قهوه‌ای جو نیز نیمه حساس است.



# گوهران

رقم جوآبی محل به شکل آخر فصل با بهره‌وری بالای مصرف آب جت کشتن مناطق معتدل کشور

سال معرفی: ۱۳۹۴

مناطق مناسب کشت: اقلیم معتدل کشور

در تنفس خشکی: ۴۹۵۸ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
در شرایط نرمال: ۷۱۶۱ کیلوگرم در هکتار	
۹۰ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
بهاره	عادت رشد
۹۴ روز	تعداد روز تا ظهور سنبله <sup>°</sup>
مقاوم تا نیمه مقاوم	واکنش به بیماری لکه‌نواری قهوه‌ای
نیمه مقاوم تا نیمه حساس	واکنش به بیماری زنگ زرد جو
نیمه مقاوم تا نیمه حساس	واکنش به بیماری سفیدک پودری
نیمه متحمل	واکنش به سرما
نیمه مقاوم	مقاومت به خوابیدگی
۱۲	میانگین درصد پروتئین
۴۳ گرم	میانگین وزن هزار دانه
متحمل	واکنش به خشکی آخر فصل

از اول ماه زانویه



جو رقم گوهران با شجرة Rhn ۰۳//L.۵۲۷/NK۱۲۷۲ در سال زراعی ۱۳۷۷-۷۸ از طریق خزانه بین‌المللی ژنتیپ‌های جو (IBYT-MRA) از ایکاردا وارد کشور شد و پس از دوازده سال تحقیق و ارزیابی در آزمایش‌های به نظردادی، واکنش به بیماری‌ها و آزمایش‌های تحقیقی - تطبیقی و ترویجی در ایستگاه‌ها و مزارع کشاورزان اقلیم معتدل کشور جهت نام‌گذاری انتخاب شد. سازگاری و پایداری عملکرد بالا، تحمل به خشکی آخر فصل با بهره‌وری بالای مصرف آب و نیمه‌ مقاوم بودن نسبت به بیماری لکه‌نواری جو از مهم‌ترین ویژگی‌های این رقم است.



# گرگان ۳

## رقم سویا مناسب کشت بهاره و تابستان

سال معرفی: ۱۳۶۱

مناطق مناسب کشت: کشت بهاره و تابستانه در استان های گلستان و مازندران

عملکرد دانه	کیلوگرم در هکتار
طول دوره رشد	۱۵۰ روز
میانگین وزن هزار دانه	۱۸۰ گرم
متوسط میزان پروتئین	۳۹ درصد
متوسط میزان روغن	۱۸ درصد
واکنش به ریزش دانه	مقاوم
واکنش به خوابیدگی	مقاوم

سویا رقم گرگان ۳ از ارقام وارداتی است و نام اصلی آن «هود» است. این رقم در آزمایش های منطقه ای استان گلستان از عملکرد و سازگاری مطلوبی بخوردار بوده و میانگین عملکرد آن ۳۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بود. از این رو در سال ۱۳۶۱ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان رقم «گرگان ۳» معرفی شد. میانگین مقدار پروتئین آن ۳۹ درصد و میانگین مقدار روغن آن ۱۸ درصد است. این رقم نسبت به ریزش دانه و خوابیدگی مقاوم است.



# سحر

## رقم سیماناسب برای کشت بهاره و تابستان

سال معرفی: ۱۳۷۲

مناطق مناسب کشت: کشت بهاره و تابستانه در استان‌های گلستان و مازندران

۲۵۰۰-۳۰۰۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه
۱۳۵ روز	طول دوره رشد
۱۴۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۲۱ درصد	متوسط میزان روغن
۳۷ درصد	متوسط میزان پروتئین
مقاوم	واکنش به ریزش دانه
مقاوم	واکنش به خوابیدگی

رقم سحر از ارقام وارداتی و نام اصلی آن پرشینگ است که در سال ۱۳۶۶ از خارج وارد کشور شد. با توجه به اینکه این رقم در آزمایش‌های منطقه‌ای طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۶۶ در استان‌های گلستان و مازندران از عملکرد و سازگاری زیادی برخوردار بود، در سال ۱۳۷۲ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان رقم جدید سحر معرفی شد. میانگین عملکرد این رقم ۲۷۵۰ کیلوگرم در هکتار، میانگین مقدار پروتئین دانه ۳۷ درصد، و میانگین مقدار روغن دانه ۲۱ درصد است و نسبت به ریزش دانه و خوابیدگی مقاومت دارد.



# تلا

## رقم سیماناسب برای کشت در استان مازندران

سال معرفی: ۱۳۸۰  
مناطق مناسب کشت: استان مازندران

کیلوگرم ۳۸۰۰ در هکتار	متوسط عملکرد
کیلوگرم ۴۶۰۰ در هکتار	بالاترین راندان در سطح وسیع
سفید	رنگ گل
کرم روشن	رنگ غلاف
محدود	تیپ رشد
چند شاخه	نوع شاخه بندی
کرم روشن	رنگ دانه
قهوه‌ای	رنگ ناف
۲۰ درصد	متوسط میزان روغن
۳۷ درصد	متوسط میزان پروتئین
۱۶۰ گرم	وزن هزار دانه
۵ زودرس	گروه رسیدن
۱۴	تعداد گره در ساقه
۶۳ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته

رقم تلا (B.P-۶۹۲) از مزرعه ازدیادی رقم سحر در استگاه تحقیقات کشاورزی باعث کلا در استان مازندران انتخاب شد. این رقم دارای برگ‌های نیزه‌های باریک با گل‌هایی به رنگ سفید است. تجمع کیسول‌های چهار دانه‌ای در انتهای ساقه اصلی، یکی از صفات مشخصه این رقم است. رقم تلا به خوابیدگی و ریزش مقاوم و به بیماری‌های مهم منطقه از جمله پوسیدگی زغالی و سفیدک سطحی سویا متتحمل است. رقم تلا در سطح آزمایشات منطقه‌ای در مازندران با متوسط عملکرد  $\frac{3}{8}$  تن در هکتار، نسبت به ارقام هیل و سحر حدود ۲۵ درصد برتری داشته است و بیشترین راندان این رقم در مزارع کشاورزان حدود ۴/۶ تن در هکتار و از اطراف بهشهر گزارش شده است. میانگین میزان روغن دانه آن ۲۰ درصد و میانگین مقدار پروتئین دانه آن ۳۷ درصد است. جهت کشت متراکم با فاصله ردیف ۲۵-۳۰ سانتی‌متر به خصوص در زراعت تابستانه نیز مناسب است. این رقم در شمال به «بی‌پی» و خرگوشی معروف است.



# ساری

رقم ساری مناسب برای کشت در استان مازندران

سال معرفی: ۱۳۸۰

مناطق مناسب کشت: استان مازندران

۴۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	متوسط عملکرد
۵۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	بالاترین راندمان در سطح وسیع
بنفس	رنگ گل
برنز (کرم مایل به قهوه‌ای روشن)	رنگ غلاف
نیمه محدود	تیپ رشد
چند شاخه	نوع ساخه بندی
کرم تیره	رنگ دانه
باریکه سیاه با هاله قهوه‌ای کم رنگ	رنگ ناف
۲۲ درصد	متوسط میزان روغن
۳۷ درصد	متوسط میزان پروتئین
۱۷۰ گرم	وزن هزار دانه
۵ دیررس	گروه رسیدن
۱۱	تعداد گره در ساقه
۸۷ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته

رقم ساری (J.K.-۶۹۵) از مزرعه نمایشی رقم K.W۵۰۵ در قریه جندین از توابع ساری انتخاب شد. برگ‌های این رقم پنهن و به رنگ سبز تیره و گل‌های آن بنفش است. شاخه‌های آن نیز زاویه کمی نسبت به ساقه اصلی دارند. این رقم از قدرت جوانهزنی بسیار خوبی برخوردار است و خزانی سریع دارد. رقم ساری به بیماری‌های مهم منطقه از جمله پوسیدگی زغالی متحمل است. این رقم در آزمایش‌های انجام شده در مازندران با متوسط عملکرد ۴/۱ تن در هکتار، نسبت به ارقام هیل و سحر حدود ۳۰ درصد برتری تولید داشته است و بیشترین راندمان این رقم در مزارع کشاورزان حدود ۵/۱ تن در هکتار از حومه نکا (روستای بابی‌کلا) گزارش شده است. میانگین میزان روغن دانه آن ۲۲ درصد و میانگین مقدار پروتئین دانه آن ۳۷ درصد است. دامنه کشت آن وسیع و از اراضی ساحلی تا ارتفاعات قابل کشت است. در کشت متراکم با فاصله ردیف ۲۵-۳۰ سانتی‌متر در زراعت‌های بهاره و تابستانه بسیار مناسب عمل می‌کند. رقم ساری در شمال به «جی کا» معروف است.



# نکادر

رقم سویا مناسب کشت بهاره و تابستانه آبی و بهاره دیم در مناطق مختلف مازندران

سال معرفی: ۱۳۸۹

مناطق مناسب کشت: کشت بهاره و تابستانه آبی و بهاره دیم در مناطق مختلف استان مازندران

سطح زیرکشت سویا در کشور در حدود ۷۰ هزار هکتار است که مازندران با ۱۵ تا ۲۰ هزار هکتار از مناطق مهم کشت این گیاه در کشور محسوب می‌شود. در سال ۱۳۷۱ با هدف اصلاح ارقام پرمحصول سویا در یک برنامه دورگ‌گیری از تلاقي بین ارقام تلار و گرگان -۳- تعداد زیادی لاین خالص به دست آمد که پس از ارزیابی مقدماتی و سازگاری به همراه ارقام تجاری منطقه لاین ۱۲۳-۷۰ ۱۳۱-۷۰ با توجه به عملکرد زیاد و سایر خصوصیات زراعی از جمله طول دوره رشد مناسب، تحمل به بیماری پوسیدگی زغالی، خوابیدگی بوته و ریزش دانه و مناسب بودن برای برداشت مکانیزه به عنوان رقم جدید نکادر معرفی شد.

نیمه محدود	تیپ رشدی
۳۶۰۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۱۰۵ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
۱۸۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۴۵ روز	طول دوره رشد
۵۰	تعداد غلاف در بوته
۱۷	تعداد گره در ساقه اصلی
۷ سانتی متر	فاصله میان گره
چند شاخه	نوع شاخه بندی
بنفس	رنگ گل
سفید	رنگ کرک
۱۵ سانتی متر	ارتفاع اولین غلاف از زمین
متتحمل	تحمل به بیماری پوسیدگی زغالی
مقاوم	تحمل به ریزش دانه
مقاوم	تحمل به خوابیدگی



# کتول

رقم سویا مناسب کشت بهاره و تابستانه مناطق مختلف گلستان

سال معرفی: ۱۳۸۹

مناطق مناسب کشت: کشت های اول و دوم در استان گلستان

میانگین ارتفاع بوته	۱۰۰ سانتی متر
میانگین عملکرد	۳۳۰۰ کیلوگرم در هکتار
رنگ گل	بنفش
رنگ کرك	طلایی
رنگ غلاف	طلایی
تیپ رشد	نامحدود
نوع شاخه بندی	چند شاخه
رنگ دانه	زرد روشن
رنگ ناف	سیاه تیره
متوسط میزان روغن	۲۰ درصد
متوسط میزان پروتئین	۳۹ درصد
وزن هزار دانه	۲۰۰-۲۲۰ گرم
گروه رسیدن	گروه ۵ دیررس
تعداد گره در ساقه	۱۸

سویا رقم «کتول» از ارقام وارداتی با نام اصلی D.PX. ۳۵۸۹ است که در سال ۱۳۷۸ وارد کشور شد. این رقم در آزمایش های منطقه ای استان گلستان از عملکرد و سازگاری مطلوبی برخوردار است و با میانگین ۳۳۳۳ کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم شاهد گرگان ۳- حدود ۷۵۰ کیلوگرم در هکتار برتری نشان داده است. رقم کتول دارای تحمل خوبی در مقابل بیماری ها به ویژه بیماری پوسیدگی زغالی و نماتد سیست سویا است. از ویژگی های این رقم، مقاومت به خوابیدگی بوته و ریزش دانه است. میانگین ارتفاع آن ۱۰۰ سانتی متر بوده و با توجه به تجمع غلاف ها در گره های انتهایی، برای برداشت مکانیزه مناسب است.



# کاسپین

رقم سویا مناسب کشت استان مازندران

سال معرفی: ۱۳۹۰

مناطق مناسب کشت: مناطق مختلف استان مازندران در شرایط دیم و آبیاری

به منظور معرفی ارقام جدید سویا با عملکرد زیاد و متتحمل به بیماری‌های مهم در استان مازندران، از ۱۳۷۱ طی یک برنامه دهساله به نزدیکی مبتنی بر دورگ‌گیری، لاین خالصی از جمعیت حاصل از تلاقی دو رقم تلار و هیل طی ارزیابی‌های مقدماتی و سازگاری با توجه به عملکرد زیاد و خصوصیات زراعی مطلوب گزینش شد و کاسپین نام گرفت. این رقم علاوه بر عملکرد زیاد در شرایط آبیاری و دیم، برای کشت متراکم و برداشت مکانیزه مناسب است. میانگین عملکرد این رقم در طی سال‌های آزمایش ۳۵۰۰ کیلوگرم در هکتار بود. میانگین وزن صد دانه این رقم ۱۸۰ گرم و نسبت به بیماری پوسیدگی زغالی تحمل قابل قبولی دارد. این رقم نسبت به شاهد درصد روغن بیشتری دارد و به ریزش دانه و خوابیدگی مقاوم است.

میانگین عملکرد دانه در هکتار ۳۵۰۰ کیلوگرم	
نیمه محدود	تیپ رشدی
۱۰۲ سانتی متر	متوسط ارتفاع بوته
۱۸۰ گرم	میانگین وزن صد دانه
۱۴۵ روز	طول دوره رشد
۴۸	تعداد غلاف در بوته
چندشاخه ایستاده	نوع شاخه‌بندی
۳۵ سانتی متر	ارتفاع اولین غلاف
متتحمل	تحمل به بیماری پوسیدگی زغالی
مقاوم	تحمل به ریزش دانه
مقاوم	تحمل به خوابیدگی



# سالند

## رقم سالند مناسب کشت در نواحی شمالی استان خوزستان

سال معرفی: ۱۳۹۱

مناطق مناسب کشت: نواحی شمالی استان خوزستان

رقم سالند حاصل گزینش لاین‌های برتر از نسل‌های در حال تفرق جمعیت داگاس × صفی‌آبادی است که در آزمایش‌های مقایسه عملکرد سویا در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول این رقم با متوسط عملکرد ۳۹۷۷ کیلوگرم در هکتار برتر در حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد نسبت به شاهد سیمیس با عملکرد ۲۹۷۸ کیلوگرم در هکتار نشان داده است. این رقم از حیث سایر صفات زراعی از جمله زودرسی و قابلیت برداشت مکانیزه نیز برتر از شاهد است. در شرایط زارعان نیز رقم سالند با عملکرد دانه ۲۳۳۵ کیلوگرم در هکتار برتر از شاهد (سیمیس) با عملکرد دانه ۱۸۵۶ کیلوگرم در هکتار بوده است.

میانگین عملکرد دانه	کیلوگرم در هکتار
میانگین وزن هزار دانه	۱۵۵ گرم
متوسط میزان روغن	۲۲ درصد
متوسط مقدار پروتئین	۳۸ درصد
تیپ رشدی	رشد نامحدود
رنگ گل	بنفش
رنگ کرک	طلایی
ارتفاع اولین غلاف	۱۵ سانتی متر
میانگین ارتفاع بوته	۷۵ سانتی متر



# سامان

## رقم سیماناب کشت استان گلستان

سال معرفی: ۱۳۹۲

مناطق مناسب کشت: مناطق مختلف استان گلستان

سویا یکی از مهم‌ترین گیاهان روغنی و پروتئینی به شمار می‌رود. استان گلستان با سطح کشت حدود ۶۰ هزار هکتار، مهم‌ترین منطقه کشت این گیاه در ایران است. رقم سامان حاصل برنامه دورگ‌گیری بین دو رقم ویلیامز (والد مادری) و اسکس (والد پدری) در سال ۱۳۷۹ و انتخاب بوته‌ها در سال‌های بعد از آن در بخش تحقیقات دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج) و استیگاه تحقیقات کشاورزی گرگان است. این رقم دارای عملکرد دانه زیاد، متحمل به بیماری‌های گیاهی، مقاوم به ریزش دانه و مناسب برای برداشت مکانیزه است. از خصوصیات ویژه این رقم، تولید گلهای جدید پس از ریزش گل و کاهش خسارت ناشی از عارضه اختلال در غلاف‌بندی است.

میانگین عملکرد دانه	کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته	۱۱۰ سانتی‌متر
رنگ گل	بنفش
رنگ کرک	قهوهای
تیپ رشد	نامحدود
شكل برگ	پهنهن
نوع شاخه بندی	چند شاخه
رنگ بذر	زرد
رنگ ناف بذر	سیاه
متوسط مقدار روغن دانه	۲۱/۸ درصد
متوسط مقدار پروتئین دانه	۳۸/۴ درصد
گروه رسیدن	۵



# کوثر

رقم سویا مناسب کشت را فلیم معتدل استان لرستان و مناطق مشابه

سال معرفی: ۱۳۹۴

## مناطق مناسب کشت: اقلیم معتدل استان لرستان و مناطق مشابه

استان لرستان از مناطق مهم کشت سویا در دهه ۶۰ بوده است که به دلیل شیوع بیماری بوته‌میری و فقدان رقم مناسب جایگاه خود را برای این گیاه زراعی از دست داده است. با هدف معرفی ارقام زودرس و متحمل به بیماری بوته‌میری فیتوفترایی پروژه مشترکی بین مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و سازمان انرژی اتمی از سال ۱۳۷۲ انجام شد که در آن بذر رقم کلارک تحت اشعة گاما قرار گرفت. بذور اشعه دیده در مزرعه کشت و پس از چهار نسل بررسی صفات مختلف زراعی جهش یافته، ۴۷ موتابت زودرس گزینش شد. موتابت‌های گزینش شده در آزمایش‌های مقدماتی و نهایی عملکرد در لرستان مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت موتابت M.7 با توجه به زودرسی ۱۵ روزه نسبت به رقم مادری، تحمل به کم‌آبی و مقاومت بالا به بیماری بوته‌میری فیتوفترایی انتخاب شد. این موتابت در سال ۱۳۹۴ توسط کمیته معرفی رقم به نام کوثر نام‌گذاری شد.

میانگین عملکرد دانه در هکتار	۳۳۰۰ کیلوگرم
میانگین وزن هزار دانه	۱۳۵ گرم
متوسط میزان روغن	۲۲ درصد
متوسط مقدار پروتئین	۳۷ درصد
تیپ رشدی	رشد نامحدود
واکنش به بیماری فیتوفترایی	مقاوم
واکنش به خوابیدگی	مقاوم
واکنش به ریزش دانه	مقاوم
میانگین ارتفاع بوته	۹۵ سانتی‌متر



# طلایه

## رقم کفرزای تیپ زمستان

سال معرفی: ۱۳۷۸

مناطق مناسب کشت: کشت پاییزه در تناوب با گندم در مناطق سرد و معتدل سرد کشور

رقم طلایه از طریق معرفی یک رقم زمستانه آلمانی به نام کبرا به دست آمده است. این رقم مناسب کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور است. بیشترین رکورد تولید این رقم به مقدار ۸۱۲۶ کیلوگرم در هکتار در سال ۱۳۸۳ در شهرستان اقلید از استان فارس بود. رقم طلایه دیررس، ولی پرمحصول است.

پتانسیل عملکرد	
متوسط عملکرد دانه	۸۱۲۶ کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته	۳۰۰۰_۴۰۰۰ کیلوگرم در هکتار
روز تا رسیدن فیزیولوژیکی	۱۶۸ سانتی متر
تیپ رشد	۲۳۱ روز
متوسط تعداد خورجین در ساقه اصلی	۵۹ عدد
وزن هزار دانه	۳_۴ گرم
مقدار روغن دانه	۴۰_۴۵ درصد
پایداری عملکرد	زیاد

# ساری گل

رقم کلزای تیپ بهاره

سال معرفی: ۱۳۷۹

مناطق مناسب کشت: اراضی شالیزار و مناطق گرم و نیمه گرم کشور

کلزا سومین منبع تأمین کننده روغن گیاهی پس از سویا و پالم در جهان است. رقم جدید ساری گل از طریق معرفی یک رقم آلمانی به نام PF7045/91 طی ۶ سال به دست آمد و مناسب کشت در شالیزارها و مناطق گرم و نیمه گرم کشور است. این رقم نسبت به شاهد حدود ۴۰۰ کیلوگرم عملکرد بیشتر تولید می‌کند. میانگین عملکرد روغن دانه آن  $\frac{39}{56}$  درصد است که حدود ۱۰ درصد بیشتر از رقم شاهد است. رقم ساری گل نسبت به شاهد پنج روز زود رس تر است، بنابراین می‌تواند از تنش‌های خشکی و گرمای آخر فصل فرار کند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که این رقم به ورس تحمل دارد و نسبت به بیماری اسکلروتینیابی ساقه نیز نسبت متحمل است. میانگین وزن هزار دانه آن  $\frac{3}{9}$  گرم و دارای پایداری عملکرد زیاد است.

میانگین عملکرد دانه	۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته	۱۵۱ سانتی‌متر
روز تا رسیدن فیزیولوژیکی	۱۷۵ روز
تیپ رشد	بهاره
متوسط تعداد خورجین در ساقه اصلی	۳۵ عدد
میانگین وزن هزار دانه	$\frac{3}{9}$ گرم
متوسط مقدار روغن دانه	$\frac{39}{56}$ درصد
واکنش به بیماری اسکلروتینیابی ساقه	نسبتاً متحمل
واکنش به ورس	تحمل
پایداری عملکرد	زیاد



# زرفام

رقم کودای تیپ میانگین

سال معرفی: ۱۳۸۴

مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد با زمستان ملایم

رقم زرفام از طریق تلاقي رقم ریجنت با رقم کبرا و به روش شجره‌ای اصلاح شده و مناسب کشت در مناطق معتدل سرد کشور است. میانگین عملکرد دانه رقم زرفام در آزمایش‌ها، ۳۷۵۰ کیلوگرم در هکتار بود. این رقم نسبت به شاهد حدود ۵۰۰ کیلوگرم عملکرد بیشتر تولید می‌کند. میانگین وزن هزار دانه آن  $\frac{4}{5}$  گرم و میانگین عملکرد روغن دانه آن حدود ۴۱ درصد است که ۱۲ درصد بیشتر از رقم شاهد و به طور میانگین ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است. رقم زرفام نسبت به ورس تحمل دارد و نسبت به بیماری اسکلروتوئینیایی ساقه نیز نسبتاً متتحمل است. این رقم نسبت به سرما متتحمل و دارای پایداری عملکرد زیادی است.

۳۵۰۰-۴۰۰۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه
۱۵۰-۱۷۰ سانتی متر	ارتفاع بوته
۲۳۰-۲۴۰ روز	روز تا رسیدن فیزیولوژیکی
بیناییان	تیپ رشد
۴-۵ گرم	وزن هزار دانه
۴۰-۴۲ درصد	میزان روغن دانه
۶۸	درصد اولشیک
۱۴۰۰-۱۶۰۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد روغن
نسبتاً متتحمل	واکنش به بیماری اسکلروتوئینیایی ساقه
متتحمل	واکنش به سرما
بالا	پایداری عملکرد



# ظرف

## رقم گذاری میپباره

سال معرفی: ۱۳۹۱

**مناطق مناسب کشت:** به صورت کشت اول در تناب و با گندم در مناطق میانبند استان مازندران و اقلیم‌های مشابه

کشت کلزا در مناطق میانبند استان مازندران به علت نبود تنوع رقم و همچنین برخورد با تنش خشکی و آفات انتهای فصل با محدودیت روبه روست. میانگین عملکرد این رقم ۲۷۵۰ کیلوگرم در هکتار و میانگین وزن هزار دانه آن ۴ گرم می‌باشد. در این راستا رقم ظرف ضمن برخورداری از سازگاری در منطقه، به علت زودرسی می‌تواند از خسارت انتهای فصل ناشی از عوامل ذکر شده بکاهد و به علت برخورداری از اجزای عملکرد بیشتر در نهایت حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد عملکرد بیشتری داشته باشد. میانگین مقدار روغن آن ۴۱ درصد است و تحمل متوسطی در برابر بیماری اسکلروتینیا دارد.

تعداد روز تا رسیدگی	روز ۲۱۰-۲۲۰
ارتفاع بوته	۱۴۵-۱۵۵ سانتی‌متر
وزن هزار دانه	۳/۷-۴/۲ گرم
عملکرد	۲۵۰۰-۳۰۰۰ کیلوگرم در هکتار
درصد میزان روغن	۳۹-۴۳
درصد اسید اروسیک	۰/۰۴
مقدار گلوكوزینولات کنجاله	۷ میکرومول بر گرم
تحمل به بیماری اسکلروتینیا	متوسط



# دلگان

رقم کلزای تپ بهاره و مناسب کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۹۳

مناطق مناسب کشت: سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر

رقم دلگان از نوع آزادگرده افshan بوده و از طریق روش شجرهای طی ۱۱ سال اصلاح و معروفی شده است. این رقم مناسب کشت در مناطق گرم و خشک کشور است. در آزمایش ها، این رقم دارای عملکردی حدود ۲۹۵۰ کیلوگرم در هکتار بود و نسبت به شاهد حدود ۴۵۰ کیلوگرم افزایش عملکرد داشت. متوسط عملکرد روغن دانه در هکتار ۱۱۵۳ کیلوگرم بوده که حدود ۱۵ درصد بیشتر از رقم شاهد است. از نظر زمان رسیدن رقم دلگان نسبت به شاهد یک هفته زودرس تر است و بنابراین می تواند از تنفس های خشکی و گرمای آخر فصل فرار کند. این رقم نسبت به خوابیدگی متتحمل و در برابر بیماری اسکلروتینیایی ساقه نسبتاً متتحمل است.

میانگین عملکرد دانه	۲۹۴۲ کیلوگرم در هکتار
تیپ رشد	بهاره
نوع رقم	آزادگرده افshan
متوسط تعداد روز تا رسیدگی	۱۴۸ روز
میانگین وزن هزار دانه	۳/۷۷ گرم
متوسط عملکرد روغن	۱۱۵۳ کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته	۱۳۳ سانتی متر
مقدار گلوكوزينولات کنجاله	کمتر از ۴ ( $\mu\text{mol/gr}$ )
مقدار اسید اولنیک	۶۶/۶۷ درصد
مقدار اسید لیتولنیک	۸/۳۸ درصد
واکنش به بیماری اسکلروتینیای	نسبتاً متتحمل
واکنش به خوابیدگی	متتحمل
تاریخ کاشت مناسب	آبان ماه



# احمدی

## رقم که زای تیپ زستاز و مناسب کشت در مناطق سرد و معتدل سرکشور

سال معرفی: ۱۳۹۳

مناطق مناسب کشت: مناطق سرد و معتدل سرد کشور

افزایش تنوع رقم و در نتیجه افزایش پایداری کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور سبب افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد شد. بهمنظور تولید ارقام پرمحصول کلزا، از سال ۱۳۷۹ تلاقي بین دو رقم خارجی Geronimo و SW۰۷۵۶ و انتخاب نتایج مطلوب از جمعیت F۲ حاصل در کرج آغاز شد. گرینش لاین های برتر در نسل های در حال تنقییک از طریق روش شجره ای منجر به حصول سه لاین کلزا از جمله لاین KS۱۱ شد. سازگاری و همچنین برتری عملکرد لاین KS۱۱ در مقایسه با شاهد (Okapi) طی مطالعات تکمیلی تأیید شد و احمدی نام گرفت. این رقم به بیماری ساق سیاه یا فوما نیمه حساس است. رقم احمدی دارای میانگین عملکرد ۳۴۶۰ کیلوگرم در هکتار بوده و نسبت به شاهد به میزان ۴۸۲ کیلوگرم در هکتار برتری دارد. از سایر ویژگی های این رقم می توان به حدود ۱۵ درصد عملکرد روغن دانه نسبت به شاهد، تحمل بیشتر به تنفس خشکی انتهای فصل و تنفس سرمایی و امکان کشت با تأخیر اشاره کرد.

میانگین عملکرد دانه	۳۴۶۰ کیلوگرم در هکتار
پایداری عملکرد	زیاد
میانگین وزن هزار دانه	۳/۸ گرم
متوسط مقدار روغن	۴۴/۹ درصد
متوسط عملکرد روغن	۱۵۵۴ کیلوگرم در هکتار
تعداد روز تا رسیدگی	۲۶۶ روز
میانگین ارتفاع گیاه	۱۲۸ سانتی متر
تحمل به سرما	بیشتر از شاهد
تحمل به بیماری فوما	نیمه حساس
تحمل به بیماری پوسیدگی ساقه	حساس



# گلدشت

## رقم گلرنگ بازارگاری وسیع و مناسب کشت در قیم های کرم و معتدل سرد کشور

سال معرفی: بهار ۱۳۸۷

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم (خوزستان، جیرفت، ایرانشهر، بوشهر) و مناطق معتدل سرد (استان های تهران، فارس، کرمانشاه، خراسان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کردستان، مرکزی)

گلرنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. گلرنگ به عنوان یک گیاه روغنی مقاوم به خشکی قابلیت کشت در مناطق خشک کشور را دارد. رقم گلدشت حاصل انتخاب تک بوته از توده محلی گلرنگ آذربایجان شرقی با استفاده از روش سلکسیون لاین های خالص است. تأکید بر زودرسی، تعداد و اندازه غوزه و نبود خار اوّلین گام در راه اصلاح این رقم با انتخاب تک بوته از توده محلی مذکور بوده است. علائمی از بیماری های مهم گلرنگ نظیر لکه برگی، سفیدیک سطحی و بوته میری در مزارع تحقیقاتی و ازدیادی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و ایستگاه های تابع و مزارع زارعان کشور مشاهده نشده است. از مهم ترین ویژگی های ممتاز این لاین صفت زودرسی آن (۲۵-۵۰ روز زودرس تر از رقم شاهد محلی اصفهان) است که رهاسازی سریع تر زمین زراعی و کشت سایر محصولات زراعی را امکان پذیر می کند.

میانگین عملکرد دانه	۱۷۰۰ کیلوگرم در هکتار
میانگین عملکرد گل	۱۵۰ کیلوگرم در هکتار
بهاره متتحمل به سرما	تیپ رشد
فرمز	رنگ گل
بی خار	وضعیت خار
۸۰-۱۰۰ سانتی متر	ارتفاع بوته
مقاآم	وضعیت ریزش
۳۵-۴۰ گرم	وزن هزار دانه
۳۰-۲۵ درصد	مقدار روغن



## صفه

### رقم گمناب بازارگاری و سعی و مناسب کشت دار قلیم سردکشی

سال معرفی: زمستان ۱۳۸۸

مناطق مناسب کشت: مناطق معتمد سرد استان های تهران، فارس، کرمانشاه، خراسان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کردستان، مرکزی

گلنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. جمع آوری توده های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنتیکی های مطلوب از اولین قدم های اساسی برای ایجاد ارقام اصلاح شده و پر محصول گلنگ است. گلنگ به عنوان نوعی گیاه روغنی مقاوم به خشکی قابلیت کشت در مناطق خشک کشور را دارد. رقم جدید صفه حاصل انتخاب تک بوته از توده محلی گلنگ اصفهان است که با استفاده از روش گرینش لاین های خالص و تأکید بر یکنواختی رنگ قرمز گلچه ها، تعداد و اندازه روغزه، نبود خار، زودرسی، درشتی غوزه ها، جمع بودن شاخه های اصلی و فرعی و ارتفاع مناسب بوته برای برداشت مکانیزه تولید شده است.

بهاره	تیپ رشد
یکنواخت (قرمز)	رنگ گل
یکنواخت	نحوه رسیدگی
تدام زیاد	نحوه گلدهی
۱/۳ بالای بوته	نحوه تشكیل شاخه های فرعی
۳۰ درصد	متوسط مقدار روغن دانه
۳۰۸۳ کیلوگرم در هکتار	متوسط عملکرد دانه در کشت بهاره *
۱۹۱۵ کیلوگرم در هکتار	متوسط عملکرد دانه در کشت تابستانه *
۱۵۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار	متوسط عملکرد گل خشک



\* در مزارع تحقیقی - ترویجی

# گل مهر


رقم گلرنگ بازارگاری وسیع و مناسب کشت در قیم های سرد و معتدل سرده کشور

سال معرفی: ۱۳۹۲

مناطق مناسب کشت: مناطق سرد و معتدل سرد (فارس، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کردستان، مرکزی، کرمان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و اصفهان)

پاییزه متحمل به سرما	تیپ رشد
قرمز	رنگ گل
بی خار	وضعیت خار
۱۳۰-۱۵۰ سانتی متر	ارتفاع بوته
۲۷-۳۰ گرم	وزن هزار دانه
۲۵-۲۷ درصد	مقدار روغن دانه
۲۷۰۰-۲۹۰۰ کیلوگرم در هکتار	متوسط عملکرد دانه
۱۲۰-۱۵۰ کیلوگرم در هکتار	متوسط عملکرد گلچه

گیاه روغنی گلرنگ بومی ایران است. گلرنگ به دلیل داشتن گلچه های رنگین همواره مورد توجه کشاورزان ایرانی بوده است. رقم جدید گل مهر حاصل انتخاب از نسل های در حال Zarghan ۲۷۹ تلقی تکیک I.L.۱۱۱ (زرقان ۲۷۹) است. این رقم از پایداری عمومی خیلی خوب در تمام محیط ها و عملکرد زیاد برخوردار است. نداشتن خار و وجود گلچه های رنگی از صفات بارز این رقم جدید است.



## مدیده

### پ

# رقم گلرنگ تخلی به سرما مناسب کشت پاییزه و مناطق سرد و معتدل سرد کشور

سال معرفی: ۱۳۹۳

مناطق مناسب کشت: مناطق سرد و معتدل سرد کشور

پاییزه متحمل به سرما	تیپ رشد
نارنجی	رنگ گل
۱۵۰-۱۷۰ سانتی متر	ارتفاع
۳۰-۳۵ گرم	وزن هزار دانه
۲۷-۲۹ درصد	میزان روغن دانه
۲۲۰۰-۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه

گلرنگ از گیاهان روغنی بومی ایران است. جمع آوری توده‌های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنتیپ‌های مطلوب از اولین قدم‌های اساسی در اصلاح گیاه روغنی گلرنگ به شمار می‌آید. رقم پدیده حاصل انتخاب تک بوته از توده محلی گلرنگ ارومیه با استفاده از روش سلکسیون لاین‌های خالص است. این رقم دارای تیپ رشد پاییزه و عملکرد بسیار زیادی است و در حال حاضر یکی از ارقام برتر گلرنگ زمستانه به شمار می‌رود.



## مختصر

### رقم پایه سینگل کراس آفتاگردان مناسب کشت اول دمناطق مرکزی و شمالی ایران

سال معرفی: ۱۳۶۶

**مناطق مناسب کشت:** استان‌های گلستان، مازندران، سمنان، اصفهان، قم، فارس و استان مرکزی

در ایران از سال ۱۳۴۸ مقدمات کار برای تولید هیبریدهای آفتاگردان در بخش تحقیقات دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر فراهم شد و لاین‌های بازگردانده باروری برای نخستین بار در سال ۱۳۵۲ به ایران وارد شد و مورد استفاده قرار گرفت هیبرید مهر یکی از نخستین هیبریدهای سینگل کراس ایرانی است که توسط بهنزادگران در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال ۱۳۶۶ معرفی شد. این هیبرید از طریق تلاقی لاین برگشت‌دهنده باروری CMS<sub>۶۰/۵۲</sub> با لاین مادری R<sub>۴۳</sub> حاصل شده است. والد پدری این هیبرید از مواد ژنتیکی واردشده توسط محققان یوگسلاوه و والد مادری آن از مواد ژنتیکی استخراج شده از جوامع آزاد گردهافشان برای کشت در مناطق گلستان، مازندران، سمنان، اصفهان، قم، فارس و استان مرکزی تهیه شده است.

ارتفاع بوته ۱۷۰-۱۸۰ سانتی‌متر	نوع شاخه‌بندی
تک‌شاخه	نوع شاخه‌بندی
وزن هزار دانه ۷۰-۷۵ گرم	وزن هزار دانه
متیو سطح میزان روغن ۴۵ درصد	متیو سطح میزان روغن
عملکرد دانه ۳۰۰۰-۳۵۰۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه
طول دوره رویش ۱۱۵ تا ۱۲۰ روز	طول دوره رویش
واکنش به بیماری پلاسموپارا مقاوم	واکنش به بیماری پلاسموپارا
واکنش به کم آبی تحمل نسبی	واکنش به کم آبی



# شقق

رقم پیشید سینگل کراس آفتابگردان مناسب برای کشت اول در مناطق مرکزی و شمالی ایران

سال معرفی: ۱۳۶۶

مناطق مناسب کشت: استان های فارس، اردبیل، مازندران، آذربایجان و زنجان

تولید هیبریدهای آفتابگردان یکی از عواملی است که می تواند سبب رونق کشت و افزایش عملکرد آن شود. با این رویکرد از سال ۱۳۴۸ تولید هیبریدهای آفتابگردان در بخش تحقیقات دانه های روغنی مؤسسه نهال و بذر آغاز شد. هیبرید شرق یکی از نخستین هیبریدهای کراس ایرانی است که توسط بهنژادگران در مؤسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال ۱۳۶۶ معرفی شد. این هیبرید از طریق تلاقی لاین برگشت دهنده باروری R<sub>28</sub> با لاین مادری CMS ۲۶ حاصل شده است. این هیبرید برای کشت در استان های فارس اردبیل، مازندران، آذربایجان، زنجان مناسب است.

میانگین عملکرد دانه این رقم ۲۷۵۰ کیلوگرم در هکتار است. این رقم نسبت به بیماری پلاسموپارا مقاوم و نسبت به کم آبی نسبتاً متتحمل است. متوسط مقدار روغن آن در آزمایش های انجام شده ۴۶ درصد و میانگین وزن هزار دانه آن ۶۵ گرم است.

ارتفاع بوته ۱۵۵-۱۶۵ سانتی متر	ارتفاع بوته
تک شاخه	نوع شاخه بندی
۶۰-۷۰	وزن هزار دانه
۴۶ درصد	متوسط مقدار روغن
۳۰۰۰-۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه
۱۱۰ روز	طول دوره رویش
مقاوم	واکنش به بیماری پلاسموپارا
نسبتاً متتحمل	واکنش به کم آبی



# آذرگل

رقه هیبرید سلسله آفریکرداں مناسب کشت اول در مناطق مرکزی، سرد و معتدل سرد

سال معرفی: ۱۳۷۳

مناطق مناسب کشت: مناطق مرکزی و شمالی کشور در رژیم‌های کشت اول

آفتابگردان یومی مناطق آمریکای مرکزی است، با اینحال به دلیل قابلیت سازگاری با دامنه وسیعی از شرایط اقلیمی، در بسیاری از مناطق کشور ما نیز جایگاه خوبی پیدا کرده است. کشت و کار آفتابگردان در ایران تا قبل از معرفی هیبریدها، متنی بر کشت ارقام آزاد گرددافشان بود. والد پدری این هیبرید (R43) از مواد ژنتیکی وارد شده توسط محققان یوگسلاوی در دهه ۶۰ به دست آمد و والد مادری آن (CMS ۱۹) از مواد ژنتیکی استخراجی از جوامع آزاد گرددافشان در همان دوره زمانی و توسط محققان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در مراغه تهیه شد. این هیبرید دارای عملکرد بسیار زیادی است. از آنجا که مراحل انتخاب لایه‌های والدینی این هیبرید در شرایط دیم انجام شده است، هیبرید آذرگل دارای تحمل نسبی به شرایط کم‌آبی است.

۱۷۰ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
تک شاخه	نوع شاخه‌بندی
۷۵ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۴۹ درصد	متوسط مقدار روغن
۳۷۰۰۰ - ۴۰۰۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه
۱۱۰ تا ۱۰۰ روز	طول دوره رویش
مقاوم	واکنش به بیماری سفیدک کرکی
تحمل نسبی	واکنش به کم‌آبی



# گلدیس

رقم پیرید سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اول در مناطق مرکزی و سرد و معتدل سرد

سال معرفی: ۱۳۷۳

مناطق مناسب کشت: استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان و مرکزی

اهمیت هیبریدهای آفتابگردان به دلیل خصوصیات مطلوب از جمله یکنواختی و عملکرد زیاد برای کشت در حال افزایش است. همسو با دیگر مناطق دنیا تهیه هیبریدهای آفتابگردان در ایران نیز از اولویت برخوردار بوده و از سال ۱۳۴۸ مقدمات کار برای تهیه هیبریدهای آفتابگردان فراهم شده است. هیبرید گلدنیس، نسل دوم هیبریدهای ایرانی است که در سال ۱۳۷۳ از طریق تلاقی لاین پدری CMS<sup>۱۹</sup> با لاین مادری R<sup>۲۸</sup> توسط بهنزادگران ایرانی برای کشت در مناطق آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان و مرکزی حاصل و معروفی شد. میانگین عملکرد دانه این رقم ۳۴۰ کیلوگرم در هکتار است. این رقم نسبت به بیماری پلاسموپارا مقاوم است و نسبت به کم‌آبی تحمل نسبی دارد. متوسط مقدار روغن آن براساس آزمایش‌های انجام شده ۴۶ درصد و میانگین وزن هزار دانه آن ۶۰ گرم است.

۱۵۵-۱۶۵ سانتی‌متر	ارتفاع بوته
تک شاخه	نوع شاخه‌بندی
۵۵-۶۵ گرم	وزن هزار دانه
۴۶ درصد	متوسط مقدار روغن
۳۶۰۰-۳۲۵۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه
۱۰۰ روز تا ۱۱۰	طول دوره رویش
مقاوم	واکنش به بیماری پلاسموپارا
تحمل نسبی	واکنش به کم‌آبی



# گشید

## رقم پیرید سلسله کراس آفتابگردان مناسب کشت اول در مناطق مرکزی، سرد و معتدل سرد

سال معرفی: ۱۳۷۳

مناطق مناسب کشت: استان های آذربایجان شرقی و غربی، سمنان، فارس و مرکزی

هیبریدهای آفتابگردان به علت یکنواختی، قابلیت مکانیزه شدن، مقاومت به بیماری ها و دارا بودن عملکرد زیاد در اکثر نقاط دنیا بر ارقام آزاد گرده افغان ترجیح داده می شوند. در ایران نیز تهیه هیبریدهای آفتابگردان از اولویت برخوردار است و در این راستا هیبرید گلشید به عنوان نسل دوم هیبریدهای آفتابگردان به همراه دو هیبرید آذرگل و گلدیس در سال ۱۳۷۳ توسط محققان بخش تحقیقات دانه های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برای کشت در مناطق آذربایجان شرقی و غربی، سمنان، فارس و مرکزی معروفی شد. این هیبرید از طریق تلاقی لاین بازگردان باروری R<sub>43</sub> و لاین نر عقیم سیتوپلاسمی CMS<sub>31</sub> حاصل شده است. میانگین عملکرد دانه این رقم ۳۶۵۰ کیلوگرم در هکتار است. این رقم نسبت به بیماری پلاسموپارا مقاوم و در برابر کم آبی نسبتاً متتحمل است. متوسط مقدار روغن آن در طی آزمایش های انجام شده ۴۴/۷ درصد و میانگین وزن هزار دانه آن ۷۲/۵ گرم است.

۱۶۰-۱۷۰ سانتی متر	ارتفاع بوته
تک شاخه	نوع شاخه بندی
۶۷-۷۸ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۴۴/۷ درصد	متوسط مقدار روغن
۳۵۰۰-۳۸۰۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه
۹۵ تا ۱۰۵ روز	طول دوره روش
مقاوم	واکنش به بیماری پلاسموپارا
تحمل نسبی	واکنش به کم آبی



# فرخ

رقم های مبتدی سلسله کراس زودرس آفتابگردان

سال معرفی: زمستان ۱۳۸۸

**مناطق مناسب کشت:** کشت اول در مناطق سرد معتمد آذربایجان غربی و شرقی، زنجان و کرمانشاه و کشت دوم بعد از برداشت غلات در استان های مرکزی کشور و برخی مناطق دیم استان گلستان و مازندران

آفتابگردان یکی از گیاهان روغنی است که زراعت آن در کشت دوم بعد از برداشت غلات در حال گسترش است. اغلب هیبریدهای موجود، دیررسی و پابلند هستند. از دیررسی هیبریدهای داخلی و برخی هیبریدهای خارجی به عنوان مانع برای گسترش سطح کشت این گیاه زراعی یاد می شود. عملکرد هیبرید فرخ با عملکرد هیبرید مشابه وارداتی رایج به عنوان زودرس ترین رقم هیبرید آفتابگردان قابل رقابت است. آزمایش های انجام شده در شرایط دیم و کشت دوم، قابلیت جایگزینی این رقم با هیبریدهای مشابه را تأیید کرده است. این هیبرید علاوه بر برخورداری از سازگاری و مقاومت به بیماری سفیدک داخلی، از نظر ارتفاع به مراتب کوتاهتر از هیبرید آذرگل و حدود ۱۵-۲۰ روز زودرس تر از آن است و از این حیث، قابلیت رقابت با ارقام هیبرید وارداتی را دارد. تحمل این رقم نسبت به کم آبی، امکان توسعه کشت آن را در مناطق مواجه با محدودیت آبی، امکان پذیر می سازد.



طول دوره رویش	۹۰-۱۰۰ روز
ارتفاع بوته	۱۵۵-۱۶۵ سانتی متر
وزن هزار دانه	۵۵-۶۵ گرم
عملکرد دانه	۴۵۰۰-۳۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
متوسط مقدار روغن	۴۸-۴۶ درصد
واکنش به بیماری سفیدک کرکی	مقاوم
واکنش به تنش خشکی	متحمل

# برزگر

## رقم پریم آفتابگردان مناسب کشت در مناطق مختلف کشور

سال معرفی: ۱۳۹۱

**مناطق مناسب کشت:** کشت اول در مناطق معتدل کرمانشاه، آذربایجان، خراسان، همدان و زنجان، کشت دوم در تمام مناطق از جمله استان مرکزی، فارس، اصفهان، گلستان و مازندران

هیبرید برزگر به همراه هیبرید آذرگل در بسیاری از مناطق کشور در کشت اول (پس از رفع سرمای کمتر از ۱۵ درجه سانتی گراد) همچنین کشت دوم (پس از برداشت جو و گندم) کشت می شود. تراکم مناسب این رقم ۶۶۰۰۰-۸۵۰۰۰ بوته در هکتار است. این هیبرید با دارا بودن ویژگی هایی از جمله زودرسی نسبی و عملکرد بیشتر نسبت به آذرگل، مقاومت به بیماری سفیدک کرکی و زنگ نژادهای ایرانی و درصد روغن بالا از جمله هیبریدهای برتر به حساب می آید. هیبرید برزگر در آزمایش های مقایسه ای در سطح زارع ان پیشرو نتایج مطلوبی داشته است. این رقم به دلیل سازگاری با مناطق مختلف کشت آفتابگردان در ایران و برخورداری از ویژگی های مقاومت به بیماری های محدود کننده سفیدک کرکی و زنگ، جایگزین خوبی برای هیبریدهای خارجی محسوب می شود.

سینگل کراس	نوع هیبرید
۹۵-۱۰۰ روز	طول دوره رشد
۱۶۰-۱۸۰ سانتی متر	ارتفاع بوته
۶۵ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۴۷/۹۹ درصد	میانگین مقدار روغن
متتحمل	واکنش به تنفس آبی
۱۰۰ مقاوم به نژاد	واکنش به سفیدک کرکی
۳۰۰ مقاوم به دو نژاد ۳۰۲ و	واکنش به زنگ ها
۳۴۵۷ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه



# قاسم

رقم پرید سینگل کراس آفتابگردان با عکس در زیاد

سال معرفی: زمستان ۱۳۹۱

مناطق مناسب کشت: کشت اول در تمام مناطق کشور و در کشت دوم مناطق گرم و معتدل

سینگل کراس	نوع هیبرید
۳۲۵۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه
۹۰-۸۷ روز	دوره رسیدن فیزیولوژیک
۱۵۰-۱۳۰ سانتی متر	ارتفاع بوته
مقاوم	واکنش به بیماری سفیدک کرکی نژاد ۱۰۰
مقاوم به نژاد ۳۰۲ جدایه خوی	واکنش به بیماری زنگ
۵۵ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۴۹-۴۷ درصد	مقدار روغن
بسیار متحمل	واکنش به تنفس کم آبی

هیبرید قاسم دارای عملکرد دانه مطلوب، دوره رویش کوتاه، ارتفاع کوتاه، شاخص برداشت به نسبت کم، ساختار شکلی مطلوب، طبق ایستاده و بزرگ، درصد روغن زیاد، مقاوم به بیماری‌های محدود کننده به ویژه زنگ و سفیدک کرکی است. از همه مهم‌تر اینکه نسبت به تنفس کم آبی متوسط و حتی شدید، متحمل شناخته شده است. هیبرید قاسم به دلیل ارتفاع کوتاه و خمش کم ساقه، برای برداشت مکانیزه بسیار مناسب و قادر به رقابت با هیبریدهای خارجی است.



# کیتا

## رقم کنجد مناسب کشت در مناطق معتدل نیمه شمالی کشور

سال معرفی: ۱۳۷۸

مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل نیمه شمالی کشور

کنجد از جمله گیاهان بومی کشور و احتمالاً قدیمی ترین گیاه روغنی کشت شده توسط بشر است. زراعت کنجد از دیرباز در کشورمان رایج بوده و توده های بومی متعددی از این گیاه پدید آمده است. برای اصلاح و معرفی ارقام مناسب و سازگار با شرایط گرم نیمه شمالی کشور با دورگ گیری و انتخاب تک بوته از توده های دورگ ضمن استفاده از روش تهیه لاین خالص از توده های دورگ نسل های در حال تفکیک آغاز شد. تک بوته های انتخابی بر اساس اهداف اصلاحی ارزیابی شدند و پس از طی مراحل مقدماتی و نهایی، رقم یکتا به عنوان زراعت کشور معرفی شد. پر محصولی، سازگاری با اقلیم گرم نیمه شمالی کشور، تحمل به خوابیدگی و رنگ روشن بذر از ویژگی های برجسته این لاین به شمار می آید.

ارتفاع بوته	۱۴۰-۱۷۰ سانتی متر
نوع شاخه بندی	تک شاخه
رنگ دانه	سفید - کرم
میانگین وزن هزار دانه	۲/۹ - ۲/۶ گرم
مقدار روغن	۵۷-۵۴ درصد
عملکرد دانه	۱۱۰۰-۸۰۰ کیلو گرم در هکتار
تعداد گل در محور	سه
مقاومت به ریزش	ندارد
مقاومت به خوابیدگی	دارد



# اولتان

رقم کنجد مناسب کشت در مناطق معتدل نیمه شمالی کشور

سال معرفی: ۱۳۷۸

مناطق مناسب کشت: مناطق نیمه شمالی کشور

زراعت کنجد از دیرباز در کشورمان رایج بوده و مناسب با شرایط اقلیمی، توده‌های بومی متعددی از این گیاه پدید آمده است. برای اصلاح و معرفی ارقام کشور با استفاده از تنوع موجود در توده‌های بومی مبادرت به انتخاب تک بوته از توده بومی کنجد معان شد. تک بوته‌های انتخابی براساس اهداف اصلاحی ارزیابی شدند و پس از طی مراحل مقدماتی و نهایی، رقم اولتان به عرصه زراعت کشور معرفی شد. پرمحصولی، سازگاری با اقلیم گرم نیمه شمالی کشور، تحمل به خوابیدگی و تحمل نسبی به شرایط کم‌آبی در نیمه شمالی کشور از ویژگی‌های برجسته این لاین به شمار می‌آید.

ارتفاع بوقه	۱۴۰-۱۷۰ سانتی متر
نوع شاخه‌بندی	چندشاخه
رنگ دانه	قهوه‌ای
میانگین وزن هزار دانه	۲/۹-۳/۴ گرم
مقدار روغن	۵۴-۵۶ درصد
عملکرد دانه	۹۰۰-۱۲۵۰ کیلوگرم در هکتار
تعداد گل در محور	یک
مقاومت به ریزش	ندارد
واکنش به خشکی	متتحمل
واکنش به خوابیدگی	متتحمل



# دشتستان ۲

## رقم بجنب مناسب کشت در مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۸۵

**مناطق مناسب کشت:** مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور شامل جنوب استان بوشهر، مناطقی از استان های فارس (داراب)، خوزستان (دزفول)، سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) و هرمزگان ( حاجی آباد)

کنجد کم توقع ترین و سازگارترین محصول کشاورزی استان بوشهر به شمار می رود. کشت و استفاده از بذر کنجد در این استان سابقه ای طولانی دارد و کشت دوم بعد از برداشت گندم محسوب می شود. بذر مورد کاشت در استان توده محلی است، از این رو به منظور دستیاری به افزایش عملکرد، یکنواختی، زودرسی و سایر صفات مطلوب زراعی سلکسیون از داخل توده محلی دشتستان انجام گرفت. کنجد رقم دشتستان ۲ از طریق گزینش لاین خالص (pure line selection) از توده محلی کنجد دشتستان به دست آمد. برای این منظور، در پاییز سال ۱۳۶۹ تعدادی تکبوته از مزارع کنجد استان انتخاب شد. بذر هر تکبوته جداگانه برداشت شد و پس از آزمایش های مقدماتی، پیشرفتنه و تحقیقی ترویجی در مناطق مختلف استان رقمی تولید شد که از نظر عملکرد دانه، تحمل به بیماری بوته میری و گل سبز نسبت به توده محلی برتری دارد. این رقم با نام دشتستان ۲ و برای کشت در استان بوشهر و مناطق گرم کنجد خیز کشور معرفی شد.

ارتفاع بوته ۱۴۲-۱۴۵ سانتی متر	ارتفاع بوته
چندشاخه	نوع شاخه بندی
قهوه ای روش	رنگ دانه
۴ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۵۷ درصد	متوسط مقدار روغن
۲۳۶۳ کیلوگرم در هکtar	عملکرد دانه
یک	تعداد گل در محور
نسبت <sup>*</sup> متحمل	مقاومت به بوته میری
نسبت <sup>*</sup> متحمل	واکنش به کم آبی
۱۰۰-۱۱۰ روز	طول دوره رشد
۴۵-۴۸	متوسط تعداد کپسول در ساقه اصلی
۱۴۰-۱۸۰	متوسط تعداد کپسول در بوته



# داراب

رقم کنجد مناسب کشت در نیزه جنوبی کشور

سال معرفی: ۱۳۸۸

مناطق مناسب کشت: مناطق نیمه جنوبی کشور شامل استان های فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمان

کنجد از گیاهان روغنی بومی ایران است که زراعت آن از دیرباز در استان های جنوبی کشور متداوّل بوده است. کنجد به عنوان گیاه روغنی متحمل به شرایط خشکی و کم آبی از قابلیت کشت در مناطق کم آب کشور برخوردار است و می تواند به عنوان زراعت دوم بعد از برداشت غلات نیز استفاده شود. رقم جدید داراب ۱ با استفاده از روش انتخاب لاین خالص از توده محلی کنجد داراب به دست آمد. در سال ۱۳۶۹ با در نظر داشتن صفات پر محصولی، مقاومت به بوته میری و زودرسی نسبی از توده های بومی مناطق مختلف استان فارس انتخاب تک بوته صورت گرفت. با توجه به برتری این رقم به ویژه از لحاظ عملکرد دانه، مقاومت به بیماری بوته میری و نیز زودرسی نسبی در مقایسه با رقم شاهد در سال زراعی ۱۳۸۲-۸۳ در مناطق مختلف نیمه جنوبی کشور از نظر عملکرد و سازگاری مورد ارزیابی تکمیلی قرار گرفت و برتری آن تأیید و با نام داراب ۱ به عرصه زراعت کشور معرفی شد. پر محصولی، تحمل به بیماری های بوته میری و گل سبز و نیز زودرسی نسبی در مقایسه با رقم شاهد از ویژگی های ممتاز این رقم به شمار می آید.



۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۱۱۰-۱۲۰ روز	طول دوره رویش
یک	تعداد گل در محور
۱۶۰-۱۹۰	متosط تعداد کپسول در بوته
۱۱۵-۱۳۰ سانتی متر	ارتفاع بوته
۳-۴/۳ گرم	وزن هزار دانه
۵۲ درصد	متosط مقدار روغن دانه
قهقهه ای روشن	رنگ دانه
چندشاخه	نوع شاخه بندی
چهار	تعداد ردیف در کپسول
متتحمل	تحمل به بیماری

# حلیل

## رقم کجمناسب کشت در مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: ۱۳۹۲

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم جنوب کشور شامل جنوب استان کرمان، مناطقی از استان های فارس (داراب)، خوزستان (دزفول)، سیستان و بلوچستان (ایرانشهر و زابل) و هرمزگان ( حاجی آباد)

کنجد از جمله محصولاتی است که از قرن ها پیش در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر کشت می شده است و به دلیل مقاومت به خشکی و گرما، اهمیت بسیار زیادی در توسعه پایدار کشاورزی این مناطق به عنوان کشت تابستانه دارد. تلاش برای اصلاح و معرفی ارقام مناسب و سازگار با شرایط گرم جنوب کشور و جنوب استان کرمان با استفاده از روش انتخاب لاین خالص از توده های محلی کنجد جیرفت با انتخاب تک بوته در سال ۱۳۷۷ شروع شد. تک بوته های انتخابی براساس اهداف اصلاحی ارزیابی شدند و پس از طی مراحل مقدماتی، آزمایش مقایسه عملکرد نهایی به مدت دو سال در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ انجام گرفت و بین لاین های بررسی شده، لاین ۱۳-JL در بررسی تحقیقی - ترویجی به عنوان لاین برتر تعیین و با نام «هلهلی» به عرصه زراعت کشور معرفی شد. پر محصولی، سازگاری مناسب به اقلیم گرم کشور، تحمل نسبی بیماری پژمردگی فوزاریومی، تحمل نسبی تنفس خشکی و ریزش دانه کمتر نسبت به رقم رایج محلی از ویژگی های بر جسته این رقم است.

بلند، ۱۷۵ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
چندشاخه	نوع شاخه بندی
قهقهه ای	رنگ دانه
۳/۴ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۵۴ درصد	متوسط مقدار روغن
۱۵۲۰ کیلو گرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
یک	تعداد گل در محور
نسبتاً متحمل	واکنش به پژمردگی فوزاریومی
نسبتاً متحمل	واکنش به کم آبی



# سینگل کراس ۷۰۴

رقم ذات مبید سینگل کراس دیررس، مناسب کشت در مناطق کرد میزو و سرد سیر کشور

سال معرفی: ۱۳۵۹

مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور (در استان های سردسیر برای تولید علوفه و در استان های معتدل و گرم سیر به صورت دومنظوره قابل بهره برداری است)

ذرت سینگل کراس ۷۰۴ از نظر گروه رسیدن جزء ارقام دیررس است. میانگین وزن هزار دانه آن ۳۵۰ گرم است. میانگین عملکرد دانه این رقم ۸ تن در هکتار است و در اکثر استان های کشور قابل کشت است. در استان های سردسیر برای تولید علوفه و در استان های معتدل و گرم سیر به صورت دو منظوره (دانه ای و علوفه ای) قابل بهره برداری است. این رقم برای تغذیه انسان، خوراک دام و طیور، و نیز در صنعت استفاده می شود.

داده ای اسپی	تیپ دانه
۸۰۰۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۱۶ ردیف	متوسط تعداد ردیف دانه در بلال
۲۲ سانتی متر	متوسط طول بلال
۴۸ میلی متر	متوسط قطر بلال
۶۷ روز	متوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی
۱۲۵-۱۳۵ روز	زمان سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی
۶۵-۷۲ هزار بوته در هکتار	تراکم مطلوب در مزرعه
۳۵۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۳۰۰ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
مقاومت نسبی	واکنش به فوزاریوم
مقاومت نسبی	واکنش به سیاهک



# دابل کراس ۳۷۰

رقم ذرت مبین دابل کراس زودرس، مناسب کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تاریخی

سال معرفی: ۱۳۹۵

مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل و معتمد سرد کشور، مانند استان فارس (شیراز و مرودشت)، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اول در مناطق بسیار سرد کشور

ذرت دابل کراس ۳۷۰ از نظر گروه رسیدن جزء ارقام زودرس است. این رقم از ارقام ذرت دانه ای است که برای تولید دانه از آن استفاده می شود. شکل بلال استوانه ای و تیپ دانه آن دندان اسبی است. این رقم در اکثر استان های کشور قابل کشت و بهره برداری است.

دندان اسبی	تیپ دانه
۲۷۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۶ ردیف	تعداد ردیف دانه در بلال
۱۶ سانتی متر	متوجه طول بلال
۴۴ میلی متر	متوجه قطر بلال
۶۰ روز	متوجه تعداد روز تا ظهور گل تاجی
۹۵-۱۰۵ روز	زمان سیز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی



# سینگل کراس ۳۰۱

رقم ذات مبید سینگل کراس زودرس، مناسب کشت در مناطق معتدل، معتدل سرد و بیار سو

سال معرفی: ۱۳۶۸

مناطق مناسب کشت: به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت‌های تأخیری در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس (شیزار و مرودشت)، استان‌های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اول در مناطق بسیار سرد کشور

ذرت سینگل کراس ۳۰۱ ۳۰ از نظر گروه رسیدن جزء ارقام زودرس است. میانگین عملکرد دانه این رقم ۵ تن در هکتار است و به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت‌های تأخیری در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس (شیزار و مرودشت)، استان‌های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اول در مناطق بسیار سرد کشور قابل کشت و استفاده است.

دندان اسبی	تیپ دانه
۵۰۰۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۲۸۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۶ ردیف	تعداد ردیف دانه در بلال
مخروطی، استوانه‌ای	شكل بلال
مقاومت نسبی	واکنش به فوزاریوم
۵۶ روز	متوسط تعداد روز تا ظهرور گل تاجی
روز تا رسیدن فیزیولوژیکی ۸۵-۹۵ روز	
۸۵ هزار بوته در هکتار	تراکم مطلوب در مزرعه
مقاومت نسبی	واکنش به سیاهک
۲۹۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته



# سینگل کراس ۶۰۴ (زرین)

رقم ذسته مبید سینگل کراس موتورس، مناسب کشت در مناطق معتدل، معدل سرد و بیار سرو

سال معرفی: ۱۳۶۸

مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور؛ به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تأخیری در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس (شیراز و مرودشت)، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اول در مناطق بسیار سرد کشور

ذرت سینگل کراس ۶۰۴ از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متوسط ریس است. میانگین عملکرد دانه این رقم ۷ تن در هکتار بوده و برای کشت اول در اکثر استان های کشور مناسب است. به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تأخیری در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس (شیراز و مرودشت)، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه کاربرد دارد.

دندان اسپی	تیپ دانه
۴۰ تن در هکتار	میانگین عملکرد علوفه
۷۰۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۱۶-۱۸ ردیف	تعداد ردیف دانه در بلال
زرد	رنگ دانه
۳۲۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۲۵ روز	متوسط طول دوره رشد
۱۸-۲۱ کیلوگرم در هکتار	مقدار مصرف بدرا
۷۰ هزار بوته	تراکم مطلوب در مزرعه
۲۹۵ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
حساس	واکنش به شوری
حساس	واکنش به خشکی
مقاومت نسبی	واکنش به بیماری لکه برگی
مقاومت نسبی	واکنش به پوسیدگی بلال
مقاومت نسبی	واکنش به سیاهک



# سینگل کراس ۷۱۱

رقم ذات مبید سینگل کراس دیرس، مناسب کشت در مناطق گرمسیر و سردسیر کشور

سال معرفی: ۱۳۶۸

مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور (در استان های سردسیر برای تولید علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دو منظوره دانه و علوفه قابل بهره برداری است)

ذرت سینگل کراس ۷۱۱ از نظر گروه رسیدن جزء ارقام دیررس است. میانگین عملکرد دانه این رقم ۸ تن در هکتار است. شکل بلال مخروطی و تیپ دانه آن سخت است. این رقم مناسب کشت در اکثر استان های کشور است و در استان های سردسیر برای تولید علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دو منظوره (دانه و علوفه) قابل کشت و بهره برداری است.

سخت	تیپ دانه
۸۰۰۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
قرمز روشن	رنگ چوب بلال
۱۸ ردیف	تعداد ردیف دانه در بلال
مخروطی	شکل بلال
زرد متمایل به نارنجی	رنگ دانه
۶۷ روز	متوسط تعداد روز تا ظهر گل تاجی
۱۲۵-۱۳۵ روز	روز تا رسیدن فیزیولوژیکی
۶۵-۷۰ هزار بوته در هکتار	تراکم مطلوب در مزرعه
۳۵۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه



# سینگل کراس ۶۴۷

رقم ذاتی مبید سینگل کراس متواترس، مناسب کشت در اکثر استان های کشور

سال معرفی: ۱۳۷۷

مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور (در استان های سردسیر برای تولید علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر به منظور تولید دانه و علوفه)

ذرت سینگل کراس ۶۴۷ از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متواترس است. میانگین عملکرد دانه این رقم ۸ تن در هکتار است. شکل بلال مخروطی - استوانه ای و تیپ دانه آن دندان اسبی است. این رقم مناسب کشت در اکثر استان های کشور است و در استان های سردسیر برای تولید علوفه و در استان های معتدل و گرمسیر به صورت دو منظوره (دانه و علوفه) قابل کشت و بهره برداری است.

دندان اسبی	تیپ دانه
۲۰ سانتی متر	متوسط طول بلال
۵۲ سانتی متر	متوسط قطر بلال
۱۸-۲۰ ردیف	تعداد ردیف دانه در بلال
مخروطی، استوانه ای	شکل بلال
۶۳ روز	متوسط تعداد روز تا ظهر گل تاجی
۱۱۵-۱۲۵ روز	تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی
۷۵ هزار بوته در هکتار	تراکم مطلوب در مزرعه
۳۲۵ گرم	متوسط وزن هزار دانه
مقاومت نسبی	واکنش به فوزاریوم
مقاومت نسبی	واکنش به سیاهک



# سینگل کراس ۶۰۰

رقم ذات مبید سینگل کراس متوازن و مناسب برای تولید پاپ کورن

سال معرفی: ۱۳۷۸

مناطق مناسب کشت: اکثر استان‌های کشور

ذرت سینگل کراس ۶۰۰ از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متواترس است. این رقم از ارقام ذرت آجیلی است که برای تولید پاپ کورن از آن استفاده می‌شود. شکل بلال مخروطی و تیپ دانه آن سخت است. این رقم که در اکثر استان‌های کشور قابل کشت و بهره‌برداری است، به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال مقاومت نسبی دارد.

سخت	تیپ دانه
۱۸۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۶ ردیف	تعداد ردیف دانه در بلال
۲۰ سانتی‌متر	متواتس طول بلال
۳۵ میلی‌متر	متواتس قطر بلال
۶۰ روز	متواتس تعداد روز تا ظهرور گل تاجی
۱۱۵-۱۲۵ روز	زمان سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی



# سینگل کراس ۳۰۲

رقم ذات پرید سینگل کراس زودرس، مناسب کشت دوم بعد از برداشت کندم و کشت های تاخری

سال معرفی: ۱۳۸۲

مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس (شیراز و مرودشت)، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اول در مناطق بسیار سرد کشور

دندان اسبی	تیپ دانه
۲۷۴ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۸ ردیف	تعداد ردیف دانه در بلال
۲۰ سانتی متر	متوسط طول بلال
۳۵ میلی متر	متوسط قطر بلال
۶۰ روز	متوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی
۱۱۵-۱۲۰ روز	زمان سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی

ذرت سینگل کراس ۳۰۲ از نظر گروه رسیدن جزء ارقام زودرس است. این رقم از ارقام ذرت دانه ای است که برای تولید دانه از آن استفاده می شود. شکل بلال استوانه ای و تیپ دانه آن دندان اسبی است. این رقم در اکثر استان های کشور قابل کشت و بهره برداری بوده و به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال و سیاهک مقاومت نسبی دارد.



# سینگل کراس ۵۰۰

رقم ذات پیرید سینگل کراس متوسطرس، مناسب برای تولید و زراعة

سال معرفی: ۱۳۸۳

مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور

ذرت سینگل کراس ۵۰۰ از نظر گروه رسیدن جزء ارقام متوسطرس است. شجره این رقم  $R59 \times OH43$  است و با روش بلال به ردیف حاصل شده است. شکل بلال مخروطی و تیپ دانه دندان اسبي است. در بررسی واکنش این رقم به بیماری های سیاهک و پوسیدگی فوزاریومی بلال با آلوگی مصنوعی، شدت آلوگی کمتر از شاهد بود. از نظر عملکرد دانه، نسبت به شاهد برتری دارد و در اکثر استان های کشور قابل کشت و بهره برداری است.

دندان اسبي	تیپ دانه
۲۹۲/۸۳ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۱۸ ردیف	تعداد ردیف دانه در بلال
۲۰ سانتی متر	متوسط طول بلال
۳۵ میلی متر	متوسط قطر بلال
۶۰ روز	متوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی
۱۲۰-۱۳۰ روز	زمان سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی



# فهرس سیمین کراس (۲۶۰)

رقم پیریدزودس ذت دادای، مناسب کشت دوم در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور

سال معرفی: ۱۳۸۷

**مناطق مناسب کشت:** به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس (شیراز و مرودشت)، استان های اصفهان، خراسان و کرمانشاه

رقمی که معمولاً به منظور کشت ذرت در کشور در حال حاضر استفاده می شود، هیبرید دیررس KSC ۷۰۴ است. استفاده از ارقام دیررس در کشت دوم در مناطق معتدل (بعد از برداشت گندم) به دلیل محدودیت فصل، قبل از مرحله گلدهی یا قبل از پرشدن دانه با سرما یا بارندگی های پاییزه مواجه می شود و یا به منظور جلوگیری از تأخیر در کشت محصولات پاییزه با رطوبت بالا برداشت می شوند که سبب کاهش کمی و کیفی محصول و در نهایت کاهش هکتولیتر می شود. هیبرید فجر برای کشت دوم (بعد از برداشت گندم و جو) معروفی شد. زودرس تر بودن نسبت به ارقام متوسطرس و دیررس رایج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، جلوگیری از تأخیر در کشت های پاییزه و عملکرد مناسب از مهم ترین ویژگی های این رقم است.

میانگین عملکرد ۱۰-۱۱ تن در هکتار	
۲۰۶ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
۲۸۰ فائو با دوره رشد و نمو ۱۱۵-۱۰۵ روز	گروه رسیدن
دندان اسپی	فرم دانه
زرد	رنگ دانه
قرمز	رنگ چوب بلال
۲۹۰ گرم	میانگین وزن هزار دانه
نیمه مقاوم	واکنش به فوزاریوم
حساس	واکنش به سیاهک معمولی



# دهقان (سینگل کراس ۴۰۰)

رقم پرید متوسط زودرس ذرت دارای، مناسب کشت دوم و مناطق معتدل و معتدل سرد کشور و کشت های تأخیری

سال معرفی: ۱۳۸۷

**مناطق مناسب کشت:** به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تأخیری در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس (شیزار و مرودشت)، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اول در مناطق سرد کشور

عملکرد	میانگین	۱۰-۱۱ تن در هکتار
گروه	میانگین ارتفاع بوته	۲۰۸ سانتی متر
رسیدن	گروه فراخ با دوره رشد و نمو ۱۱۵-۱۲۰ روز	متوسطرس - زودرس از گروه ۴۰۰
فرم دانه	رنگ دانه	دندان اسپی
بلال	رنگ چوب	زرد
دانه	زنگ هزار	وزن هزار گرم ۲۸۰/۶۰
فوفازاریوم	واکنش به فوهریوم	متحمل
سیاهک	واکنش به مقاوم	مقابله

یکی از مشکلات کشت دوم ذرت در کشور کمبود هیبرید مناسب در گروه متوسط رس - زودرس و زودرس است که علاوه بر نداشتن مشکلات ارقام دیررس در کشت دوم، بتواند از افت کمی و کیفی عملکرد دانه جلوگیری کند. رقم متوسط - زودرس هیبرید سینگل کراس دهقان (KSC ۴۰۰) به عنوان کشت دوم و همچنین کشت های تأخیری معرفی شد. زودرس تر بودن رقم دهقان نسبت به ارقام متوسطرس و دیررس رایج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، جلوگیری از تأخیر در کشت های پاییزه، عملکرد مناسب و مقاومت نسبت به بیماری سیاهک معمولی از ویژگی های این رقم است.



# کارون ۷۰۱

رقم ذات پیرید سینگل کراس با علکرد دانه بالا، تمحل به تنش خشکی و مناسب کشت در مناطق گرمسیری کشور

سال معرفی: ۱۳۹۰

مناطق مناسب کشت: مناطق گرمسیر کشور شامل جنوب استان کرمانشاه، جنوب استان لرستان، جنوب استان فارس، استان های کرمان، خوزستان و ایلام

یکی از محدودیت های کنونی توسعه کشت ذرت در مناطق گرمسیر، نیاز آبی نسبتاً زیاد آن است. هیبرید کارون ۷۰۱ با خصوصیات مورفولوژیک مطلوب، نسبت به تنش دانه گرده بیشتر، و عدم کاهش عملکرد در تنش های متوسط، نسبت به تنش خشکی نسبتاً متحمل است. هم اکنون ۱۵-۱۷ نوبت آبیاری برای رقم شاهد انجام می شود، در حالی که کاهش ۳-۴ نوبت آبیاری در مورد این رقم امکان پذیر است. عملکرد دانه این هیبرید در شرایط تنش خشکی ۱۵۰۰-۲۰۰۰ و در شرایط بدون تنش ۱۰۰۰ کیلوگرم بیشتر از هیبرید شاهد (SC۷۰۴) بود. دوره رشد آن از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک دانه ۷-۱۰ روز کوتاه تر از رقم شاهد است. پتانسیل تولید بذر هیبرید این رقم ۳۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است، در حالی که میزان بذر بوجاری شده رقم شاهد در مناطق گرمسیر به دلیل حساسیت لاین مادری آن به تنش گرما حداقل ۱۵۰۰ کیلوگرم است. عملکرد دانه این هیبرید در شرایط تنش خشکی ۲۰۰۰-۱۵۰۰ (۲۰ درصد) و در شرایط بدون تنش ۱۰۰۰ (۱۰ درصد) عملکرد در واحد سطح از رقم شاهد بالاتر است.

میانگین عملکرد (در شرایط بدون تنش)	۹۰۰۰ کیلوگرم در هکتار (در شرایط بدون تنش)
میانگین ارتفاع بوته سانتی متر	۱۹۰
تعداد روز از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک	۱۱۳-۱۱۵
میانگین درصد پروتئین	۱۱/۷
تعداد ردیف دانه در بلال	۱۵
میانگین وزن هزار دانه	۳۷۴ گرم
واکنش به تنش خشکی	متحمل
واکنش به سیاهک معمولی	مقاوم



# مبین

رقم ذات پهید سیگل کرس موتورس، بالکنکرو دانز زیاد، محل به تشن کرما، و مناسب کشت در مناطق گرمسیری کثور

سال معرفی: ۱۳۹۰

مناطق مناسب کشت: مناطق گرمسیری کشور شامل جنوب استان کرمانشاه، جنوب استان لرستان، جنوب استان فارس، استان کرمان، استان خوزستان و استان ایلام

ذرت هیبرید مبین ۱۲ روز زودرس تر از رقم شاهد (SC704) است و به لحاظ عملکرد دانه، اختلاف معنی داری با رقم شاهد ندارد. زودرسی و تحمل نسبی به تنش گرما از دیگر ویژگی های مهم این هیبرید است که کشت دوم آن را امکان پذیر می کند. این هیبرید با دارا بودن حجم دانه گرده بالاتر از رقم SC704 فاصله بسیار کوتاه ظهرور اندام های زایشی، دانه گرده بیشتر، و تحمل نسبی به تنش گرما به منظور کشت در مناطق گرمسیری اهمیت زیادی دارد. ارتفاع کوتاه تر بلال از سطح زمین، ارتفاع کوتاه تر کل بوته و قطر بیشتر ساقه موجب تحمل بیشتر این هیبرید به ورس است. دیگر ویژگی مورفولوژیک این رقم، داشتن ریشه های هوایی قوی و فعل از نظر ارتباط و اتصال به خاک است که احتمالاً یکی دیگر از دلایل تحمل این رقم به ورس است. عملکرد این رقم در شرایط معمول در سطح رقم شاهد و در شرایط تنش گرما ۲۰ درصد بالاتر از آن است.



ظهور لایه سیاه که نشان دهنده رسیدگی فیزیولوژیک این رقم زودتر از رقم شاهد (بلال سمت راست) می باشد.

میانگین عملکرد	۸۰۴۰ کیلوگرم در هکتار
میانگین ارتفاع بوته	۱۶۹ سانتی متر
دوره رشد سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی	۱۱۲ روز
تعداد ردیف دانه	۱۶
رنگ دانه	زرد
میانگین وزن هزار دانه	۳۶۱ گرم
مقاوم	واکنش به فوزاریوم
محتمل	واکنش به تنش گرما
مقاوم	واکنش به سیاهک

# کرج ۷۰۵

رقم پیوید سینگل کراس ذات مناسب کشت در مناطق ذات کاری

سال معرفی: ۱۳۹۱

**مناطق مناسب کشت:** مناطق معتدل فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی، لرستان، اصفهان و همچنین کشت دوم در شمال خوزستان و جیرفت و کهنه‌ج

دندان اسپی	تیپ دانه
۳۰۹ گرم	وزن هزار دانه
۴۲	تعداد دانه در ردیف بلال
۱۵/۶	تعداد ردیف دانه در بلال
۱۹۱ سانتی متر	ارتفاع بوته
۱۰۶ سانتی متر	ارتفاع تا بلال
۲۰/۹۴ (شاهد: ۲۳/۲۵)	میانگین رطوبت دانه در زمان برداشت
۱۲۶۱۷ کیلوگرم در هکtar	میانگین عملکرد دانه
نیمه مقاوم	واکنش به سیاهک عمومی ذات
نیمه مقاوم	واکنش به پوسیدگی فوزاریومی بلال
در مزارع تحقیقی ترویجی	۷۰۵ در مزارع تحقیقی ترویجی

ارقام دیررس ذات بیش از ۹۰ درصد اراضی ذات کاری کشور را در کشت اول و کشت تابستانه پوشش می‌دهند. این امر به ویژه در کشت‌های تأخیری و کشت دوم موجب برداشت محصول با رطوبت زیاد و کیفیت پایین می‌شود. علاوه بر این در کشت محصول بعدی که معمولاً گندم و کلزا است نیز تأخیر پیش می‌آید. هیبرید سینگل کراس ۷۰۵ با سرعت بیشتر کاهش رطوبت دانه بعد از رسیدن در مقایسه با هیبرید ۷۰۴، امکان برداشت حدود یک هفته زودتر را فراهم می‌کند. این ویژگی سبب برداشت با رطوبت مناسب می‌شود و امکان کشت به موقع محصول بعدی را فراهم می‌کند.



# کرج ۷۰۶

پیرید سلسله کراس ذرت مناسب کشت دشت اول تا خیزی و کشت دوم مناطق ذرت کاری کشور

سال معرفی: ۱۳۹۱

مناطق مناسب کشت: کشت دوم در شمال خوزستان، جیرفت و کهنوج، ارزوئیه کرمان و مغان، کشت اول در کرمانشاه، فارس و اصفهان

دندان اسبی	تیپ دانه
۱۲۲۸۰ کیلوگرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه
۳۷/۵۹	تعداد دانه در ردیف بلال
۱۴/۶	تعداد ردیف دانه در بلال
۱۷۶/۷ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
۸۹/۵ سانتی متر	ارتفاع تا بلال
۴/۲۴ (شاهد: ۲۵/۹)	میانگین رطوبت دانه (زمان برداشت*)
۳۹۳/۲ گرم	میانگین وزن هزار دانه
نیمه مقاوم	واکنش به سیاهک معمولی ذرت
مقاوم	واکنش به پوسیدگی فوزاریومی

ارقام دیررس ذرت به ویژه رقم ۹۰ سینگل کراس ۷۰۴، بیش از ۹۰ درصد اراضی ذرت کاری کشور را در کشت اول و کشت تابستانه پوشش می‌دهند. این مسئله موجب افزایش ریسک تولید ذرت کشور می‌شود و ضرورت افزایش تعداد ارقام با گروه رسیدن مشابه به منظور افزایش تنوع هیبریدها و همچنین تضمین پایداری تولید ذرت را نشان می‌دهد. هیبرید جدید کرج ۷۰۶ به طور متوسط حدود ۱۱/۵۹۷ تن در هکتار افزایش عملکرد نسبت به هیبرید ۷۰۴ ۷ نشان داده است. این هیبرید می‌تواند در کنار رقم ۷۰۴ در مناطق مختلف کشت شود.

\* در مزارع تحقیقی ترویجی



# کرج ۷۰۳

## پریورید سینگل کراس ذرت مناسب کشت در مناطق ذرت کاری کشور

سال معرفی: ۱۳۹۱

**مناطق مناسب کشت:** مناطق معتدل کرمانشاه، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، لرستان، مازندران، مغان و همچنین کشت دوم در شمال خوزستان، ایلام، ازوئیه کرمان، جیرفت و کهنوج

دندان اسبی	تیپ دانه
۳۱۳ گرم	میانگین وزن هزار دانه
۳۹	تعداد دانه در ردیف بلال
۱۶	تعداد ردیف دانه در بلال
۱۹۸ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
۱۰۰ سانتی متر	ارتفاع تا بلال
٪ ۲۲/۲ (شاهد) ٪ ۲۴/۶	میانگین رطوبت دانه (زمان برداشت*)
۱۴۰۹۹ کیلو گرم در هکتار	میانگین عملکرد دانه در مزارع تحقیقی - ترویجی
نیمه حساس	واکنش به سیاهک معمولی ذرت
نیمه مقاوم	واکنش به پوسیدگی فوژاریومی

ارقام دیررس ذرت حدود ۹۰ درصد اراضی ذرت کاری کشور را در کشت اول و کشت تابستانه پوشش می دهند. این امر به ویژه در کشت های تأخیری و کشت دوم موجب برداشت محصول بار طوبت زیاد و کیفیت پایین می شود. علاوه بر این، کشت محصول بعدی که عمولاً گندم و کلزا است نیز با تأخیر مواجه می شود. هبیرید سینگل کراس ۷۰۳ با سرعت بیشتر کاهش رطوبت دانه بعد از رسیدن در مقایسه با هبیرید ۷۰۴، امکان برداشت حدود یک هفته زودتر را فراهم می کند. این ویژگی سبب برداشت با رطوبت مناسب می شود و کشت بهموعن محصول بعدی را امکان پذیر می کند.



# پگاه

## رقم سورگوم علوفه‌ای نیمه‌دیررس، مناسب کشت در مناطق معتدل، گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: ۱۳۶۳

مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل، گرم، و گرم و خشک

سورگوم رقم پگاه دارای تیپ علوفه‌ای است و برای مصارف سیلولی، تولید علوفه تازه، چرای مستقیم و تولید علوفه خشک استفاده می‌شود. سورگوم پگاه دارای دو چین است و میانگین عملکرد علوفه تر آن  $150 - 130$  تن در هکتار و میانگین عملکرد علوفه خشک آن  $23/5 - 30$  تن در هکتار است. سورگوم علوفه‌ای رقم پگاه نیمه‌دیررس است و به علت داشتن قند زیاد، برای تولید شربت نیز کاربرد دارد.

تک‌ساقه	تیپ بوته
۲۱۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
۱۲۰ روز	طول دوره رویش
۱۲۸/۳۸ تن در هکتار	میانگین عملکرد علوفه تر
۲۳/۵۲ تن در هکتار	میانگین عملکرد علوفه خشک
۳۰ سانتی‌متر	متوسط طول خوش
۱۸ گرم	میانگین وزن هزار دانه
تحمل نسبی	واکنش نسبت به خشکی
تحمل نسبی	واکنش نسبت به شوری
مقاوم	واکنش به خوابیدگی
قهقهه‌ای	رنگ دانه



# اسید فد

رقم سورگوم علوفه‌ای زودرس، مناسب چرای مستقیم، علوفه‌تازه و علوفه‌خشک

سال معرفی: ۱۳۷۲

مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل، گرم، گرم و مرطوب، گرم و خشک

سورگوم اسپید فید (Speed feed) یکی از اراقام هیبرید سورگوم است که از هیبریداسیون سورگوم با سودانگراس تولید شده است. سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید گیاهی زودرس با تیپ علفی برای مصرف دام به صورت چرای مستقیم، علوفه‌تازه و علوفه‌خشک و سیلولی است.

ایستاده با پنجه فرارون	تیپ بوته
۲۱۵ سانتی متر	میانگین ارتفاع بوته
۱۲۰ روز	طول دوره رویش
۹۰-۱۳۰ تن در هکتار	میانگین عملکرد علوفه تر
۱۷-۲۱ تن در هکتار	میانگین عملکرد علوفه خشک
۳۰ سانتی متر	متوجه طول خوش
۱۸ گرم	میانگین وزن هزار دانه
تحمل نسبی	واکنش نسبت به خشکی
تحمل نسبی	واکنش نسبت به شوری



# سام پیم

رقم سورگوم دانه‌ای زودرس، مناسب کشت در مناطق سرد، معتدل، گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: ۱۳۷۶

مناطق مناسب کشت: مناطق سرد، معتدل، گرم، گرم و خشک

سورگوم دانه‌ای رقیم پیام از ارقام زودرس سورگوم محسوب می‌شود. این رقم پاکوتاه بوده و میانگین ارتفاع بوته آن حدود ۵۲۱ سانتی‌متر است. رنگ دانه این رقم نارنجی مایل به قهوه‌ای است.

پاکوتاه	تیپ بوته
۱۲۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
مکانیزه	برداشت
متoscet عملکرد دانه ۶۰۰۰_۸۰۰۰ کیلوگرم در هکتار	متoscet عملکرد دانه
۱۲۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
۲۴ سانتی‌متر	متoscet طول خوش
۳۲ گرم	میانگین وزن هزار دانه
تحمل نسبی	واکنش نسبت به خشکی
تحمل نسبی	واکنش نسبت به شوری
کاملاً مقاوم	واکنش به خوابیدگی
۹۰ روز	طول دوره رویش



## سدهه

رقم سورگوم دانه‌ای متواترس، مناسب کشت در مناطق گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: ۱۳۷۶

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم، و گرم و خشک

سورگوم دانه‌ای رقم سپیده از ارقام متوسط‌ترین سورگوم محسوب می‌شود. این رقم پاکوتاه بوده و میانگین ارتفاع بوته آن حدود ۱۲۵ سانتی‌متر است. رقم سپیده دارای پایداری عملکرد است و برای تغذیه انسان، خوارک دام و طیور، و نیز در صنعت نشاسته‌سازی کاربرد دارد. مقدار کم تانن این رقم از ویژگی‌های بازآن به شمار می‌رود که از حد مجاز نیز کمتر است.

تک‌ساقه	تیپ بوته
۱۲۵ سانتی‌متر	میانگین ارتفاع بوته
۱۲۰ روزه	طول دوره رویش
۷۰۰۰-۱۰۰۰۰ کیلوگرم در هکتار	عملکرد دانه
۲۴ سانتی‌متر	طول خوش
۳۳/۵ گرم	میانگین وزن هزار دانه
تحمل نسبی	واکنش به خشکی
تحمل نسبی	واکنش به شوری
کاملاً مقاوم	واکنش به خوابیدگی
سفید	رنگ دانه



# کسما

رقم سورگوم دانای متوسطرس، مناسب‌کشتن مناطق گرم و گرم و خشک

سال معرفی: ۱۳۷۶

مناطق مناسب کشت: مناطق گرم، و گرم و خشک

سورگوم دانه‌ای رقم کیمیا از ارقام متوسطرس سورگوم است. رقم کیمیا پاکوتاه بوده و میانگین ارتفاع بوته آن حدود ۱۱۵ سانتی‌متر است. این رقم علاوه بر داشتن میانگین عملکرد بالا، پایداری عملکرد نیز دارد. از این رقم سورگوم به عنوان خوراک دام و طیور و همچنین در صنایع مالت و نشاسته‌سازی استفاده می‌شود.

میانگین ارتفاع بوته ۱۱۵ سانتی‌متر	سورگوم دانای متوسطرس
طول دوره رویش ۱۲۰ روز	
متوسط عملکرد دانه ۷۵۰۰ - ۹۰۰۰ کیلوگرم در هکتار	
طول خوش ۲۹ سانتی‌متر	
میانگین وزن هزار دانه ۳۶/۵ گرم	
واکنش نسبت به خشکی تحمل نسبی	
واکنش نسبت به شوری تحمل نسبی	
کاملاً مقاوم واکنش به خوابیدگی	
نارنجی	رنگ دانه



## انتخاب رقم ...



**جاوید (سوهین رقم ملی)**

نکوه	شکل نده
ستاخی	عمق چشم نده
کرم	ریخت بیوت
زرد	گرم باقی به زرد
زرد	ریخت گوشت
پیان دس	زودرس
پا بلند	پا بلند
ارتخان	ارتخان
بلور	ریخت گل
زیگ-گل	بلور
PVA	سبت به قبروس های
PVY	متکوت به بیماری و آفت
PVY	سبت به قبروس های
PVY	متکوت به بیماری و آفت



**خاوران (دوهین رقم ملی)**

نکوه	شکل نده
ستاخی	عمق چشم نده
زیگ	ریخت بیوت
زرد	زرد
زیگ-گوشت	ریخت گوشت
زیادرس	زودرس
پا بلند	پا بلند
ارتخان	ارتخان
بیضی	بیضی
ریخت گل	ریخت گل
PVA	سبت به قبروس های
PVY	متکوت به بیماری و آفت
PVY	سبت به قبروس های
PVY	متکوت به بیماری و آفت



**ساوان (اولین رقم ملی)**

شکل نده	گرد
ستاخی	ستاخی
زیگ	زیگ
زرد	زرد
زودرس	زودرس
پا بلند	ارتخان
بیضی	بیضی
ریخت گل	ریخت گل
PVA	سبت به قبروس های
PVY	متکوت به بیماری و آفت
PVY	سبت به قبروس های
PVY	متکوت به بیماری و آفت
PVX	حساس تا بیماری حساس

## انتخاب رقم ...



**(Agria) آگریا**

نکوه	شکل نده
ستاخی	عمق چشم نده
کرم	ریخت بیوت
زرد پر ریخت	ریخت گوشت
زودرس	زودرس
متکوت	ارتخان
بیضی	ریخت گل
آبی	ریخت قادمه جوانه نوری
متکوت به قبروس پیچیده	متکوت به اسکب معمولی و بودری
حساس به بیماری و آفت	ریخت قادمه جوانه نوری



**(Accord) آکورد**

نکله نده	کمی تخم مرغی
ستاخی	ستاخی
کرم	کرم
ریخت گوشت	ریخت گوشت
زودرس	زودرس
متکوت	متکوت
بیضی	بیضی
کرم	پا بلند
پا بلند	ارتخان
متکوت به بیماری و آفت	متکوت به اسکب معمولی و بودری
صورتی	ریخت قادمه جوانه نوری

## انتخاب رقم ...



آمبو (Ambo)

نکل شده	نکل شده
عمق چشم شده	عمق چشم شده
دارای تکه های قرمز	رنگ پوست
کرم	رنگ کوشت
سبیتا فیوروس	زودرسی
متوسط نابلد	ازتفاع
سپید	رنگ کل
خوب	ملاموت به مشکن
بدش	رنک فائدہ جو اند نوری
متکوم به فایتوکواری شاخصار و نده	
و حساس به نماند	
ملاموت به بیماری و آفت	
حسام به نماند	



آلمراء (Almera)

نکل شده	نکل شده
عمق چشم شده	عطفی چشم شده
رنگ پوست	رنگ پوست
کرم	رنک گوشت
سبیتا فیوروس	زدد روشن
متوسط نابلد	نیتازودرس
سپید	رنک گل
خوب	بنش با تک قرمز
بدش	صورتی
متکوم به فایتوکواری شاخصار و نده	
و حساس به نماند	
ملاموت به بیماری و آفت	
حسام به نماند	
ملاموت به پیماری و آفت	
فایتوکواری اشاخ و برگ	
حسام به سپید ک پودری و	
فایتوکواری اشاخ و برگ	

## انتخاب رقم ...



باراکا (Baraka)

نکل شده	نکل شده
عطفی چشم شده	عطفی چشم شده
سبید نابلد	رنگ پوست
سپید نا زرد	رنک گوشت
کرم نا زرد روشن	زدد روشن
سبیتا فیوروس	زودرسی
متوسط نابلد	رنگ کل
سپید	ازتفاع
خوب	بدش
بدش	صورتی
متکوم به بلاست و سبیتا	
ملاموت به بیماری و آفت	
حسام به نواب و بیروس - سبیتا	
حسام به آفت	
ملاموت به بالایت	
حسام به اسک	



ارنووا (Arnova)

نکل شده	نکل شده
عطفی چشم شده	عطفی چشم شده
سبید نابلد	رنگ پوست
سپید نا زرد	رنک گوشت
کرم نا زرد روشن	زدد روشن
سبیتا فیوروس	زودرسی
متوسط نابلد	رنک گل
سپید	ازتفاع
خوب	بدش
بدش	صورتی
متکوم به بلاست و سبیتا	
ملاموت به بیماری و آفت	
حسام به نواب و بیروس - سبیتا	
حسام به آفت	
ملاموت به بالایت	
حسام به اسک	

## انتخاب رقم ...



**(Burren) بورن**

نامه عرضی کشیده	شکل شده
ستنسی	عملی پشم شده
کرم	زنک پوست
زرد روشن	زنک گوشت
سبیا دبورس	زودرسی
سلید	زنک گل
خوب	پتاسیل اینبارداری
پندت	زنک قانده جوانه نوری

حساں به نهاد سبزی

مقاومت به بیماری و آفت



**(Bambino) بامبینو**

شکل شده	کمی تخم مرغی
عملی چشم شده	سلطنجی تا متوسط
زنک پوست	سلبد
کرم	زنک گوشت
زودرسی	دبورس
ارقانع	متوسط
-	-
زنک گل	بی رنک
زنک قانده جوانه نوری	متراوم به اسکب بودری
مقاومت به بیماری و آفت	مقاومت به بیماری و آفت

## انتخاب رقم ...



**(Record) رکورد**

نامه عرضی	شکل شده
منوسته	عملی پشم شده
کرم	زنک پوست
زرد روشن	زنک گوشت
دبورس	زودرسی
متوسط	ارقانع
سلید	زنک گل

حساں به سال سیاه

مقاومت به بیماری و آفت

آفت



**(Caesar) کايزر**

شکل شده	نامه عرضی کشیده
عملی چشم شده	سلطنجی تا خیلی سلطنجی
زنک پوست	کرم
زنک گوشت	زرد روشن
زودرسی	دبورس
سلبد	سلبد
زنک گل	ارقانع
متراوم تا بلند	زنک قانده جوانه نوری
ارقانع	صوزانی
زنک گل	متراوم به نهاد و پیچش برگ
مقاومت به بیماری و آفت	مقاومت به بیماری و آفت

## انتخاب رقم ...



**(Diamant) دیامانت**

نکحه عرضی ناکنیده	شکل شده
سختگی	عمق چشم شده
سلپید نا زرد	منوسط
زرد	قرمز
منوسط نا گیوزن	رزنک پوست
منصوری	رزنک گوشت
منخلوط قرمز و بنفش	رزنک کل
منوسط نا بلند	رزنک قرمز منوسط
منقوصت به بیماری و آفت	ارتفاع
صورتی	زودرسی
رزنک فائده جوانه نوری	بنفش قرمز منخلوط
	خوب
	مناخوت به اسکب پو دری و حساس
	به نهادن سیستمی



**(Desiree) دزیره**

نکحه عرضی ناکنیده	شکل شده
سختگی	عمق چشم شده
سلپید نا زرد	منوسط
زرد	قرمز
منوسط نا گیوزن	رزنک گوشت
منصوری	رزنک کل
منخلوط قرمز و بنفش	رزنک قرمز منوسط
منوسط نا بلند	مناخوت به خشکی
منقوصت به بیماری و آفت	سودرنی
صورتی	رزنک فائده جوانه نوری
رزنک فائده جوانه نوری	مناخوت به اسکب پو دری و حساس
	به نهادن سیستمی



**(Granola) گرانولا**

گزد نا گلخانه غربی	شکل شده
سختگی نا منوسط	عمق چشم شده
سلپید نا گرم	منوسط
زرد روش	رزنک پوست
منوسط رس نا گیوزن	رزنک گوشت
منصوری	رزنک کل
منخلوط قرمز و بنفش	رزنک قرمز و بنفش
منوسط نا بلند	ارتفاع
منقوصت به بیماری و آفت	زودرسی
صورتی	کوتاه نا منوسط
رزنک فائده جوانه نوری	مناخوت به بیماری و نسبتاً مناخوت به
	اسکب



**(Draga) دراگا**

گزد - گمی نکحه عرضی	شکل شده
عطف چشم شده	عطف چشم شده
سلپید نا گرم	منوسط
رزنک گوشت	رزنک پوست
سلپید نا گرم	رزنک گوشت
زودرسی	زودرسی
مناخوت به بیماری و نسبتاً مناخوت به	رزنک کل
اسکب	ارتفاع
رزنک فائده جوانه نوری	مناخوت به بیماری و نسبتاً مناخوت به
	صورتی

## انتخاب رقم ...



**(Fiana)**

**کنیبک (Kennebec)**

نام علمی	شکل شده
نام خانوادگی	عشق چشم شده
نام علمی	سنجھی
نام خانوادگی	رنگ پوست
نام علمی	کرم
نام خانوادگی	رنگ کوشت
نام علمی	سفید
نام خانوادگی	زودرسی
نام علمی	زنگ کل
نام خانوادگی	عروس سفید
نام خانوادگی	ارلن اکس
نام خانوادگی	ملایوم به بیماری و آفت
نام خانوادگی	نیستا ماتاوم به بلاست
نام خانوادگی	میتواند جوانه نوری
نام خانوادگی	صورتی

نام علمی	شکل شده
نام خانوادگی	عشق چشم شده
نام علمی	سنجھی
نام خانوادگی	رنگ پوست
نام علمی	کرم
نام خانوادگی	رنگ کوشت
نام علمی	زودرسی
نام خانوادگی	سیند
نام خانوادگی	عروس سفید
نام خانوادگی	ارلن اکس
نام خانوادگی	ملایوم به بیماری و آفت
نام خانوادگی	نیستا ماتاوم به بلاست
نام خانوادگی	صورتی

## انتخاب رقم ...



**(Habibi)**

**فوتنانه (Fontane)**

نام علمی	شکل شده
نام خانوادگی	عشق چشم شده
نام علمی	سنجھی
نام خانوادگی	رنگ پوست
نام علمی	دازائی (Dai) هنری ازمر
نام خانوادگی	سیند
نام خانوادگی	زونگ
نام خانوادگی	زودرسی
نام خانوادگی	ملایوم به بیماری
نام خانوادگی	خوبی طوبی
نام خانوادگی	زونگ
نام خانوادگی	ملایوم به بیماری و آفت
نام خانوادگی	نیستا ماتاوم به بلاست
نام خانوادگی	صورتی

نام علمی	شکل شده
نام خانوادگی	عشق چشم شده
نام علمی	سنجھی تا منوسمد
نام خانوادگی	رنگ پوست
نام علمی	سیند
نام خانوادگی	لیستارزد
نام خانوادگی	عروس سفید
نام خانوادگی	ارلن اکس
نام خانوادگی	زودرسی
نام خانوادگی	لیستا دیرس
نام خانوادگی	سیند
نام خانوادگی	زونگ کل
نام خانوادگی	آبی
نام خانوادگی	ملایوم به بیماری و آفت
نام خانوادگی	حساب به ساق سیاه و بلاست

## انتخاب رقم ...



**لیدی کلیر (Lady Claire)**

نام گیاه	شکل نده
سطح گیاه	عده چشم نده
متوسط	متوسط
تاریخ	زنگ بیوست
زیستگاه	زند روشن
وزن	متوسط
از تنفس	از تنفس
زود رسی	زود رسی
سیند	زنگ کل
آبی	زنگ فائدده جوانه نوری
ملووم	ملووم به پیماری و آفت

**لیدی روزتا (Lady Rosetta)**

نام گیاه	شکل نده
سطح گیاه	عده چشم نده
متوسط	فریز
تاریخ	زند روشن
زیستگاه	متوسط ناپد
وزن	ارتفاع
زود رسی	زود رسی
سیند	ملخوار پنهن و قریب
آبی	صورتی
ملووم	زنگ فائدده جوانه نوری
حساس	حساس به سال سیاه اسکب پودری
ملووم	ملووم به پیماری و آفت

## انتخاب رقم ...



**مارفونا (Marfona)**

نام گیاه	شکل نده
سطح گیاه	عده چشم نده
متوسط	زنگ بیوست
تاریخ	زنگ کوشت
زیستگاه	زند روشن
وزن	متوسط زدن
از تنفس	از تنفس
زود رسی	زود رسی
سیند	سیند
آبی	ملخوار به قواز ابروم
ملووم	ملووم به پیماری و آفت
صورتی	زنگ فائدده جوانه نوری

**میراندا (Miranda)**

نام گیاه	شکل نده
سطح گیاه	عده چشم نده
متوسط	زنگ
تاریخ	زنگ بیوست
زیستگاه	زنگ کوشت
وزن	متوسط ناپد
از تنفس	از تنفس
زود رسی	زود رسی
سیند	سیند
آبی	زنگ فائدده جوانه نوری
ملووم	ملخوار به سال سیاه و بلابت
صورتی	ملخوار به پیماری و آفت

## انتخاب رقم ...



**موندیال (Mondial)**

نام علمی: Solanum tuberosum	شكل شده
نام معمولی: سلطانی	عملی چشم نمایه
سیدنی ۵ دند	عملی چشم نمایه
کرم ۶ زرد زوشن	ریشه پوست
بلند	ریشه گوشش
ازفاغ	ریشه گوشش
زوفرسی	متوجه ناپدید
ریشه کلی	زرد روش
بوزاری	ازفاغ
ریشه فائدہ جوانه نوری	نستا دیروس
ملفوظت به بیماری و آفت	ملفوظت بینش و آسی
ملفوظت متوسطه به اسکب	آسی
ملفوظت به بیماری و آفت	ریشه فائدہ جوانه نوری



**مارول (Marvel)**

نام علمی: Solanum tuberosum	شكل شده
نام معمولی: سلطانی	عملی چشم نمایه
ریشه پوست	ریشه
ریشه گوشش	زرد روش
متوجه ناپدید	ازفاغ
نستا دیروس	زوفرسی
ملفوظت بینش و آسی	ریشه کل
آسی	ریشه فائدہ جوانه نوری
ملفوظت به بیماری و آفت	ملفوظت به ازفاغ فوز از بوم

## انتخاب رقم ...



**میلتون (Milton)**

نام علمی: Solanum tuberosum	شكل شده
نام معمولی: سلطانی	عملی چشم نمایه
سیدنی	ریشه پوست
زرد روش	ریشه گوشش
متوجه رسان	زوفرسی
کوتاه نا متوسطه	ازفاغ
ملفوظت بینش و فرم	ریشه کلی
ملفوظت به بیماری و آفت	ملفوظت کم به فوز از بوم و آترنولا
صورتی	صورتی
ریشه فائدہ جوانه نوری	ریشه فائدہ جوانه نوری



**روزت بوریاتک (Russet Burbank)**

نام علمی: Solanum tuberosum	شكل شده
نام معمولی: سلطانی	عملی
ریشه پوست	کرم
ریشه گوشش	سیدنی
زوفرسی	زرد روش
ازفاغ	بلند
ریشه کل	سیدنی
ملفوظت به بیماری و آفت	ملفوظت به اسکب
صورتی	ریشه فائدہ جوانه نوری