

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز

رشته امور باگی
گروه کشاورزی و غذا
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز - ۲۱۲۳۳۶

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

جلیل تاجیک، حسین رادنیا، مجید رسیمانچیان، مهدی فردوسی‌زاده، انتیتا رامتنی، محمد جهانگیری،

احمد حسنکی فرد (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

صادقی، محمد دهقانی‌پور، ارز محمد جلالی (اعضای گروه تألیف) - سپیده دبیریان (ویراستار ادبی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - مصطفی حسین زاده (صفحه‌آرا) - صبا کاظمی‌دوانی (طرح جلد)

تهران: خیابان ابرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۲۶۶، ۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخت)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰/۴۴۹۸۵۱۶۰ صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ دوم ۱۳۹۸

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قدس سرہ)

فهرست

۹	پودمان ۱ - پرورش دهنده درختان مثمر و غیرمثمر
۱۰	واحد یادگیری ۱: آماده سازی بستر کاشت
۲۹	پودمان ۲ - تولید کننده چمن
۳۰	واحد یادگیری ۲: کاشت چمن
۳۸	واحد یادگیری ۳: چمن زنی
۴۸	واحد یادگیری ۴: پلاکاژ (ترمیم)
۵۰	واحد یادگیری ۵: کاشت گیاهان پوششی
۶۱	پودمان ۳ - کارگر ماهر فضای سبز
۶۲	واحد یادگیری ۶: روش های آماده سازی بذر گل های فصلی و باغچه ای
۶۶	واحد یادگیری ۷: کاشت گیاهان زینتی
۱۰۴	واحد یادگیری ۸: کاشت درختان و درختچه های زینتی
۱۲۵	پودمان ۴ - باگبان فضای سبز
۱۲۶	واحد یادگیری ۹: نگهداری گیاهان زینتی
۱۳۴	واحد یادگیری ۱۰: سم پاشی
۱۴۳	پودمان ۵ - قطعه کار چمن
۱۴۴	واحد یادگیری ۱۱: اصول طراحی فضای سبز

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهمترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی طراحی صفحات وب
 - ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
 - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
 - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس پنجمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته امور باگی در پایه ۱۲ تألف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ است. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد.

همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشانی www.tvoccd.oerp.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند می‌باشند.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته ماشین‌های کشاورزی طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی است که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرخواستگی کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ است و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیستمحیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرخواستگی و نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرخواستگی در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیر فنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌باشد به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمومات کسب شایستگی می‌باشد. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های زیر است:

پودمان اول: با عنوان «آماده‌سازی بستر کاشت» است که شامل یک واحد یادگیری است و در آن روش‌های آماده‌سازی بستر برای کاشت گیاهان باگچه‌ای و پوششی به‌طور کامل تشریح شده است.

پودمان دوم: «تولیدکننده چمن» نام دارد که شامل سه واحد یادگیری با عنوان‌های کاشت چمن،

کاشت گیاه پوششی، پلاکاژ (ترمیم) است و در آنها جمع آوری اطلاعات آب و هوایی منطقه ، تعیین ویژگی های محل اجرا، تعیین نوع چمن ، انتخاب شیوه کاشت است و در آنها شرح داده شده است.

پودمان سوم: دارای عنوان «کارگر ماهر فضای سبز» است. در این پودمان انتخاب گل، آماده سازی بستر، آماده سازی گل استقرار گل آبیاری، مالج پاشی شرح داده شده است.

پودمان چهارم: «باغبان فضای سبز» نام دارد. آماده سازی سم پاش، تهییه محلول سم، سرویس و نگهداری سم پاش و نگهداری سم و سم پاش در انبار شرح داده شده است.

پودمان پنجم: با عنوان قطعه کار چمن نام دارد. اصول طراحی فضای سبز شرح داده شده است. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش

پودمان ۱

پرورش دهنده درختان مثمر و غیر مثمر



واحد یادگیری ۱

آماده سازی بستر کاشت

آیا طراحی محیط و منظر براساس اصول و عوامل خاص انجام می‌گیرد؟

چگونه می‌توان نسبت به طراحی فضای سبز اقدام نمود؟

قدمت طراحی محیط و منظر، کشت و کار و نگهداری درختان زینتی، گل‌های باعچه‌ای و گیاهان فصلی همزمان با شروع کشاورزی بوده است و ایرانیان از سال‌های دور به ایجاد فضای سبز، کشت و پرورش گل‌های بومی به صورت محدود پرداخته و با توجه به اعتقادات و رسوم ایرانیان جزء اولین مللی بوده‌اند که در مراسم و اعياد گل به یکدیگر هدیه می‌دادند و این عمل را نوعی احترام به مهمان و همنوع خود می‌دانسته‌اند.

اهمیت اقتصادی

ایران کشوری است با ۱۲ اقلیم از ۱۴ اقلیم شناخته شده در جهان، با تفاوت درجه حرارت هوا حدود ۴۰ درجه سانتی گراد و به دلیل تنوع آب و هوایی و دارا بودن روزهای آفتابی زیاد توان تولید گل‌های باعچه‌ای و فصلی به‌اندازه تمام تولیدات کشورهای اروپایی را دارا می‌باشد، از طرف



دیگر با گسترش شهرنشینی و افزایش رفاه عمومی، گذراندن اوقات فراغت و تفریح تبدیل به نوعی فرهنگ شده و از احتیاجات جامعه امروزی گردیده است. به نوعی که با سرمایه‌گذاری و تغییر سیاست‌های قدیمی در این بخش باعث استفاده کارآمدتر از منابع و عوامل طبیعی همگون با نظام اجتماعی خواهیم بود.

در سال‌های اخیر به دلیل نیاز روزافزون بازار و تولید ثروت و به دلیل محدود شدن فضای زندگی مردم این وضعیت کاملاً تغییر کرده است. به گونه‌ای که احداث

پارک‌ها و بوستان‌های بزرگ، گلخانه‌های بزرگ، تکثیر توسط افراد و یا توسط سازمان‌ها و شهرداری‌ها، به‌طور نسبتاً مجهز و کارآمد به منظور کشت و پرورش و تکثیر درختان زینتی، گیاهان باعچه‌ای و گل‌های فصلی و فراتر از آن، استفاده از روش‌های مختلف برای ایجاد تنوع، روند روبه رشدی داشته است. ایران یکی از خاستگاه‌ها و زادگاه‌های طبیعی گیاهان و تعدادی از درختان و درختچه‌ها می‌باشد، اما به لحاظ آماری هنوز موقعیت مناسبی از نظر تولید گل و گیاه در دنیا ندارد.

دلایل فراوانی برای این امر وجود دارد که مهم ترین آن را می‌توان عدم استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای روز دنیا، هدر رفت منابع و امکانات در اثر فرهنگ غلط استفاده از امکانات و منابع و نداشتن اطلاعات درخصوص نیازهای

واقعی جامعه دانست. لذا راه حل اساسی و درست، بینش و شناخت صحیح از منابع و امکانات و به کارگیری درست آنها با استفاده از تکنولوژی روز می‌باشد که امید است در این زمینه گام‌های اساسی برداشته شود.



استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این درس باید اصول اولیه طراحی فضای سبز و پارک و نیازهای آن را بشناسد. و آنها را در یک باغ و پارک استاندارد مشخص نماید و در طراحی از آنها برای یک باغ و یا فضای سبز استفاده نماید. یک کمک تکنسین فضای سبز چگونه می‌تواند اقدام به کشت گل‌های فصلی، دائمی و یا درختچه نماید؟

بسترها کاشت بذر گیاهان باغچه‌ای و گل‌های فصلی

خاک

برای تهیه بستر کاشت درختان و درختچه‌های زینتی و گل‌ها به مواد زیر نیاز داریم. خاک معمولی سبک و سنگین، کود دامی کامل‌پوسیده، خاکبرگ از ترکیب مواد فوق می‌توان به بستر کاشت مناسب برای گیاهان رسید. خاک‌های معمولی که برای درختان و درختچه‌های زینتی انتخاب می‌شوند از اراضی کشاورزی درجه یک باید تهیه شوند تا علاوه بر دارا بودن مواد غذایی مناسب فاقد شوری و آهک بالا باشند. این خاک‌ها در بعضی از مناطق از معادن تهیه شده و بعد از گذراندن از الک‌هایی، ناخالصی‌هایی مانند سنگ‌های درشت و ریز را جدا می‌نمایند. مزیت این نوع خاک‌ها عدم وجود بذر علف‌های هرز می‌باشد ولی قیمت بالاتری دارند. در عوض خاک‌های معمولی دارای ناخالصی بیشتری بوده و قیمت کمتری دارند.

نکته



کودها به دو نوع کودهای شیمیایی و کودهای آلی تقسیم‌بندی می‌شوند. کودهای آلی به کودهایی گفته می‌شود که منشأ آن گیاهی و یا جانوری باشد مانند کودهای حیوانی و یا خاکبرگ کودهای شیمیایی به کودهایی گفته می‌شود که منشأ معدنی دارند و یا مصنوعاً توسط انسان ساخته می‌شوند مانند کود اوره، هر دو نوع کود نیز باید به خاک اضافه شود و کمبود هر کدام از آنها می‌تواند باعث کاهش رشد شود.



باید دقت کرد که نهال‌های کوچک و ضعیف نسبت به کود زیاد، علی‌الخصوص کود گوسفنده و مرغی که دارای فسفر بالا می‌باشد، حساس بوده و اصطلاحاً می‌سوزند و از بین می‌روند.

غذایی خود باعث تغذیه گیاه می‌شود و سوم اینکه آب و هوای موجود در منافذ خود، هم باعث آبیاری و هم باعث تهویه می‌شود. بنابراین خاک مناسب خاکی است که هرسه عامل فوق را با توجه به نوع گیاه کاشته شده بتواند به نحو مطلوب و مورد نیاز آن گیاه در اختیار قرار دهد. حال با توجه به اینکه گیاهان نیازهای متفاوتی دارند، پس اول باید نوع گیاه و نیازهای آن را شناسایی نموده و بعد با توجه به نوع نیاز گیاه، خاک مناسب را برای آن گیاه فراهم نمود.

با توجه به اینکه در کتاب‌های درسی سال‌های قبل در مورد انواع خاک‌ها و خصوصیات آنها مطالب زیاد نوشته شده است بنابراین در این کتاب از ذکر مجدد آن خودداری می‌شود.

بستر کاشت درختان و درختچه‌های زینتی و گل‌های فصلی در مقایسه با گیاهان باگی متفاوت بوده و در بیشتر مواقع نیازمند محیط کشت با تأسیسات شبیه به گلخانه و یا توپل پلاستیکی می‌باشند و به ندرت از مزارع و بسترها کاشت نظیر مزرعه استفاده می‌شود. تولید این گونه گیاهان معمولاً در تمام فصل‌های سال در خارج از گلخانه و یا زیر پوشش پلاستیکی ادامه دارد. با توجه به اینکه تولید این نوع از گیاهان بیشتر به صورت متراکم و در محیط‌های بسته انجام می‌شود بنابراین نیازمند استفاده از موادی به‌غیر از خاک و با خواص متفاوت می‌باشد. شناخت این خواص و استفاده بجا از آن منجر به تولید موفق خواهد شد.

خاک در اصل سه وظیفه عمدۀ دارد اول اینکه گیاه را در خود نگه می‌دارد. دوم اینکه با استفاده از ذخایر

۱ خاک مناسب برای درختان و درختچه‌ها باید عاری از آلودگی بوده و با توجه به نیاز گیاه تهیه شده باشد.

۲ بعضی از درختان وقتی در زمین کشت می‌شوند در طی چند سال که در زمین باقی می‌مانند، ممکن است از ریشه‌های آنها موادی ترشح شود که برای درختان دیگر مشکل ساز شود، بنابراین حتی الامکان از به کار بردن این نوع خاک‌ها خودداری شود.

۳ خاک خوب علاوه بر دارا بودن تمام مواد غذایی مورد نیاز گیاه باید دارای بافت و ساختمان مناسب باشد تا گیاه بتواند رشد مناسب داشته باشد.



شخم زدن

عملیات شخم زدن برای ایجاد تهویه و زیر و رو کردن خاک سطحی و یا در صورت لزوم مخلوط کردن با خاک اعماق پایین‌تر صورت می‌گیرد. زیرا معمولاً خاک‌های اعمق پایین دارای مواد آلی کمتری نسبت به خاک سطح زمین است. این کار معمولاً توسط تراکتور و گاوآهن برگردان دار انجام می‌شود. انجام عملیات شخم و زیر و رو کردن خاک سطحی



فقط در محل کاشت درختان و ایجاد فضای سبز صورت می‌گیرد و بقیه قسمت‌ها مانند راهروهای ارتباطی که بعد از عملیات تسطیح، میخکوبی و مشخص شده است دست نخورده باقی می‌ماند.



استفاده از تراکتور برای عملیات شخم

تحقیق کنید



درخصوص نحوه انجام تنظیمات گاوآهن قبل از انجام شخم از سال‌های قبل چه به یاد دارد توضیح دهید؟

اصلاح خاک
خاک‌ها خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند. خاصیت فیزیکی شامل بافت خاک و ساختمان آن است. خاصیت شیمیایی خاک مربوط به عناصری است که در داخل خاک به صورت محلول وجود دارد و در تغذیه گیاه به کار می‌رود. اهمیت خواص فیزیکی خاک از خواص شیمیایی آن بیشتر است و خاکی را که برای کاشت درخت و درختچه زینتی در نظر می‌گیرند باید با نیازهای گیاه تطابق داشته باشد تا ضمن تهویه بهتر ریشه رشد آن نیز به طور طبیعی صورت گیرد. لذا اگر وضعیت فیزیکی خاک مناسب نباشد در صورت وجود عناصر غذایی در خاک جذبی صورت نخواهد گرفت.

(الف) **اصلاح فیزیکی خاک:** بعضی از درختان و درختچه‌های زینتی برای رشد خود نیازمند خاکی می‌باشند که بتواند ضمن در اختیار گذاشتن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اکسیژن زیادی برای گیاه فراهم نماید. برای این دسته از گیاهان باید از خاک سبک حاوی مواد آلی فراوان استفاده نماییم تا ضمن در اختیار گذاشتن رطوبت کافی بتواند تهویه کافی نیز انجام دهد. برخی دیگر نیازمند خاک سنگین می‌باشند برای اینگونه درختان باید از خاک‌های رسی استفاده نمایم.

(ب) **اصلاح شیمیایی خاک:** اضافه کردن هر نوع کود به خاک به منظور رفع نیازهای غذایی درختان و درختچه‌ها را اصلاح شیمیایی خاک گویند. حال چند سؤال مهم مطرح می‌شود که باید به آنها جواب داد اولاً منظور از کود چه نوع کودهایی است. ثانیاً چگونه می‌توان فهمید که چه مقدار کود و از چه نوعی باید به آن اضافه کرد.

زمان و روش کوددهی

بهترین زمان و روش کودپاشی آن است که کود را در طول مدتی که گیاه نیاز دارد، به مقدار لازم در اختیار گیاه قرار دهد. کود را قبل از کاشت و یا بعد از کاشت به خاک می‌دهند. در صورتی که کود در خاک حرکت نکند و نتوان آن

- کود حیوانی عملیات زراعی را آسان نموده و زمین را برای گاور و نمودن بهبود می بخشد.
- کود حیوانی در خاک های شنی سبب اتصال بهتر ذرات در خاک گشته و در خاک های رسی سبب افزایش درصد تخلخل و نفوذ پذیری خاک می گردد.
- کودهای حیوانی به علت داشتن ماده آلی سبب بهبود هوادهی خاک می گردد کودهای حیوانی اسیدهای آلی و مواد غذایی موجود در خاک را آماده برای جذب گیاه می نماید.
- میزان جذب حرارت در خاک تیره بیشتر از خاک های روشن بوده و به همین لحاظ کودهای حیوانی کمک زیادی به گرم شدن زمین و نهایتاً رشد بیشتر گیاه می کنند.
- کود حیوانی قدری خاصیت قلیابی دارد که به مرور با مصرف کودهای حیوانی -pH خاک افزایش می یابد.
- کود حیوانی باعث افزایش میکرو اور گانیسم گردیده و باعث افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک می گردد.

اهمیت کودهای حیوانی بر روی تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه : در کیفیت کودهای حیوانی موارد زیر مؤثر بوده و در آن دخیل می باشند.

- ۱- نوع حیوان ۲- سن حیوان ۳- مقدار و ارزش غذایی مصرف روزانه حیوان ۴- نوع کاری که حیوان انجام می دهد. ۵- نوع جنس بستر و مقدار آن ۶- نسبت کود مایع (ادرار) و جامد ۷- نحوه و تکنیک نگهداری کود هرچند میزان فسفر داخل کودهای حیوانی نسبت به کودهای شیمیایی بسیار اندک است ولی جذب فسفر از سوی گیاه از طریق خاک ها به خصوص خاک های قلیابی بسیار کم می باشد زیرا فسفر واردہ به خاک در سال اول حدود ۱۱ تا ۳۱ درصد قابل جذب خواهد بود در حالی که فسفر داخل کود حیوانی در داخل خاک جذب را آسان می نماید.

اهمیت کودهای حیوانی در میزان تولید محصول: همانطوری که قبل از اشاره شد تأثیر کودهای حیوانی چه بر روی خاک ها، چه به لحاظ داشتن مواد مغذی یک

رابه نحوی در آب حل و به خاک اضافه نمود، می بایستی آن کود را حتماً قبل از کاشت به خاک داد کودهای فسفره در خاک حرکت نکرده و به سرعت در خاک ثبیت می شوند. کودهای فسفره را نمی توان در سطح خاک پخش کرد و یا از طریق آبیاری به محیط فعالیت ریشه رسانید چنانچه این عمل انجام گیرد، فسفر داده شده در خاک سطحی ثبیت گشته و به ناحیه توسعه ریشه نخواهد رسید. به طور کلی، کودهایی که به میزان کمی در آب محلول هستند قبل از کاشت به بستر اضافه می شوند.

کودهای حیوانی و مصرف آنها

مصرف کودهای حیوانی در کشت گیاهان از بدرو اهلی نمودن حیوانات شروع شده است. فضولات حیوانات وقتی روی زمین ریخته شد گیاهان در آن محل رشد سریع تری داشته اند. براساس همین موضوع مصرف آن در همان زمان ها شروع شده است کود حیوانی برخلاف کودهای شیمیایی اثرات یک جانبه نداشته بلکه از یک طرف کمک به تأمین مواد غذایی نموده و از طرف دیگر خصوصیات فیزیکی خاک را نیز اصلاح می نماید.

اثرات و اهمیت کود حیوانی در کشاورزی

- ۱ در اصلاح ساختمان خاک مؤثر است.
- ۲ منبع تأمین مواد غذایی برای گیاه است.
- ۳ در افزایش تولید محصول مؤثرند. که به شرح زیر توضیح داده می شود.

تأثیر کود حیوانی در خاک: ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش می دهد. که این امر در موقع کم آبی کمک شایانی خواهد نمود.

- نفوذ پذیری آب در خاک را بهبود می بخشد.
- کود حیوانی آب درون خاک را با ذرات خاک متصل می نماید و از تبخیر و نفوذ سریع آن جلوگیری کرده و آماده برای جذب گیاه می سازد و همین امر سبب جلوگیری از فرسایش نیز می گردد.

از بین رفتن کودهای حیوانی: چنانچه رعایت اصول در نگهداری کود نشود در زمان انتقال به محل مصرف قسمت عمده آن از بین خواهد رفت. بنابراین از زمان تولید تا انتقال به مزرعه از راههای مختلفی خاصیت این کودها به شرح زیر از بین خواهد رفت. البته از بین رفتن مایعات داخل کودهای حیوانی به تنها یی انجام نمی‌گیرد بلکه مواد غذایی قابل حل در آب نیز به همراه این مایعات از بین خواهد رفت. یعنی نیتروژن، فسفر، پتاس نیز هدر خواهد رفت. از طرفی موادآلی قابل حل نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

فرایند با ارزش می‌باشد. در اغلب موقع اثرات مثبت کودهای حیوانی در افزایش تولید محصول محرز است. چه در مؤسسه تحقیقات خاک و آب و چه در سایر مراکز تحقیقاتی در خارج کشور موارد یاد شده بالا به اثبات رسیده است. اثرات مفید کودهای حیوانی ظرف ۳-۴ سال از بین خواهد رفت.

تخمیر کودهای حیوانی: کودهای تازه رانمی توان مصرف نمود زیرا باید مدتی به شکل مناسب نگهداری شود تا توسط باکتری‌های هوایی و بی‌هوایی تخمیر گردند.

عوامل زیست محیطی و نکات ایمنی

زیرزمینی، هوای اطراف آن و گیاهان و جانوران آن محدوده می‌باشند.

۱ در مصرف سموم و کودهای شیمیایی که زیادی آنها باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی، آلودگی هوا و از بین رفتن موجودات مفیدی شوند باید نهایت دقت را به عمل آورده و حتی الامکان برای کاهش اثرات آن از روش‌های تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری‌ها استفاده نمود.

۲ تازمانی که میزان ورود خسارت به گیاهان تحت کشت در حد اقتصادی نیست، از سموم استفاده ننموده و با روش‌های مکانیکی و یا به زراعی نسبت به کاهش تعداد آنها استفاده نماییم.

۳ از منابع آبی موجود حداکثر استفاده منطقی را نموده و تا جایی که امکان دارد با استفاده از مالج از تبخیر و تعرق از سطح خاک جلوگیری نماییم.

۴ برای جلوگیری از تخریب و متلاشی شدن خاک‌دانه از کودهای آلی و کود سبز استفاده نموده و از کودهای شیمیایی کمتر استفاده نماییم.

۵ از اضافه نمودن مواد مصنوعی ساخت دست بشر به محیط‌زیست و محل کار مانند انواع پلاستیک‌ها که تجزیه‌پذیر نیستند خودداری نماییم.

محیط‌زیست به مجموعه عوامل زنده و غیرزنده پیرامون گفته می‌شود که امکان زندگی کردن برای موجودات زنده را فراهم می‌آورد. این عوامل ارتباط متقابل باهم داشته و تشکیل یک زنجیره بزرگ را می‌دهند که در این زنجیره امکان ادامه حیات به شکل امروزی وجود دارد. استفاده بیش از حد و نابجا از این زنجیره و عوامل مختلف باعث برهم خوردن تعادل این چرخه شده و خسارت‌های جبران ناپذیری را به وجود خواهد آورد. این زنجیره بزرگ که در اصطلاح اکوسیستم نیز نامیده می‌شود شامل انواع گوناگونی است که نهالستان، باغ گیاه‌شناسی، پارک جنگلی از نمونه اکوسیستم‌های مصنوعی ساخت بشر می‌باشد.

این اکوسیستم‌ها اثرات مهمی در محیط‌زیست انسان داشته و حفظ آن می‌تواند به بقای موجودات زنده کمک نماید. برای جلوگیری از بروز خسارت ناخواسته رعایت نکات ذیل ضروری است.

۱ منابع طبیعی که یکی از اجزای مهم محیط‌زیست می‌باشد، جز منابع تجدید شونده نبوده بنابراین از بین بردن آن باعث از بین رفتن موجودات زنده خواهد شد. این منابع شامل خاک، موجودات ذره‌بینی، آب‌های



با راهنمایی هنرآموز خود به واحد فضای سبز شهرداری محل خود مراجعه نموده و درخصوص روش‌های برآورده نیاز کودی پارک‌ها و فضای سبز آن از کارشناس مربوطه پرس و جو نمایید.



با راهنمایی هنرآموز خود به پارک نزدیک محل هنرستان مراجعه نموده و با بررسی درختان و درختچه‌ها مشخص نمایید که آیا کمبودی در درختان مشاهده می‌شود یا نه. در صورت دارا بودن کمبود نوع آن را مشخص نمایید و سپس راه‌های برطرف کردن آن را بیان نمایید.

عناصر غذایی و اثرات آن

نیتروژن نیز باعث رشد آبکی و ضعیف بوته و شاخ و برگ‌ها شده و ضعیف شدن گیاه را به دنبال خواهد داشت. پتانسیم دومین عنصر پرمصرف مورد نیاز گیاه است که به مقادیر زیاد هم قبل از کاشت گیاه و هم در حین رشد گیاه به آن داده می‌شود. وجود پتانسیم مناسب در اطراف محیط ریشه باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به عوامل نامساعد محیطی و افزایش رشد و نمو گیاه می‌شود. معمولاً وقتی نیتروژن زیادی به گیاه داده شود، برای کاهش اثرات بد آن اضافه کردن محلول غذایی حاوی پتانسیم می‌تواند تاحدی کمک نماید. علاوه بر این عنصر در گیاه شامل سوختگی دور برگ‌ها به دلیل عدم انجام فتوسنترز و کوچک شدن برگ‌های جوان می‌باشد. کودهای حاوی پتانسیم در طول دوره رشد به صورت ترکیبی با دیگر عناصر موردنیاز به صورت محلول پاشی به گیاهان داده می‌شوند.

فسفر نیز از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین عناصر غذایی در پرورش گیاهان زینتی محسوب می‌شود و به واسطه حرکت کند آن در خاک و تأثیر دمای پایین در جذب توسط ریشه‌ها معمولاً قبل از کشت گیاه زینتی خاک را از فسفر غنی می‌نمایند. این عنصر غذایی باعث افزایش مقاومت گیاه و افزایش میزان رشد ریشه‌ها شده و به باروری و تولید گل و بذر کمک می‌نماید. افزایش

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان زینتی به‌طور کلی به دو دسته عناصر پرمصرف و عناصر کم مصرف تقسیم می‌شود. عناصر غذایی پرمصرف آن دسته از عناصر هستند که به میزان زیاد موردنیاز گیاه می‌باشند. این عناصر اثر مهمی در رشد و نمو گیاه دارند. کمبود و یا زیادی هر کدام از این عناصر در تقابل با دیگر عناصر بوده و تأثیر مستقیم بر رشد گیاه دارد. عناصر غذایی کم - مصرف در مقادیر بسیار کم مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی مقادیر کم آن دلیل بر بی‌اهمیت و یا کم اهمیت بودن آن نیست و کمبود آنها نیز به مراتب تأثیرات زیادی بر رشد گیاه می‌گذارد.

بدون شک مهم‌ترین عنصری که به مقدار زیادی برای رشد و نمو گیاه لازم است نیتروژن می‌باشد که از طریق ریشه‌ها به راحتی جذب می‌شود. این عنصر یک عنصر با تحرک زیاد در خاک است (میزان حرکت این عنصر در خاک زیاد است) و به راحتی توسط آبشویی از دسترس خارج می‌شود. بنابراین باید در طی دوره رشد گیاه و با مقادیر کم به صورت دوره‌ای به گیاه داده شود و مهم‌ترین تأثیر آن افزایش رشد رویشی گیاه (افزایش رشد شاخ و برگ گیاه) می‌باشد. بدون وجود نیتروژن رشد گیاه تکمیل نشده و علاوه بر این کاهش رشد و زرد شدن برگ‌های پیرتر گیاه می‌باشد. تغذیه با مقادیر فراوان

تشکیل سبزینه گیاهان زراعی و باگی نقش ارزنده‌ای دارد.

- علل کمبود آهن در خاک**
- ۱) زیادی بی کربنات در محلول خاک
- ۲) عدم تهویه خاک
- ۳) گیاهان حساس که ریشه آنها کارایی برای جذب آهن ندارند
- ۴) کمبود مواد آلی خاک

درمان کمبود آهن:

- (الف) بیل زدن در پای گیاه
- (ب) افزایش مواد آلی خاک
- (ج) بالا بردن کیفیت آب آبیاری
- (د) مصرف متعادل کود آلی و شیمیایی

نقش منگنز: منگنز در بعضی واکنش‌های آنزیمی شرکت می‌کند و موجب فعال شدن تعدادی از آنزیم‌ها می‌شود.

علائم کمبود منگنز: کلروز برگ‌ها به صورت نقطه‌های زردرنگ بین رگبرگ‌ها شبیه کمبود آهن.

نقش روی: روی آثار عمیقی در متابولیسم نرمال گیاه دارد و به طور کلی متابولیسم کربوهیدرات‌ها، پروتئین، اکسین و فرایندهای زایشی تحت تأثیر شدید کمبود روی قرار می‌گیرد کاهش ۵۰-۷۰ درصدی فتوسنتز، کاهش محتوای کلروفیل، ساختمان غیرنرمال از جمله اثرات کمبود روی هستند.

علائم کمبود روی: برگ‌ها عالمت نکروز پیشرفت‌هه بین رگبرگی نشان می‌دهند. در مراحل اولیه کمبود روی، برگ‌های جوان تر زرد شده و سطح بالایی برگ‌های بالغ، به صورت سوراخ سوراخ درمی‌آید. همچنین مخروطی شکل شدن آنها رایج است. همچنان که کمبود پیشرفت‌ه

میزان این عنصر در خاک بیش از حد نیاز باعث بروز علائم سمتی در گیاه می‌شود.

کلسیم از دیگر عناصر پر مصرف در رشد گیاه بود که به دلیل مؤثر بودن pH محدوده ریشه و اثرات متقابل با دیگر عناصر، جذب آن به کندی صورت می‌گیرد و کمبود آن اثرات فراوانی در رشد گیاهان به خصوص گیاهان دارای میوه می‌گذارد. ولی از آنجایی که از میوه گیاهان زینتی استفاده نمی‌شود، اثرات کمبود آن در گیاهان زینتی مربوط به تأثیر آن در زیبایی برگ‌ها و شاخه‌های گیاهان می‌باشد.

عنصر پر مصرف دیگر گوگرد می‌باشد که دارای اثرات زیادی در رشد و نمو گیاهان زینتی است و کمبود آن تأثیر مهمی در رشد و نمو گیاه خواهد گذاشت. جهت جلوگیری از برخی مشکلات در پرورش گیاهان زینتی در مناطق خشک و کم باران اضافه کردن گوگرد به مقداری که pH محدوده خاک را تختنی و کمی کمتر از آن تقلیل دهد، توصیه می‌شود. این مقدار با نظر کارشناس مربوطه و با انجام آزمایش خاک تعیین می‌شود.

عناصر کم مصرف عده‌ای از عناصر غذایی هستند که با مقادیر بسیار کم تأثیرات فراوانی را بروی رشد گیاهان می‌گذارند. از مهم‌ترین این عناصر می‌توان آهن را نام برد که به صورت معمولی قابل استفاده نبوده و باید در ترکیب با ماده دیگر به صورت کلات مورد استفاده قرار بگیرد. کمبود این عنصر از برگ‌های جوان انتهایی و با زرد شدن بین رگبرگ‌ها شروع می‌شود. برای از بین بردن این کمبود محلول پاشی با کلات آهن بر روی برگ‌ها توصیه می‌شود.

نقش آهن: عنصر آهن اهمیت حیاتی در زندگی حیوانات و گیاهان دارد. آهن نقش مهمی در زندگی جانوران به علت وجود آن در هموگلوبین خون دارد.

نقش آهن در گیاهان: ماده‌غذایی آهن، یکی از عناصر غذایی کم مصرف است که وجود آن به اندازه کافی برای رشد گیاهان زراعی و باگی لازم است و در

میزان استفاده آن دارد.

علائم کمبود بُر: برگ‌های دچار کمبود بُر یک کلروز عمومی خفیف نشان می‌دهند.

می‌کند، این علائم به صورت نکروز بین رگبرگی شدیدی ظاهر می‌شود اما رگبرگ اصلی مانند موقع ترمیم کمبود آهن، سبز باقی می‌ماند. در بسیاری از گیاهان به ویژه درختان، برگ‌ها خیلی کوچک شده، میانگره‌ها کوتاه و شبیه به حالت روزت به نظر می‌رسند.

نقش مولیبدن: انتقال مولیبدن احتمالاً در آوندهای چوبی صورت می‌گیرد. همچنین قدرت جابه‌جایی آن در گیاه نسبتاً کم است و به همین دلیل این عنصر در آوندهای آبکشی و سلول‌های پارانشیمی متتمرکز می‌شود. به دلیل ناچیز بودن مقدار مولیبدن قابل جذب در خاک، غلظت آن معمولاً در بافت‌های گیاهی کم است.

علائم کمبود مولیبدن: برگ‌ها لکه‌های خال مانند همراه با کلروز بین رگبرگی نشان می‌دهند. یک علامت ابتدایی برای کمبود مولیبدن، کلروز سرتاسری عمومی است که شبیه به علامت کمبود نیتروژن است با این تفاوت که بدون رنگ مایل به قرمز در سطح پائینی برگ‌ها می‌باشد. نقش مولیبدن در احیاء نیترات در آسمیمیلاسیون (Assimilation) به وسیله گیاه می‌باشد. بنابراین عالیم اولیه کمبود مولیبدن در حقیقت ناشی از کمبود نیتروژن هستند هرچند مولیبدن مأموریت متابولیکی دیگری در گیاه دارد و از این رو عالیم کمبود آن حتی هنگامی که نیتروژن احیاء شده در دسترس است، وجود دارد.

حال که با علائم کمبودهای عناصر غذایی برروی درختان زینتی آشنا شدید چگونه باید این کمبود را رفع نماییم؟ بهترین راه حل برای برآورد کمبود و میزان آن انجام آزمایش برگ‌های دچار کمبود می‌باشد که توسط کارشناسان آزمایشگاه و با رعایت اصول آن انجام خواهد شد و انجام تمام مراحل در این قسمت بر عهده کارشناسان مربوطه می‌باشد.

در این میان رعایت و آگاهی از چند نکته الزامی است.

نقش مس: مس در ساختار سه نوع پروتئین وجود دارد و چند آنزیم رافعال می‌کند. در صورت کمبود مس، برگ‌ها کوچک‌مانده و سرشاخه‌های جوان دچار برگ سوختگی می‌شوند و در محیط‌هایی با pH قلیایی، مس به طور کلی غیرقابل جذب برای گیاه می‌باشد، لذا بازده مس موجود در خاک‌های ایران بسیار پایین است. این عنصر در سیستم‌های آنزیمی اکسیداز-کاتالاز ضروری است و در واکنش‌های انتقال الکترون سهیم بوده و فعال کننده چندین آنزیم است. مس در گیاه متحرک نیست، لذا همواره به شکل رسوب در خاک باقی می‌ماند.

علائم کمبود مس: برگ‌های دچار کمبود مس پیچیده شده و دمبرگ آنها به سمت پایین خم می‌شود. کمبود مس می‌تواند با کلروز خفیف سرتاسری همراه با فقدان فشار تورگر همیشگی در برگ‌های جوان، بیان شود. برگ‌های به تازگی بالغ شده، مشبك شده، رگبرگ‌های سبز همراه با مناطق سفید شده تا خاکستری مایل به سفید از خود نشان می‌دهند. برخی برگ‌ها، نقاط تو خالی کلروتیکی نشان داده و تمایل به خمیدن به سمت پائین دارند. برگ‌ها کوچک و کلروتیک همراه با لکه‌های نکروتیک می‌شوند.

نقش بُر: این عنصر برای تشکیل دیواره سلولی، انتقال قندها و نشاسته، تشکیل جوانه انتهایی و تشکیل دانه و لوله گرده ضروری می‌باشد. با وجود اینکه بور در خاک خیلی پویا می‌باشد اما در گیاه پویایی آن خیلی کم است. در نتیجه کمبود و سمتیت آن هردو حائز اهمیت است، لذا روش کاربرد بور نقش مهمی در

نکته



- ۱ در زمانی که عملیات کوددهی به درختان و درختچه‌های زینتی صورت گرفته، انجام آزمایش برگ نتایج درستی را به دنبال نخواهد داشت.
- ۲ انجام آزمایش بر روی درختان زمانی که سالم می‌باشد نیز توصیه می‌شود. چه بسا کمبود در گیاه وجود دارد ولی هنوز علائم آن بر روی برگ‌ها پدیدار نشده است.
- ۳ قضاوت بر روی نتایج آزمایش برگ و یا خاک در صلاحیت متخصصان تغذیه گیاهی است و داشتن اطلاعات اندک در این راه کمکی نماید.

أنواع بستر کاشت گل‌ها و گیاهان با غچه‌ای و دلایل استفاده از آن

امروزه با توجه به نوع گیاه و شرایط فیزیولوژیکی آن برای رشد هرچه بیشتر و تولید ریشه‌های فراوان از بسترهای متفاوتی استفاده می‌شود. این بسترهای معمولاً به صورت ترکیبی برای استفاده از خصوصیات چند ماده و در نهایت تولید با کیفیت معرفی می‌شوند.

شرایط یک بستر خوب شامل موارد ذیل می‌باشد.

- ۱ پوک و سبک باشد به نحوی که کمترین مقاومت در خروج جوانه مهیا شود.
- ۲ مواد غذایی مورد نیاز را به راحتی در اختیار گیاه قرار دهد.
- ۳ تهییه و اکسیژن رسانی به گیاه به راحتی انجام شود.
- ۴ میزان مواد جامد محلول و میزان اسیدیته آن مناسب گیاه مورد کاشت باشد.
- ۵ فاقد هرگونه مواد شیمیایی و بیولوژیکی مضر برای گیاه باشد.
- ۶ به لحاظ میزان pH حتی الامکان در محدوده خنثی باشد.

هر کدام از بسترهای کشت به تنها یی تمام شرایط فوق را ندارند بنابراین با شناخت دقیق از خصوصیات مواد می‌توان اقدام به تهییه بستر مناسب نمود. امروزه با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی و کشف تکنیک‌های جدید و ابزارها و ماشین‌های دسترسی به منابع جدید با خصوصیات متنوع، گلکاران و کشاورزان را به سمت استفاده از بسترهای کشت بدون خاک سوق داده است زیرا این بسترهای مزایای فراوانی بوده و تولید با کیفیت و کمیت بیشتر در واحد سطح را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر بعضی از این محیط‌های کشت به دلیل دریافت دمای بالا در هنگام تولید عاری از هر نوع آلودگی بوده در نتیجه نیاز به استفاده از سوم شیمیایی در صورت رعایت نکات بهداشتی در گلخانه به حداقل می‌رسد. همچنین امکان ضد عفونی دوباره این بسترهای که هزینه کمی دارند، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید گردد.

مهم‌ترین مواد بسته‌ی مورد استفاده در پرورش گل و گیاه



پرلیت: این ماده معدنی منشأ آتشفشنای دارد. این مواد را از گدازه‌های آتشفشن جمع آوری نموده و سپس در کوره‌های مخصوص دوباره حرارت می‌دهند. در اثر خروج رطوبت از این گدازه‌ها آن را تبدیل به دانه‌های بسیار سبکی می‌کند که کاملاً ضدغونی می‌باشد. این ماده خنثی بوده و فاقد هر ماده غذایی می‌باشد. ولی معمولاً باعث افزایش تهویه در محیط‌های کشت می‌شود و در ترکیب با بقیه بسترهای به کار می‌رود.



پرلیت مورد استفاده در بستر کشت




پشم سنگ (راک وول): این ماده منشأ معدنی داشته و پس از استخراج تحت دمای بسیار بالای ذوب شده و به صورت رشته‌هایی درمی‌آید. سپس با اضافه کردن موادی آنها را به صورت بلوك‌هایی درآورده و به بازار ارائه می‌نمایند. مهم‌ترین خصوصیت این ماده نگهداری آب فراوان به همراه تهویه بالا می‌باشد. از این جهت از این ماده در کشورهای صاحب نام در تولید و در ترکیب با بسترهای دیگر استفاده فراوان می‌شود ولی در ایران کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.



بستر کشت پشم سنگ برای گیاهان باغچه‌ای

خاک پیت: این ماده از جمع آوری بقایای گیاهان مردابی که در زیر خاک به حالت نیمه پوسیده می‌باشند به دست می‌آید و با توجه به میزان پوسیده شدن دارای انواع مختلفی می‌باشد. این مواد خاصیت جذب آب کمی داشته و معمولاً دارای مقدار کمی نیتروژن می‌باشند.



گلدان‌های پیت جهت کشت بذر (این نوع از گلدان‌ها با گیاه در محل اصلی قرار می‌گیرند)

تحقیق کنید



گلدانهای پیت برای کشت چه گلهایی مناسب می‌باشد و آیا در کشورمان از این نوع گلدانها تولید می‌شود؟



ماسه بادی: این ماده در ریشه‌زایی گیاهان و گلهای زینتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمتر در تکثیر به وسیله بذر به کار می‌رود. این بستر بسیار ارزان بوده فاقد هرنوع ماده‌غذایی می‌باشد و pH در محدوده خنثی دارد. قبل از کاشت نیز جهت جلوگیری از شیوع علف‌های هرز و بیماری‌ها باید گندздایی شود. از این بستر در ترکیب با دیگر مواد استفاده می‌شود.



ماسه بادی مخصوص بستر کشت

کوکوپیت: این ماده به مقدار فراوان در بسترهای گلخانه‌های امروزی در ترکیب با دیگر مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. که شامل بقایای میوه نارگیل و خاک پیت می‌باشد. با توجه به منشأ آن می‌تواند دارای مقادیر متفاوتی از مواد غذایی باشد. مهم‌ترین خصوصیت این بستر جذب آب به همراه تهווیه مناسب و سبک وزن بودن آن می‌باشد.



بلوک کوکوپیت قبل از مصرف باید کاملاً جدا و نرم شود



خاک: این بستر ارزان‌ترین وسیله جهت تکثیر می‌باشد و در گذشته از آن استفاده می‌نمودند ولی امروزه به جز در موارد بسیار کم به دلیل معایب فراوان از آن استفاده نمی‌شود. دلایل آن نیز کاملاً مشخص می‌باشد. اولاً محیطی کاملاً پیچیده بوده و کاملاً آلوده می‌باشد. در ثانی باعث افزایش هزینه‌های تولید شده و به طور معمول فاقد تهווیه می‌باشد. امروزه کاشت بذر گل‌ها و گیاهان باعچه‌ای یا به صورت کشت گلدانی بوده و یا بسترهایی را در مزرعه و گلخانه فراهم آورده و در داخل آنها کشت می‌نمایند. در هر حالاتی که کشت انجام شود رعایت اصول کشت و استفاده از بستر مناسب می‌تواند تولید با کیفیت را باعث شود. به طور معمول پنج عامل محیطی (نور- دما - رطوبت - کربن دی اکسید - عناصر غذایی) جهت رشد هر گیاه باید در بسترهای کشت فراهم شود در غیر این صورت تولید موفقیت آمیز نخواهد بود.



جداسازی مواد زائد و اضافه کردن مواد آلتی به خاک

در صورتی که بستر کاشت خاک باشد باید در زمان کاشت فاقد هر نوع ماده زائد باشد. (ماده زائد به ماده‌ای به‌غیر از ماده اصلی گفته می‌شود که در فرایند کشت و تولید، باعث ایجاد مزاحمت می‌گردد). بعد از جمع کردن مواد زائد اضافه کردن کود دامی کاملاً پوسیده به بستر تا حدی که باعث بروز خواص خاک می‌گردد لازم می‌باشد (به‌طور کلی خاک مناسب خاکی است که دارای ۵٪ ماده آلتی باشد). بعد از اضافه کردن ماده آلتی و مخلوط کردن آن با خاک سطحی که در پرورش گل‌های فصلی این کار با بیلچه و یا بیل انجام می‌شود زمین آماده کشت بذر می‌باشد. در صورتی که بستر کاشت دارای هر ماده یا ترکیبی از مواد به‌غیر از خاک باشد دانستن خصوصیات آن بستر برای انجام عملیات کاشت و تغذیه گیاه مهم و حیاتی است و حتماً باید با رعایت خصوصیات آن بسترها نسبت ترکیب آنها رعایت شود. به عنوان مثال در صورتی که هدف تولید گل‌های فصلی در بستر غیرخاکی مدنظر می‌باشد استفاده از ترکیب ۴۰ درصد پرلیت و ۶۰ درصد کوکوپیت مفید می‌باشد.

روش‌های کاشت و تکثیر گل‌های فصلی و گیاهان باغچه‌ای

به‌طور کلی در روش‌های تولید و پرورش دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد که با توجه به امکانات و شرایط محل و نیاز بازار می‌توان یکی از دو روش و یا هر دو روش را مورد استفاده قرار داد.

(الف) **تکثیر با بذر:** قرار دادن بذر در بستر برای جوانه‌زنی و تولید گیاه جدید را کشت گویند. با توجه به‌این‌که امروزه کشت‌ها بیشتر به‌سمت مکانیزه شدن (با توجه به مزایای آن) تمایل دارند، استفاده از بذر برای کشت درسینی‌ها و مواد ضد عفونی شده طرفداران زیادی داشته و روز به‌روز بیشتر می‌شود. بنابراین در گلخانه‌ها از سینی‌های کاشت و یا گلدان‌ها استفاده می‌گردد. سینی‌های کاشت در ابعاد و اندازه‌های گوناگون می‌باشند. استاندارد این سینی‌ها 45×70 سانتی‌متر بوده و معمولاً از آلیاژ با قطر ۲ میلی‌متر استفاده می‌شود. در روش‌های کشت سنتی بذرها را بر روی بسترها کاشت آمده شده و یا در داخل گلدان کشت می‌نمایند. با توجه به توضیح فوق روش کاشت بذرها ی گیاهان باغچه‌ای به صورت سنتی و یا مکانیزه می‌باشد.



انواع سینی کاشت (توبی و معمولی)

روش سنتی: در این روش پس از آماده کردن بستر کاشت که می‌تواند شامل گلدان و یا سینی‌های کاشت باشد بذرها به صورت دستی بر روی بستر پاشیده شده و سپس با توجه به اندازه بذر روی آن را مجدداً با همان مواد بستر می‌پوشانند.

نکته



به طور معمول بذر گیاهان و گل‌های زینتی ریز بوده و نیازی به ریختن مواد بستر بر روی بذرها نمی‌باشد و فقط به وسیله شنکش و یا چنگک با کمی جابه‌جایی داخل بستر قرار می‌گیرد.

روش مکانیزه: در این روش با استفاده از ابزارآلات و یا ماشین‌هایی اقدام به کشت بذرها به صورت گروهی بر روی ردیف‌هایی با فاصله معین از یکدیگر نموده و بقیه عملیات شامل آبیاری، نگهداری و... به صورت اتوماتیک با استفاده از ماشین‌های خاص صورت می‌گیرد. به عنوان مثال استفاده از خطی کار و آماده نمودن بستر به صورت جوی و پشت و کشت بذرها به صورت گروهی یک روش مکانیزه محسوب شده که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) **تکثیر با استفاده از نشا:** استفاده از گیاهچه پرورش یافته در محیط خزانه و انتقال آن به محل کشت دائمی خود یک روش بسیار مناسب برای کاهش هزینه‌ها و پرورش موفق گل‌های فصلی و گیاهان با غچه‌ای می‌باشد. از مهم‌ترین دلایل استفاده از نشا به جای بذر کاری مستقیم می‌توان هزینه پایین‌تولید با کیفیت و کمیت بالا و تولید نشاهايی قوى و کاهش عملیات واکاري يا تنک کردن را نام برد. در روش سنتی بذرها ابتدا در محیط کشت گلدان و یا بستر معمولی گلخانه تکثیر یافته و در زمان رسیدن به مرحله سه‌برگی به صورت ریشه لخت و یا به همراه خاک گلدان به محل اصلی منتقل می‌شوند.

روش مکانیزه تولید نشا: در این روش که در بیشتر کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد با استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و در داخل گلخانه‌های مدرن نشا اقدام به کشت بذرها در داخل سینی‌های کاشت نموده و پس از مراقبت‌های لازم در یک محیط کاملاً ضدغونی شده و رسیدن گیاهان به رشد مورد نیاز آنها را به محل کشت اصلی خارج این سالن‌ها منتقل می‌نمایند. البته بذر بعضی از گیاهان با غچه‌ای مانند جعفری و آهار به دلیل شکل خاص خود با استفاده از ماشین کشت نمی‌شوند. بذر جعفری به دلیل حالت کشیده خود توسط ماشین کشت نمی‌شود. مگر اینکه به نوعی بذر پوشش دار شود که انجام این موارد مستلزم هزینه اضافی می‌باشد.

تحقیق کنید



استفاده از سینی‌هایی که هر بذر، مکان جدا داشته باشد و به نام سینی‌های شانه تخم مرغی معروف هستند، بهتر از کشت در داخل سینی کاشت معمولی (ترین) می‌باشد. در خصوص دلایل آن تحقیق نموده و حداقل سه دلیل مهم آن را نام ببرید.

عملیات پوشش بذر و مراقبت‌های اولیه

به محض قرار گرفتن بذر در محیط کشت عملیات داشت شامل آبیاری، سمپاشی، کوددهی، تنظیم دما، تنظیم میزان نور و تهویه آغاز می‌گردد. ضمن اینکه باید به دفعات با سرکشی به تمامی گلدان‌ها یا سینی‌ها پوشش روی بذر را نیز کنترل نمود.

نکته

۱ بعد از کشت بذر بستر کاشت و پوشش روی بذرها نباید خشک شود و میزان آبیاری در این رابطه کاملاً به درجه حرارت محیط و میزان رطوبت بستر بستگی خواهد داشت و در این خصوص مهم‌ترین معیار بازدید مرتب و کنترل رطوبت می‌باشد.



۲ نشاهای تهیه شده در گلخانه و محیط‌های بسته و حتی برای بعضی از گیاهان خاص در فضای آزاد برای کاهش میزان تلفات و مقاومت گیاه به شرایط نامساعد محیطی از جمله خشکی عملیاتی تحت عنوان مقاوم‌سازی صورت می‌گیرد که در این عملیات بعد از رسیدن بوته‌ها به اندازه‌ای مشخص در طی مدتی بوته‌ها را آبیاری نمی‌کنند.

فعالیت‌عملی



پس از کاشت بذر چند گل فصلی نظیر بنفسه، همیشه بهار... و رسیدن گیاهان به مرحله سه برگی و قبل از انتقال آن به محل کشت دائمی خود عمل مقاوم‌سازی را با راهنمایی هنرآموز و تحت نظر استاد کار انجام داده و از نتایج آن گزارش تهیه نمایید.

نکته

۱ بذر بعضی از گل‌ها و گیاهان خیلی دیر جوانه می‌زند و در صورت عدم مراقبت و آبیاری صحیح در این مرحله تعداد بسیار زیادی از آنها از بین می‌روند مانند گل لادن.



۲ بستر بذرها نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرند؛ علی‌الخصوص قبل از جوانه زدن.

۳ مهم‌ترین مساله در این روش کاشت رشد علفی بوته‌ها و ضعیف شدن یا از بین رفتن بوته‌ها به محض قرارگیری در محیط بیرون می‌باشد که برای جلوگیری از این عمل فاصله کشت بوته‌ها و میزان نور را باید تنظیم نمود.

۴ بعضی از بذرها همانند بذرهای ارقام مختلف سرخس بسیار ریز بوده و بعد از کشت بذر با استفاده از یک روزنامه خیس روی آن را می‌پوشانند و پوشش اضافی دیگری لازم نمی‌باشد.

۵ بذر بعضی از گیاهان باغچه‌ای به دلیل ریز بودن ابتدا باید با ماسه ریز مخلوط شده و سپس به طور منظم بر روی بستر کاشت ریخته شود. به عنوان نمونه کلم زینتی که در فصول سرد سال در طراحی پارک‌ها و بلوارها استفاده می‌شود، با این روش تکثیر می‌شود.

جدول نیاز نوری جوانه زنی بذر بعضی از گل‌ها

بذرهایی که برای جوانه زنی به تاریکی احتیاج دارند	بذرهایی که برای جوانه زنی نور نیاز دارند
جعفری	پامچال
همیشه بهار	سوسن
تاج خروس	کلم زینتی
زبان در قفا	اقاقیا

تکنولوژی‌های نوین در تولید گل‌ها و گیاهان با غچه‌ای

امروزه در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا تولید نشا گل‌ها به صورت پیوندی و با استفاده از پایه‌های مقاوم در برابر آفات و امراض گیاهی و همچنین مقاوم به شرایط نامساعد محیطی با استفاده از تکنولوژی روز صورت می‌گیرد در ایران بعضی از شرکت‌ها به تازگی به‌این امر روی آوردند.

روش کار به‌این شکل است که پس از کاشت بذر رقم مقاوم به شرایط نامساعد محیطی و یا بیماری‌های شایع یک منطقه و رسیدن نشاها به مرحله سه برگی با استفاده از دست و یا ماشین پیوند زنی اقدام به قرار دادن پیوندک با کیفیت مناسب و خصوصیات موردنظر نموده و پس از طی مراحلی و انجام تیمارهایی آنها را آماده کشت می‌نمایند. این روش در بعضی از کشورها سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فعالیت عملی



با راهنمایی هنرآموز خود با انتخاب یک گیاه به خصوص و کاشت بذر در داخل گلدان و رسیدن نشاها به مرحله سه برگی عمل پیوند را بر روی آن انجام داده و نتایج آن را به صورت گزارش در کلاس بحث نمایید.

تیمارهای اولیه: در ابتدای کشت بوته‌ها نیازمند تولید ریشه زیاد می‌باشند. بنابراین تغذیه با کودهای فسفره می‌تواند رشد ریشه‌ها را زیاد نماید. بعد از آن اضافه نمودن کودهای نیتروژنه برای افزایش رشد رویشی در چند مرحله (مراحل میانی و بعد از مرحله سه برگی) و در انتهای، قبل از انتقال به محل اصلی باید از کودهایی با میزان پتانس بالا استفاده نمود.

قیم؛ وسیله‌ای است از جنس چوب، فلز و یا پلاستیک که در کنار بوته‌های بعضی از گیاهان برای جلوگیری از وارد شدن آسیب گذاشته می‌شود. البته در بعضی از گیاهان نیز برای جلوگیری از شکسته شدن بوته‌ها به دلیل نازک و آبدکی بودن ساقه‌ها نیز می‌باشد.

بوته‌های بعضی از گل‌ها همانند میخک احتیاج به ایجاد قیمی به نام تور دارند که این تورها مانع از افتادن و کج شدن بوته‌ها می‌شود.

نکته



عملیات وجین و سله شکنی در بستر بذر و سینی‌های کاشت در گلخانه‌ها و محیط‌های کشت غیرخاکی به ندرت انجام می‌شود، زیرا با توجه به مواد بستر که ضدغونی بوده و فاقد بذر علف‌های هرز می‌باشد علف هرز و یا سله در این محیط‌ها کمتر می‌باشد، ولی با انجام بازدید و در صورت مشاهده هر دو این عملیات نیز باید انجام گردد.

عملیات واکاری و تنک کردن در صورت کشت با استفاده از نشا و در صورت لزوم باید از خزانه تأمین و در محل‌های خود انجام گردد. امروزه با پیشرفت فنون و ابزارها علی‌الخصوص استفاده از گلدان‌های جیفی پات^۱، تنک کردن و واکاری به ندرت اتفاق می‌افتد.

تیمارهای اضافی: اندام تولیدی تعدادی از گل‌ها و گیاهان با گچه‌ای دارای شرایط خاصی بوده و برای تولید اقتصادی و با صرفه باید تیمارهایی را ببروی آنها اعمال نمود. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به عملیات بهارش (ورنالیزه کردن) استفاده از هورمون‌های گیاهی نظیر جیبرلین، آلار، کاهش تعداد ساعت روشنایی، خیساندن در آب گرم، چینه سرمایی، سر برداری، ته برداری و یا ته شکافی اشاره کرد.



تأثیر هورمون جیبرلین بر اندازه گل و گیاه

۱- گلدان‌هایی که با استفاده از ترکیبات پیت ساخته شده و فشرده می‌شود به نحوی که به صورت یک گلدان با کشت بذر در داخل آن می‌توان همانند یک گلدان از آن استفاده نمود و در نهایت با همان گلدان در محل اصلی کشت شده و نیاز به تعویض گلدان نمی‌باشد.



نکته !

بذر بعضی از گل‌ها و گیاهان باغچه‌ای بسیار بد جوانه می‌زنند و درصد بذرهایی که تلف می‌شوند بسیار زیاد است و گاهی به ۴۰ درصد نیز می‌رسد.

تأثیر ورنالیزه شدن بر روی گیاه

نکته !

۱ بذر بعضی از گل‌ها دارای ذخیره غذایی کافی نبوده و بنابراین ممکن است بسیاری از آنها از بین برود. مانند ارکیده‌ها

۲ برخلاف گیاهان زراعی و باغی تولید گل و گیاه فضای سبز به شدت نسبت به دما، نور، اختلاف دمای شب و روز و رطوبت حساس بوده و در کشت هر نوع بذری باید این عامل‌ها را در نظر گرفت.

ارزشیابی شایستگی: آماده‌سازی بستر کاشت

شرح کار: آماده‌سازی بستر کاشت گیاهان زینتی به روش دستی و ماشینی

استاندارد عملکرد: آماده‌سازی ۵۰ مترمربع بستر گل برای یک روز کاری
شاخص‌ها: نرم شدن خاک - هموار شدن

شرایط انجام کار: در یک زمین هموار و مستعد پرورش گل که آب کافی نیز دارد

۱- جمع آوری ضایعات به صورت دستی و ماشینی

۲- پخش مواد آلی

۳- شخم- دیسک و لولر (در شرایط مناسب) ۴- قطعه‌بندی و کرت‌بندی با مرزکش و ماشینی

ابزار و تجهیزات: بیل - کلدر - کچ بیل (فوکا) شن کش - تراکتور - ریتواتور - گاوآهن - دیسک - کودریز - نهرکن - مرزکش - فرغون pH متر - EC متر - لباس

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	پاکسازی زمین	۲	
۲	کوددهی	۲	
۳	خاک ورزی	۲	
۴	قطعه‌بندی و شکل‌دهی زمین	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.